



かず りょう 数と量のことは

「5」ではなく「5 m」。かず りょう 数と量のことはを身につけよう




いっしょに^{まな}学ばなかも



ソラ

「なぜ？」と聞くのが
大好き。


たしかめるまで、
なっとくしない。



ミナ

図やグラフをかくのが
とくい。

手を動かして^{かんが}考える。



デルタ

計算と記録がとくいな

ロボット。名前は

「変化」を表す

記号 Δ から。

こまったら、3人の^{にん}ことばをヒントにしよう。

ぶつ り かい すうがく
物理を理解するための数学

だい かん
第2巻

かず りょう 数と量のことは

「5」ではなく「5 m」。かず りょう 数と量のことはを身につけよう



ほん ろう せん ほん とお
7本の路線が、この本を通っています

ぶつ り かい すうがく へんしゅういんかいへん
「物理を理解するための数学」編集委員会編

もくじ

第2巻 数と量のことは

△ = 路線 (p.4・5) ☆☆☆☆☆ = 内容の高さ (★は必ず、☆の所まで) p.8 = 8 ページ

じょしょう
序章

「だんだん速く」を数で言うと？

△ ☆☆☆☆☆

p.8

ことばを数と単位にすると、くらべられて計算もできる

だい ぶ
第1部

りょう かず
量と数

p.16

2-1

「かぞえる数」と「はかる数」

☆☆☆☆☆

p.18

「5」だけでは、何のことかわからない

2-2

マイナスの数と数直線

☆☆☆☆☆

p.38

0℃より寒いときは、どう書く？

2-3

+ - × ÷ は、何を表しているの？

△+ ☆☆☆☆☆

p.60

かけ算の答えは、長方形の広さ？

2-4

分数と小数の計算

△ ☆☆☆☆☆

p.76

ピザ2枚を3人で分けると、1人分は何枚？

2-5

比・割合・百分率

☆☆☆☆☆

p.104

「100%」をこえることはある？

2-6

はかった数には「ずれ」がある

☆☆☆☆☆

p.122

同じ物を10回はかると、ぜんぶ同じになる？

だい ぶ
第2部

おお かず ちい かず たん い
大きな数・小さな数・単位

p.148

2-7

何回もかける：累乗と指数

×2 ☆☆☆☆☆

p.150

紙を42回折ると、月まで届く？

2-8

2回かけると口になる数：平方根

×2 ☆☆☆☆☆

p.168

面積が2m²の正方形、1辺は何m？

2-9

分数で書けない数がある？

☆☆☆☆☆

p.184

√2は、どこまで計算しても終わらない

2-10

たんにい せかい 単位の世界ルール：SI 単位

☆☆☆☆☆ P.202

じ そく びょうそくなん 時速 72 km は、秒速 何 m？

だい ぶ 第 3 部

も じ しき 文字と式

P.228

2-11

も じ つか なぜ文字を使うの？

☆☆☆☆☆ P.230

はや つか しき ぎょう どんな速さでも使える式を、1 行で

2-12

も じ しき 文字式のやくそく

☆☆☆☆☆ P.256

3 m と 2 秒は、たし算できない

2-13

こうしき かず い だいにゆう 公式に数を入れてみよう：代入

☆☆☆☆☆ P.272

しき かず い こと が で 式に数を入れると、答えが出てくる

2-14

しき へんけい りよう だ 式を変形して、ほしい量を取り出そう

☆☆☆☆☆ P.294

1 つの公式から、3 つの公式が作れる

2-15

ひれい はん びれい 比例と反比例

☆☆☆☆☆ P.314

ばねを 2 倍のばすには、2 倍の力

2-16

なんびようご お じ ほうていしき 何秒後に追いつく？ 1 次方程式

☆☆☆☆☆ P.334

さき で おとうと あに なんびよう お 先に出了弟に、兄は何秒で追いつく？

だい ぶ 第 4 部

けいさん コンピュータで計算

P.360

2-17

かず しんすう 2 進数と 16 進数

☆☆☆☆☆ P.362

0 と 1 だけで、どんな数も書ける

2-18

ひょうけいさん けいさん 表計算で計算しよう

☆☆☆☆☆ P.386

1000 回の計算も、コピー 1 回で

2-19

けいさん プログラムで計算しよう

☆☆☆☆☆ P.406

0.1 を 10 回たしても、1 にならない？

こたえ P.426

きごう 記号カード P.438

よく使う定数・単位・公式 P.441

できるようになったことチェック表 P.446

つぎの巻へ P.449

さくいん P.452

この本の路線図

この本の章は、7本の路線のどれかの駅です。同じ路線の駅は、前の巻から先の巻まで、ひとつの考え方でつながっています。章のはじめの「道しるべ」で、いまどの路線にいるかを確かめよう。



① 変化 へんか
ひき算 ひきざん → 傾き かたむき → 微分 びぶん

この巻の駅: 2-3、2-4、2-15、2-16、2-19



② たし合わせ たしあわせ
かけ算 かけざん → 面積 めんせき → 積分 せきぶん

この巻の駅: 2-3



③ 倍々 ばいばい
累乗 るいじょう → 指数 しすう → e

この巻の駅: 2-7、2-8、2-17



④ 回転と波 かいてん なみ
角 かく → $\sin$ → 複素数 ふくそすう

この巻の駅: (この巻には駅がありません)



⑤ 表 ひょう
九九の表 くくひょう → 行列 ぎょうれつ

この巻の駅: 2-11、2-12、2-13、2-14、2-18



⑥ 矢印 やじるし
向き むき → ベクトル ベクトル → 場 ば

この巻の駅: 2-2、2-9




⑦ はかる はかる
目もり めもり → 誤差 ごさ → 統計 とうけい

この巻の駅: 2-1、2-5、2-6、2-10

ぜん かん ろ せん ず 全9巻の路線図

した い へ 行く ほど 先の 巻。 色 の 帯 が この 巻 です。




しゅうてん だいがく こうがく つか ぶん や てんせん かこ の えき だい かん び ぶんほうていしき
終点は、大学の工学で使われている分野です。点線の囲みは乗りかえ駅 (第 6 巻の微分方程式)。

この本の使い方

この本は、数学を「物理や工学を考えるための道具」として学ぶ本です。ボールが落ちる、お湯が冷める、振り子がゆれる。そんな身近なできごとを、数と式で書きあらわしてみませんか？

① 1つの章は、いつも同じ順番



例題と「じぶんでこう」で、章末問題に出てくる問題の形を、ぜんぶ1回ずつ見せています。こまったら、例題にもどうぞ。

② 章のはじめの「道しるべ」

章の見出しのすぐ下に、こんな行があります。

📌 道しるべ この章の前に 1-14 2-2 この章の先に 3-5 5-9

前に読んでおくといふ章と、この章の考えが育っていく章です。わからない言葉や式が出てきたら、前の章にもどって確かめよう。

③ ★は「どこまで登るか」のしるし



章と小見出しには★がついています。★の数は、内容の高さ。山登りにたとえると、★1つは「はじめの**いっぽ**」、★5つは「**ちようじよう**頂上」です。

白ぬきの☆は「この章の中で、ここまで登る」というしるし。自分の読める★まで読んで、先へ進んでもだいじょうぶ。

④ ノートを1冊用意しよう

「じぶんでとこう」と章末問題は、ノートに解きます。本には書きこまないで、**なんど**でもやり直せます。

問題の番号を書き、図をかいてから式を書こう。答えには単位をつけます。

例	じぶんでとこう 1
	
	$6 \text{ m/s} \times 15 \text{ s} = 90 \text{ m}$
	こた 答え 90 m


⑤ この本の3つのやくそく

- ① 数には、いつも単位をつけよう。「5」ではなく「5 m」と書きます。
- ② 式を書く前に、表や図をかいて考えよう。
- ③ くり返しの計算は、電卓やコンピュータにまかせてもだいじょうぶ。

問題の答えは、本の後ろの「こたえ」にあります。

「だんだん^{はや}速く」を かず^い数で言うと？

て も 手に持ったボールを、そっとはなします。ボールは、^{した お}下へ落ちていきます。^{おち}落ちていくようすを^{とも}友だちに^{つた}伝えるとしたら、^いどう言うかな？



ことばで^い言うと

「ボールは、だんだん^{はや}速くなる。」

→「だんだん」が、どれくらいかわからない。^{ひと}人によって、^{おも}思いうかべる^{はや}速さがちがう。

かず^{たん い}数と単位で^い言うと

「ボールの^{はや}速さは、^{びょう}1 秒ごとに^{やく}約 10 m/s ずつ^{ひだり}ふえる。」

→ だれが^よ読んでも、^{おな}同じ^{はや}速さを^{おも}思いうかべられる。

「だんだん^{はや}速くなる」は、まちがいでありません。でも、^{はや}ゆっくり速くなるのか、ぐんぐん^{はや}速くなるのか、ことばだけではわかりません。

かず^{たん い}数と単位で^い言うと、「^{びょう}1 秒ごとに^{やく}約 10 m/s ずつ^{ひだり}ふえる」です。左の図のように、^{しゅんかん}はなした瞬間の^{はや}速さは 0 m/s。^{びょうご}1 秒後には^{やく}約 10 m/s、^{びょうご}2 秒後には^{やく}約 20 m/s。^{びょう}1 秒たつたびに、^{はや}速さに^{やく}約 10 m/s が^{はや}たされていきます。

10 m/s って、どんな^{はや}速さ？

m/s は「メートル^{まいびょう}毎秒」と読みます（くわしくは 2-3）。10 m/s は、^{びょうかん}1 秒間に 10 m ^{すす}進む^{はや}速さです。25 m プールなら、^{びょう}1 秒で 10 m、^{びょう}2 秒で 20 m ^{すす}進み、^{びょう}3 秒た^むたないうちに^つ向こうのはしに着きます。




図1 10 m/s で進むと、1 秒ごとに 10 m ずつ進む。

50 m 走を約 8 秒で走る人は、1 秒間に約 6 m 進みます ($50 \div 8 = 6.25$)。10 m/s は、それよりずっと速い速さです。

なぜ「約 10」なの？

ボールの落ち方は、約 400 年前のイタリアの科学者ガリレオのころから、たくさんの方がくわしくはかってきました。はかると、速さは 1 秒ごとに約 9.8 m/s ずつふえます。この本では、計算しやすいように、9.8 を約 10 として使います。「約」は「だいたい」という意味です。

ただし、これは、空気がボールをおし返す力（空気の抵抗）が小さいときの話です。紙のように軽くて広いものは、空気におし返されて、ゆっくり落ちます。

数と単位で言うと、何がよい？

ことばを数と単位で言いかえると、よいことが 3 つあります。

1 くわしく伝える


ことばで言うと	数と単位で言うと
えき 駅まで、もうすぐ。	えき 駅まで、ある 5 分。
きょう あつ 今日暑い。	きょう さいこうき おん 今日最高気温は 35℃。
おも にもつ 重い荷物。	おも 重さ 10 kg の荷物。
ボールが、だんだん速くなる。	はや 速さが、1 秒ごとに約 10 m/s ずつふえる。

表1 ことばと、数と単位

「暑い」と感じるかどうかは、人によってちがいます。でも、「35℃」は、だれが温度計を読んでも 35℃ です。数と単位は、人によって変わらない「ものさし」ではかった結果なので、くわしく、正しく伝わります。

2 くらべられる

月の上でボールをはなしても、ボールは、だんだん速くなりながら落ちます。ことばで言うと、地球とまったく同じです。でも、はかってみると、月では速さが1秒ごとに約 1.6 m/s ずつしかふえません。



同じ「だんだん速くなる」でも、数でくравると、地球のボールのほうが、ずっと速く速くなることがわかります。

1.6 を 6 倍すると 9.6 で、ほぼ 10。地球でふえる速さは、月の約 6 倍です。月は地球より小さく、ものを引っ張る力が弱いからです。

3 計算できる

地球のボールの、3 秒後の速さはどれくらいでしょう。数と単位で書いてあれば、計算で求められます。



図2 1 秒たつごとに、10 m/s ずつたしていく。

3 秒のあいだに、10 m/s が 3 回たされます。だから、 $0 + 10 + 10 + 10 = 30$ です。10 が 3 つ分なので、かけ算で $10 \times 3 = 30$ と計算することもできます (1-12: かけ算は同じ数のまとまり)。3 秒後の速さは、約 30 m/s です。

ここでも「約」がつくのは、ほんとうにふえる速さが1秒ごとに約9.8 m/sだからです。 $9.8 \times 3 = 29.4$ なので、ほんとうは約29.4 m/s。だいたい30です。

30 m/s は、どれくらいの速さでしょう。1時間は60分、1分は60秒なので、1時間は $60 \times 60 = 3600$ 秒です。1秒に30 m進むと、1時間(3600秒)では $30 \times 3600 = 108000$ で、108000 m。1 km は1000 mなので、108 km です。時速108 kmで、高速道路を走る車くらいの速さです(時速と秒速の換算は、2-10でくわしく学びます)。



時速約 108 km

月のボールなら、 $1.6 \times 3 = 4.8$ で、3秒後は約4.8 m/s。これも、計算で求められます。

地球のボールにもどると、4秒後は $10 \times 4 = 40$ で約40 m/s、5秒後は $10 \times 5 = 50$ で約50 m/s。「10 × 秒数」という同じ計算で、何秒後の速さでも求められます(空気の抵抗が小さいあいだ)。

たいせつ

ことばを数と単位で言いかえると、

- ① くわしくつたわる ② くらべられる ③ けいさんできる



ミナ

「すぐ」「たくさん」「とても重い」も、数と単位で言いかえられるかな？ この巻で、そのことばを1つずつまなぼう。

この巻で学ぶ「数と量のことば」

ふだんのことばを数と単位で言いかえるには、いろいろな道具が必要です。この巻の章で、1 つずつ学んでいきます。

ことばで言うと	数と単位で言うと	学ぶ章
えき 駅まで、あと 5。	えき 駅まで、あと 5 分（単位をつける）	2-1
け さ 今朝は、とても寒い。	け さ き おん 今朝の気温は -3°C	2-2
にん おな わ ピザを 3 人で同じに分ける。	にんぶん $\frac{1}{3}$ まい 1 人分は $\frac{1}{3}$ 枚	2-4
すこ やす いつもより少し安い。	び 0.8 ばい ね だん 20% 引き（0.8 倍の値段）	2-5
だいたい 5 cm くらい。	5.0 cm（ずれは約 0.05 cm）	2-6
ひかり 光は、ものすごく速い。	びょうそくやく 秒速約 $3.0 \times 10^8 \text{ m}$	2-7
はや つか どんな速さでも使えるきまり。	みち 道のり $x = \text{速さ } v \times \text{時間 } t$	2-11

ひょう 表2 この巻で学ぶ、ことばの言いかえ

△ やってみよう 身のまわりのことばを、数と単位で言いかえよう

- ① 「重いランドセル」：体重計で、ランドセルを持ったときと持たないときの体重をはかり、ひき算で何 kg かを求めよう。
- ② 「近くの公園」：家から歩いて何分かかかるかを、時計ではかろう。
- ③ 「今日は暑い」：天気予報の最高気温を調べて、昨日とくらべよう。何℃ ちがうかな？

ノートに「ことば → 数と単位」の表を作って書きこもう。答えには、かならず単位をつけます。

この巻が通る路線と駅

この本の章は、7本の路線の駅です（4・5ページ）。同じ路線の駅は、1つの考え方でつながっています。




図3 第2巻を通る6本の路線。四角の中がこの巻の駅（太字は大きな駅）。

路線	大きな駅で学ぶこと
△ 変化	ひき算で変わった量を求める（2-3）→ 傾き（3-5）
⊕ たし合わせ	かけ算の答えを面積で見る（2-3）→ 積分（5-10）
×2 倍々	同じ数を何回もかける（2-7）→ 倍々にふえる量（3-11）
田 表	ひょうけいさん 表計算で、くり返し計算する（2-18）→ れんりつほうていしき 連立方程式（3-6）
↗ 矢印	マイナスは反対の向き（2-2）→ 座標（3-2）→ ベクトル
📏 はかる	はかった数の「ずれ」（2-6）→ ずれを数で表す（3-14）

倍々の路線と矢印の路線は、この巻が始発駅です。

この巻でできるようになること

第2巻は、4つの部に分かれています。

第1部 量と数

$$5\text{ m} = 500\text{ cm} \quad -3 + 5 = 2$$

- ・量を、数と単位で書ける。
- ・マイナス・分数・割合を使って計算できる。
- ・はかった数のずれがわかる。

第2部 大きな数・小さな数・単位

$$3.0 \times 10^8 \text{ m/s} \quad \sqrt{2} = 1.41 \dots$$

- ・大きな数・小さな数を、10の何乗で書ける。
- ・2回かけて2になる数がわかる。
- ・単位をそろえて計算できる。

第3部 文字と式

$$x = v \times t \rightarrow t = x \div v$$

- ・文字を使って、きまりを1行で書ける。
- ・式を変形して、ほしい量を取り出せる。

第4部 コンピュータで計算

$$1011_{(2)} = 11$$

- ・0と1だけで数を書ける。
- ・表計算とプログラムで、くり返しの計算ができる。

図4 4つの部と、できるようになること

コラム なぜ「数と量のことば」なの？

「5 m」と書けば、日本でもブラジルでも、だれが読んでも同じ長さです。数・単位・記号・式は、世界じゅうの人が、物の動きや機械のしくみを正確に伝え合うための、共通のことばです。第3巻では、このことばを使って、表・グラフ・式から変化のきまりを見つけます。

この巻の読み方



ソラ

第1巻では、数えたり、はかったりしたね。第2巻では何をやるの？



ミナ

0より小さい数や、文字の x も出てくるんだって。むずかしそう……。



デルタ

だいじょうぶ。どの章も、場面を見て、手を動かして、気づいてから式にするよ。わからなくなったら、前の章にもどればいいよ。



① 思い出そう

章のはじめに、前に学んだことを1行で思い出します。

1-8 $1\text{ m} = 100\text{ cm}$

札の章にもどれば、くわしく書いてあります。



② 電卓を使おう

2-1 から使ってください。

- ・おす前に、式をノートに書く。
- ・答えのだいたいの大きさが合っているか、確かめる。



③ ノートの使い方

- ・式は1行に1つ。「=」をたてにそろえる。
- ・答えには単位をつける。
- ・式の前に、図や表をかく。



④ 例題から章末問題へ


例題を読む → じぶんでどう（同じ形） → 章末問題。

わからなかったら、同じ形の例題にもどろう。

まちがえても、だいじょうぶ。ノートの式を1行ずつ見なおして、どの行でまちがえたかを見つければいいのです。

りょう かず 量と数

- ? 「5」と「5m」は、何がちがうのかな？
- ? 「0℃」は、温度が「ない」という意味？
- ? ピザ2枚を3人で分けると、1人分は？



かず
数には「かぞえる数」と「はかる数」があるよ。この部では、
りょう かず か
量を数で書くための、いちばん大事なきまりを学ぶよ。

この部^ぶで学^{まな}ぶこと

2-1 「かぞえる数^{かず}」と「はかる数^{かず}」

 ★★★★★ P.18

「5」だけでは、何^{なん}のことかわからない

2-2 マイナスの数^{かず}と数直線^{すうちよくせん}

 ★★★★★ P.38

0℃より寒^{さむ}いときは、どう書^かく？

2-3 + - × ÷ は、何^{なに}を表^{あらわ}しているの？

 ★★★★★ P.60

かけ算^{ざん}の答え^{こた}は、長^{ちよう}方^{ほう}形^{けい}の広^{ひろ}さ？

2-4 分^{ぶん}数^{すう}と小^{しょう}数^{すう}の計^{けい}算^{さん}

 ★★★★★ P.76

ピザ^{まい} 2 枚^{まい}を 3 人^{にん}で分^わけると、1 人^{にん}分^{ぶん}は何^{なん}枚^{まい}？

2-5 比^ひ・割^{わり}合^{あい}・百^{ひゃく}分^{ぶん}率^{りつ}

 ★★★★★ P.104

「100 %」をこえることはある？

2-6 はかった数^{かず}には「ずれ」がある

 ★★★★★ P.122

同^{おな}じ物^{もの}を 10 回^{かい}はかると、ぜんぶ同^{おな}じになる？

この部^ぶを読^よむと…

「5 m」の「m」には、計^{けい}算^{さん}の答^{こた}えが正^{ただ}しいかをたしかめる力^{ちから}があります。この部^ぶで身^みにつける「量^{りよう} = 数^{かず} × 単^{たん}位^い」の見^み方^{かた}と、マイナ^{ふん}ス・分^{ぶん}数^{すう}・割^{わり}合^{あい}の計^{けい}算^{さん}は、最^{さい}後^ごの巻^{かん}まで使^{つか}いづづけます。



2-1

「かぞえる数」と「はかる数」

この章の先に 2-3 2-6 2-10


この章でできるようになること

- ★ 「かぞえる数」と「はかる数」のちがいを説明できる。
- ★ 量を「数値×単位」で表し、単位をかえて表せる。
- ★ 小数の位がわかり、10 倍・ $\frac{1}{10}$ で小数点を動かせる。

? はてな?

ソラから、スマホにメッセージがとどきました。「駅まで、あと5!」この「5」で、ソラがいつ着くか、わかるかな?

どの「5」かな?



5 分?
もうすぐ着く

5 km?
ある歩くと1時間より長い


5 駅?
電車で10分くらい

思い出そう この章で使う、前に学んだこと

- 1-8 長さは「1 cm のいくつつ分」で表す。1 m = 100 cm、1 cm = 10 mm
- 1-9 1 kg = 1000 g、1 L = 10 dL = 1000 mL
- 1-16 1 を 10 等分した 1 つ分が 0.1。1 mm = 0.1 cm

△ やってみよう 筆箱の中を、かぞえる・はかる

- 1 筆箱の中のえんぴつの本数を数えよう。
- 2 いちばん長いえんぴつの長さを、mm の目もりまで読もう。
- 3 本数と長さ。7.5 のような数になることがあるのは、どっち？



🔍 すうがく どうぐ 数学の道具

1 とびとびの数と、切れ目のない数

△ やってみよう で、えんぴつは「7本」のように数えられ、「7.5本」はありません。でも、長さは、14 cm と 15 cm のあいだの 14 cm 3 mm でした。





図1 本数は点で、長さは切れ目のない線で表せる。

人数や本数のように、1つ、2つ、…と数えて表す数を、この本ではかぞえる数とよびます。長さ・重さ・時間のようにはかって表す数ははかる数です。はかる数は切れ目がなく、目もりを細かくすれば、小数でいくらでも細かく表せます。


時間でもたしかめてみましょう。50 m 走のタイムを、1秒ごとにしか表示しない時計ではかると「9秒」。 $\frac{1}{10}$ 秒まで表示するストップウォッチなら「8.7秒」。もっと細かいものなら「8.73秒」。はかる道具の目もりを細かくするほど、小数のけたがふえていきます。



かぞえる数か、はかる数かを見分けるには、「7.5本」「0.5人」のような、とちゅうの数になることがあるかを考えます。とちゅうの数にならないのが、かぞえる数です。

② 量 = 数値 × 単位


5 m のテープを、1 m ずつに切ってみましょう。



5 m は、1 m が 5 つ分の長さです。もとにする大きさ (1 m) を単位、その何ぶんかを表す数 (5) を数値といいます。

$$5 \text{ m} = 5 \times 1 \text{ m} \quad (\text{量} = \text{数値} \times \text{単位})$$

なぜ「×」なのでしょう。1 m が 5 つ分なので、 $1 \text{ m} + 1 \text{ m} + 1 \text{ m} + 1 \text{ m} + 1 \text{ m}$ です。同じ数を何回もたすことは、かけ算で書けました (1-12)。だから $1 \text{ m} \times 5$ です。かけ算は入れかえても答えが同じなので (1-13)、 $5 \times 1 \text{ m}$ とも書けます。物理では、数値を前、単位を後ろに書くやくそくです。



かさでも同じです。1 L ますで 3 ばい分の水は、1 L が 3 つ分なので、 $3 \text{ L} = 3 \times 1 \text{ L}$ 。単位は 1 L、数値は 3 です。

② はてな？ の「あと 5」には、^{たん い}単位がありませんでした。だから、^{ぶん}5 分なのか 5 km なのか、わからなかったのです。^{りょう}量は、^{すう ち}数値と^{たん い}単位がそろって、はじめて^{つた}伝わります。

③ ^{たん い}単位をかえると、^{すう ち}数値が変わる

^{おな}同じ^け消しゴムの^{なが}長さを、1 cm と 1 mm で^{かぞ}数えてみましょう。




図 2 ^{おな}同じ長さでも、^{たん い}単位が小さいと^{すう ち}数値が^{おお}大きくなる。

1 cm で^{かぞ}数えると 4 ^{ぶん}こ分、1 mm で^{かぞ}数えると 40 ^{ぶん}こ分。^{なが}長さは^{おな}同じなのに、^{すう ち}数値は 4 と 40 です。1 cm の 1 こが、1 mm の 10 こになるからです。式で書くと、

$$\begin{aligned}
 4 \text{ cm} &= 4 \times 1 \text{ cm} && (\text{量} = \text{数値} \times \text{単位}) \\
 &= 4 \times 10 \text{ mm} && (1 \text{ cm を、同じ量の } 10 \text{ mm におきかえる}) \\
 &= 40 \text{ mm}
 \end{aligned}$$

^{たん い}単位をかえるときは、^{たん い}単位を^{おな}同じ^{りょう}量におきかえます。

反対に、40 mm を cm にするときはどうでしょう。10 mm が集まると 1 cm になります。40 は 10 が 4 つ分なので、

$$\begin{aligned} 40 \text{ mm} &= 4 \times 10 \text{ mm} && (40 \text{ は } 10 \text{ の } 4 \text{ つ分}) \\ &= 4 \times 1 \text{ cm} && (10 \text{ mm を、同じ量の } 1 \text{ cm におきかえる}) \\ &= 4 \text{ cm} \end{aligned}$$

同じ考え方なら、どんな単位でもかえられます。大きい単位から小さい単位にすると数値は大きくなり、小さい単位から大きい単位にすると数値は小さくなります。量（消しゴムの長さ）は、どちらでも同じです。

④ $\frac{1}{10}$ の位、 $\frac{1}{100}$ の位

ソラの身長は 1 m と 45 cm。m だけで表すと、何 m かな？ 45 cm は 1 m より短いので、1 m を細かく分けて考えます。


① 1 m を 10 等分する

1 m (100 cm) を 10 等分すると、1 つ分は $100 \div 10 = 10$ で 10 cm。1 を 10 等分した 1 つ分は 0.1 でした (1-16)。だから、10 cm = 0.1 m です。

② 0.1 m を、さらに 10 等分する

10 cm をさらに 10 等分すると、1 つ分は $10 \div 10 = 1$ で 1 cm。0.1 を 10 等分した 1 つ分の数を **0.01** と書き、「れい点れい一」と読みます。だから、1 cm = 0.01 m です。


たて 1 列 : 0.1




大きな正方形を 1 とします。たてに 10 列に分けた 1 列が 0.1、それをさらに 10 に分けた 1 ますが 0.01 です。0.01 が 10 こで 0.1、0.1 が 10 こで 1。だから、0.01 が 100 こで 1 です。0.01 は、1 を 100 等分した 1 つ分でもあります (1 m の中に 1 cm は 100 こ)。

③ 45 cm を m で表す

45 cm = 40 cm + 5 cm と分けます。40 cm は 10 cm (0.1 m) が 4 こで 0.4 m。
5 cm は 1 cm (0.01 m) が 5 こで 0.05 m。合わせて 0.45 m です。ソラの身長
は、1 m + 0.45 m で **1.45 m** (いってんよんごメートル) です。



1 が 1 こ : 1



0.1 が 4 こ : 0.4

0.01 が 5 こ : 0.05

$$1 + 0.4 + 0.05 = 1.45$$

図 3 1.45 は、1 が 1 こ、0.1 が 4 こ、0.01 が 5 こ。

数直線でも見てみましょう。1 と 2 のあいだを 10 等分した 1 目もりが 0.1、
1.4 と 1.5 のあいだをさらに 10 等分した 1 目もりが 0.01 です。




図 4 上は 1 目もり 0.1 m、下は 1 目もり 0.01 m

いち くらい 一の位	$\frac{1}{10}$ くらい の位	$\frac{1}{100}$ くらい の位
1	4	5
1 m が 1 こ	0.1 m が 4 こ	0.01 m が 5 こ

1 m が 1 こ、0.1 m が 4 こ、0.01 m が
5 こで、**1.45 m**。数字を書く場所 (位)
で、0.1 が何か、0.01 が何かを表
しています。

小数点のすぐ右を $\frac{1}{10}$ の位 (小数第 1 位)、その右を $\frac{1}{100}$ の位 (小数第 2 位)
といいます。 $\frac{1}{10}$ は「10 分の 1」と読み、1 を 10 等分した 1 つ分 (0.1) のこと
です。 $\frac{1}{100}$ は「100 分の 1」で、0.01 のことです。

1.45 は、0.01 を何こ集めた数？

1 は 0.01 が 100 こ。0.4 は 0.1 が 4 こで、0.1 は 0.01 が 10 こなので、0.01 が $4 \times 10 = 40$ こ。0.05 は 0.01 が 5 こ。合わせて $100 + 40 + 5 = 145$ で、145 こです。単位で考えても同じです。1.45 m = 145 cm で、1 cm = 0.01 m なので、0.01 m が 145 こです。

5 10 倍すると、小数点が右へ 1 つ

1.45 m を cm で表しましょう。1 m は 100 cm なので、1.45 m は 100 cm の 1.45 ぶん分です。1.45 $\times$ 100 を求めればよいのです。まず、10 倍するとどうなるかを考えます。


① 10 倍すると、なぜ位が 1 つ上がるの？

1.45 m のテープを 10 本つなぐと考えます。位ごとに分けて、それぞれを 10 倍します。

1 本の中み	10 本分	わけ
1 m	10 m	1 が 10 こで 10。一の位の 1 が、十の位へ。
0.4 m (0.1 が 4 こ)	4 m	0.1 が 40 こ。0.1 が 10 こで 1 なので、4。
0.05 m (0.01 が 5 こ)	0.5 m	0.01 が 50 こ。0.01 が 10 こで 0.1 なので、0.5。

表 1 10 こ集まると、1 つ上の位の 1 になる。

合わせて $10 + 4 + 0.5 = 14.5$ で、14.5 m。どの位の数も、10 こ集まると 1 つ上の位の 1 になります (22 ページ)。だから、10 倍すると、どの数字も位が 1 つ上がるのです。



10 倍すると、どの数字も位が1つ上がります。数字の並び (1, 4, 5) はそのまま、小数点 (赤い点) が右へ1つ動いたように見えます。

② 100 倍、1000 倍

100 = 10 × 10 なので、100 倍は 10 倍を 2 回することです。1.45 → 14.5 → 145 なので、1.45 m = 1.45 × 100 cm = 145 cm。1000 = 10 × 10 × 10 なので、1000 倍は 10 倍を 3 回。小数点は右へ 3 つ動きます。

電卓で「1.45 × 10 =」とおすと 14.5、つづけて「× 10 =」とおすと 145。数字の並びはそのまま、小数点の場所だけがかわります。

× 10 14.5

× 10 145

③ $\frac{1}{10}$ にする (10 でわる) と、位が1つ下がる

反対に、 $\frac{1}{10}$ にする (10 でわる) と、どの数字も位が1つ下がり、小数点が左へ1つ動きます。1 を 10 等分すると 0.1、0.1 を 10 等分すると 0.01 だったからです。145 cm を m にするときは、100 cm が 1 m なので、100 でわります。145 → 14.5 → 1.45 で、1.45 m。もともにもどりました。

④ 数字のない位には 0 を書く

0.4 を 100 倍すると、0.4 → 4 → 40。一の位に数字がなくなるので、0 を書きます。35 を 100 でわると、35 → 3.5 → 0.35。一の位があくので、0 を書きます。




図5 赤い 0 は、あいた位に書きたした 0。

🔍 もっと知りたい ★

かぞえる数なのに、小数？

日本の1つの家に住む人の数は、平均すると約2.2人です（2020年）。たくさんの家の人数をならした数（平均、2-6）なので、小数になります。2.2人の家があるわけではありません。

「重さ」と「質量」

この章では、kgやgではかる量を、ふだんのことばで「重さ」とよびました。理科や物理では、この量を「質量」といいます（2-10）。質量は、月へ持っていっても変わりません。

たいせつ

量 = 数値 × 単位。量は、数値と単位をそろえて書く。

単位をかえるときは、単位を同じ量におきかえる。

10倍すると小数点は右へ1つ、 $\frac{1}{10}$ にすると左へ1つ動く。

📖 この章で出てきたことば

かぞえる数 1つ、2つ、…と数えて表す数。人数・本数など。とびとびの数。

はかる数 長さ・重さ・時間など、はかって表す数。切れ目がない。

単位 量をはかるときの、もとにする大きさ。m、kg、L、秒など。

数値 量が単位の何こ分かを表す数。

れいだい 例題でたしかめよう

れいだい 例題 1 かぞえる数か、はかる数か

つぎ りょう 次の量は、かぞえる数・はかる数のどちらで表すでしょう。

- (1) ノートの冊数 (2) お茶の量 (3) 50m 走のタイム
(4) クラスの人数 (5) 体温

かんが 考え方 0.5 のような、とちゅうの数になることがあるかを考えます。

- しき** (1) 「2.5 冊」のノートはない。 (2) 「0.5 L」のお茶はある。
(3) 「8.7 秒」のタイムはある。 (4) 「30.5 人」のクラスはない。
(5) 「36.5 °C」の体温はある。

こたえ (1) かぞえる数 (2) はかる数 (3) はかる数 (4) かぞえる数 (5) はかる数

じぶんでこう 1

つぎ りょう 次の量は、かぞえる数・はかる数のどちらで表すでしょう。

- (1) 教室のいすの数 (2) ランドセルの重さ (3) 金魚の数
(4) プールの深さ (5) 家族の人数

1
例題2 単位をかえる

- (1) 3m は何^{なん} cm? (2) 4000g は何^{なん} kg?
(3) 3m のテープを 1cm ずつに切^きると何本^{なんぼん}? 1mm ずつなら何本^{なんぼん}?

かんが かんた 考え方 (1) は 1m を、同じ量^{おな りょう}の 100 cm におきかえます。(2) は、4000 が 1000 の 4 つ分^{ぶん}なので、まず $4 \times 1000\text{g}$ と書き、1000g を 1kg におきかえます。(3) の本数^{ほんすう}は「3m が 1cm の何^{なん}こ分^{ぶん}か」なので、cm で表^{あらわ}したときの数値^{すうち}です。

しき (1) $3\text{m} = 3 \times 1\text{m} = 3 \times 100\text{cm} = 300\text{cm}$

(2) $4000\text{g} = 4 \times 1000\text{g} = 4 \times 1\text{kg} = 4\text{kg}$

(3) (1) から 3m は 300 cm。1cm が 300 分^{ぶん}。

$300\text{cm} = 300 \times 10\text{mm} = 3000\text{mm}$ 。1mm が 3000 分^{ぶん}。

こたえ (1) 300 cm (2) 4 kg (3) 300 本^{ほん}、3000 本^{ほん}


じぶんでとこう2

- (1) 6L は何^{なん} mL? (2) 500 cm は何^{なん} m?
(3) 4m のひもを 1cm ずつに切^きると何本^{なんぼん}? 1mm ずつなら何本^{なんぼん}?

例題3 cm と mm がまざった長さ

㊦ やってみよう のえんぴつの長さ 14 cm 3 mm を、(1) cm だけ、(2) mm だけで表しましょう。

考え方 14 cm 3 mm は、14 cm と 3 mm をつないだ長さです。どちらかの単位にそろえてから、たします。1 mm は 0.1 cm (1-16)、1 cm は 10 mm です。



しき (1) $3 \text{ mm} = 3 \times 0.1 \text{ cm} = 0.3 \text{ cm}$ なので、

$$14 \text{ cm} + 0.3 \text{ cm} = 14.3 \text{ cm}$$

(2) $14 \text{ cm} = 14 \times 10 \text{ mm} = 140 \text{ mm}$ なので、

$$140 \text{ mm} + 3 \text{ mm} = 143 \text{ mm}$$


こたえ (1) 14.3 cm (2) 143 mm

じぶんでところ3

(1) 9 cm 4 mm を、mm だけと cm だけで表しましょう。(2) 2 m 35 cm を、cm だけと m だけで表しましょう。

1
例題4 ものさしのめもりを読む

図のクレヨンの長さを、(1) ○ cm ○ mm、(2) cm だけ、(3) mm だけで表しましょう。




考え方 0 のめもりから、はしまでを読みます。数字のついた長いめもりが1 cm ごと、短いめもり1つが1 mm です。中くらいのめもりは5 mm です。

- しき** (1) 7 cm のめもりをこえて、小さいめもりが8つ。7 cm 8 mm
 (2) 8 mm = 0.8 cm なので、7 cm + 0.8 cm = 7.8 cm
 (3) 7 cm = 70 mm なので、70 mm + 8 mm = 78 mm

こたえ (1) 7 cm 8 mm (2) 7.8 cm (3) 78 mm

じぶんでこう4

図の消しゴムの長さを、(1) ○ cm ○ mm、(2) cm だけ、(3) mm だけで表しましょう。



 例題 5 小数の位と 10 倍

2.53 m について答えましょう。(1) 5 は何の位の数字で、何が何こあることを表していますか。(2) 2.53 は 0.01 を何こ集めた数ですか。(3) 2.53 を 10 倍、100 倍した数と、 $\frac{1}{10}$ にした数を求めましょう。

かんが 考え方 位ごとに分けると、2 は 1 m が 2 こ、5 は 0.1 m が 5 こ、3 は 0.01 m が 3 こ。10 倍で小数点は右へ 1 つ、 $\frac{1}{10}$ で左へ 1 つ動きます。

しき (1) 小数点のすぐ右の数字なので、 $\frac{1}{10}$ の位。

(2) 1 は 0.01 の 100 こなので、2 は 200 こ。0.1 は 0.01 の 10 こなので、

0.5 は 50 こ。0.03 は 3 こ。 $200 + 50 + 3 = 253$

(3) $2.53 \times 10 = 25.3$ (右へ 1 つ)

$2.53 \times 100 = 253$ (右へ 2 つ)

$2.53 \div 10 = 0.253$ (左へ 1 つ。一の位に 0 を書く)

こたえ (1) $\frac{1}{10}$ の位。0.1 m が 5 こ (2) 253 こ (3) 25.3、253、0.253

 じぶんでとこう 5

4.07 kg について、**例題 5** の (1) ~ (3) と同じことに答えましょう。

(1) は 7 について答えま。 ($\frac{1}{10}$ の位の 0 は、0.1 kg が 0 こ、ということとです。)

例題6 小数のある量の単位をかえる

1.25 kg を g で、350 g を kg で表しましょう。


考え方 1 kg = 1000 g です。kg を g するには 1000 倍、g を kg にするには 1000 でわります。1000 = 10 × 10 × 10 なので、小数点は3つ動きます。

しき 1.25 kg = 1.25 × 1000 g

1.25 → 12.5 → 125 → 1250 (右へ3つ。最後は0を書く)

1000 g で 1 kg なので、350 を 1000 でわる

350 → 35 → 3.5 → 0.35 (左へ3つ。一の位に0を書く)



こたえ 1250 g、0.35 kg

じぶんでとこう6

2.4 L を mL で、85 cm を m で表しましょう。

 例題 7 単位をそろえてくらべる

- (1) 1.5 m のロープと 120 cm のロープ。長いのはどちらでしょう。
- (2) 0.9 m、95 cm、880 mm の 3 本のひもを、長い順にならべましょう。
- かんが 考えた方** 単位を cm にそろえてから、数値をくらべます。数値だけをくらべてはいけません (150 と 120、1.5 と 120 はくらべられない)。

1.5 m (150 cm)

120 cm

- しき** (1) $1.5 \text{ m} = 1.5 \times 100 \text{ cm} = 150 \text{ cm}$
 150 cm と 120 cm では、150 のほうが大きい。
- (2) $0.9 \text{ m} = 0.9 \times 100 \text{ cm} = 90 \text{ cm}$
 10 mm で 1 cm なので、 $880 \div 10 = 88$ で 88 cm
 95、90、88 の順に大きい。
- こたえ** (1) 1.5 m のロープ (2) 95 cm、0.9 m、880 mm

 じぶんでこう 7

- (1) 0.8 kg のメロンと 750 g のメロン。重いのはどちらでしょう。
- (2) 2.3 m、225 cm、2400 mm を、長い順にならべましょう。

⚠ まちがえやすいところをチェック

⚠ まちがえやすいところ

こた たん い
答えに単位をつけない

✕ 3m は何 cm? こたえ 300

○ 3m は何 cm? こたえ 300 cm

「300」だけでは、cm なのか m なのかわかりません (? はてな? の「あと5」と同じ)。

⚠ まちがえやすいところ

かけるのか、わるのかを逆にする

✕ $3\text{ m} = 3 \div 100\text{ cm} = 0.03\text{ cm}$

○ $3\text{ m} = 3 \times 100\text{ cm} = 300\text{ cm}$

cm は m より小さい単位なので、数値は大きくなるはず。答えの大きさを確かめよう。

⚠ まちがえやすいところ

たん い すう ち
単位がちがうまま、数値だけくらべる

✕ 1.5 m と 120 cm。120 のほうが大きいので、120 cm が長い。

○ $1.5\text{ m} = 150\text{ cm}$ 。150 と 120 で、1.5 m が長い。

1.5 は「1m の 1.5 ぶん」、120 は「1cm の 120 ぶん」。もとにする大きさ (単位) がちがう数値は、そのままではくらべられません。

⚠ まちがえやすいところ


しょうすうてん うご
小数点を動かすとき、0 をわすれる

✕ $0.4\text{ m} = 4\text{ cm}$ (みぎ 右へ1つしか動かしていない)

○ $0.4\text{ m} = 0.4 \times 100\text{ cm} = 40\text{ cm}$ (みぎ 右へ2つ)

100 倍は右へ2つ。数字のない位には0を書きます ($0.4 \rightarrow 4 \rightarrow 40$)。

🔗 物理・工学ではこう使う



せつけいず すんぽう 設計図の寸法

かぐ きかい せつけいず なが
家具や機械の設計図では、長さをすべて
mm で書き、単位は書かないやくそくで
す。図の 1800 は、 $1800\text{ mm} = 1.8\text{ m}$ 。
たんい 単位をそろえておくので、だれがよ
読んでも、まちがえずにぶひん つく
部品を作れます。

けいき ひょうじ 計器の表示

でんし
電子はかりの「0.350 kg」と「350 g」は同じ
りょう 量です。けいき よ
計器を読むときは、まずひょうじ たんい
表示の単位
をみ 見ます。たんい み お
単位を見落とすと、1000 倍もまち
がえてしまいます。

🔍 コラム 昔の日本の長さの単位

いっすんぽう し すん やく
「一寸法師」の1寸は約3 cm、10 寸の1尺は約30 cm。たけ ふえ しゃくはち
竹の笛「尺八」
は、1尺8寸(約55 cm)の長さからなまえ
名前がつけました。たんい
単位がかわって
も、なが おな
長さそのものは同じです。



しょうまつもんだい
章末問題

2-1 のまとめ

き ほん
基本



1 つぎ りょう かず かず あらわ
次の量は、かぞえる数・はかる数のどちらで表すでしょう。

- (1) 体重 (2) 本のページ数 (3) 教室の温度 (4) 自転車の台数

2 つぎ りょう たん い あらわ
次の量を、[] の単位で表しましょう。

- (1) 6 m [cm] (2) 5 cm [mm] (3) 3000 mL [L] (4) 2 kg [g]


3 3.82 m の 8 と 2 は、それぞれ何が何こあることを表していますか。また、3.82 は 0.01 を何こ集めた数ですか。

4 0.57 と 4.3 を、それぞれ 10 ばい ばい かず $\frac{1}{10}$ にした数を求めましょう。

5 つぎ りょう たん い あらわ
次の量を、[] の単位で表しましょう。

- (1) 2.6 m [cm] (2) 0.75 L [mL] (3) 480 g [kg] (4) 35 mm [cm]

6 ず なが
図のえんぴつの長さを、(1) ○ cm ○ mm (2) cm だけ (3) mm だけで表しましょう。



チャレンジ ★

7 2 m のリボンを、1 cm ずつに切ると、何本になりますか。1 mm ずつに切ると、何本になりますか。


8 (1) 2.1 m と 205 cm では、どちらが長いでしょう。(2) 1.3 m、128 cm、1350 mm の3本のひもを、長い順にならべましょう。

9 右の本だなの設計図（単位は mm）を見て答えましょう。

(1) 高さは何 m ですか。

(2) たなとたなのあいだ (250) は何 cm ですか。

(3) 横はばは何 m ですか。



✓ ふりかえり できるようになったかな？

- ☐ 「かぞえる数」と「はかる数」のちがいを説明できる。 → 19 ページ
- ☐ 量を「数値×単位」で表し、単位をかえて表せる。 → 20 ページ
- ☐ 小数の位がわかり、10 倍・ $\frac{1}{10}$ で小数点を動かせる。 → 22 ページ

チェックがつかなかったところは、→のページにもどって、もう一度読んでみよう。



ミナ

答えに単位をつけると、大きさが合っているかも確かめられるね。

2-2

マイナスの数と数直線


この章の先に 1-3 1-6 1-11 この章の先に 2-3 3-2 4-10 5-5

この章でできるようになること

- ★ 0 より小さい数を負の数で表し、数直線にかける。
- ★ 不等号 ($<$ ・ $>$ ・ $\leq$ ・ $\geq$) で、数の大きさをくらべられる。
- ★★ 正の数・負の数の $+$ $-$ $\times$ $\div$ の計算ができる。

？ はてな？


冬の朝、校庭の温度計を見ると、赤い液の先が、0 の目もりより3目もり下にありました。昼には、0 より3目もり上になりました。0℃ は、温度が「ない」という意味かな？ 0 より下の温度は、どう書けばいいのかな？



第1巻の最後のカード「0 より小さいかずっとある？」の答えも、この章でわかります。

△ やってみよう 氷に塩をかけて、温度をはかろう

- 1 コップに氷と少しの水を入れて、温度をはかろう。
- 2 氷に塩をたくさんかけて、よくまぜよう。
- 3 1分ごとに温度を読み、ノートの表に書こう。0の目もりより下になったら、どう書けばいいかな？



冷たくなるので、コップを長くさわらないようにしましょう。

◎ 思い出そう この章で使う、前に学んだこと

- 1-6 数直線は、右へ行くほど大きい。たし算は右へ、ひき算は左へ進む。
- 1-5 「かわった量」は、あとーまえで求める。
- 1-12 かけ算は「1つ分の数×いくつつ分」。わり算はかけ算の逆（1-14）。

🏠 すうがく 数学の道具


1 0より小さい数

△ やってみよう では、塩をかけた氷が、0の目もりより10目もりほど下まで冷えたはずです。

0℃は、温度が「ない」という意味ではありません。水がこおる温度は、だれでもたしかめられます。そこで、この温度を、目もりの数を決めるもとの場所（基準）にして、0と決めたのです。0℃より寒い日も、ちゃんと温度があります。

基準より低い温度は、マイナス（-）をつけて-10℃と書き、「マイナス10度」と読みます（天気予報では「氷点下10度」ともいいます）。🔍 はてな？ の

あさ おん ど ひる め
朝の温度は -3°C 、昼は 3°C です。どちらも 0 から 3 目もりはなれていますが、むき が はんたい です。



たてもの おな かい ゆか じ めん
建物でも同じです。1階の床（地面）を基準の 0 にします。1つの階の高さを 4m とすると、2階の床は 4m 、地下1階の床は -4m 、地下2階の床は -8m 。エレベーターのボタンの「B1」は、地下1階のことです。

おん ど たてもの きじゆん うえ した あらわ りょう
温度や建物のほかにも、基準を 0 にして、上を +、下を - で表す量があります。

	きじゆん 基準 (0)	きじゆん より うえ 基準より上	きじゆん より した 基準より下
き おん 気温	みづ が おおる おん ど 水がこおる温度	3°C	-3°C
と ち たか 土地の高さ	かい めん 海面	ふ じ さん 富士山 3776m	し かい やく 死海 約 -430m
たてもの たか 建物の高さ	じ めん 地面	かい ゆか 2階の床 4m	ち か かい ゆか 地下1階の床 -4m
ちょきん かた 貯金のふえ方	いま きんがく 今の金額	はい える 入る： $+500$ 円	つか える 使う： -300 円

0 より 大きい 数を **正の数**、0 より 小さい 数を **負の数** といいます。正の数は $+3$ （プラス 3）のように + をつけることもありますが、ふつうは 省いて 3 と書きます。0 は、正の数でも 負の数でもありません。

2 すうちよくせん ひだり 数直線を左へのばす

おん ど けい みぎ うえ みぎ した ひだり すうちよくせん ふ かず
温度計を右へたおすと、上が右、下が左になり、数直線になります。負の数は、0 の左にならびます。1 目もりの長さは、0 の右も左も同じです。




図 1 右へ行くほど大きく、左へ行くほど小さい。

-5 と -2 では、どちらが大きいかな？ -5 は -2 より左にあるので、-5 のほうが小さい数です。温度で考えても、-5℃のほうが-2℃より寒い（温度が低い）ですね。負の数では、0 から遠いほど小さくなります。

小数の負の数もあります。-2.5 は、-2 と -3 のちょうどまん中です（図のむらさきの点）。

3 大きさをくらべる記号：不等号

「-5 は -2 より小さい」を、記号で $-5 < -2$ と書きます。「3 は -1 より大きい」は $3 > -1$ です。記号の口が開いているほうに、大きい数を書きます。<、> を不等号といいます。-5 < -2 は「-5 は -2 より小さい」と読みます。

身長 120 cm 以上の人が乗れます

120 cm ちょうどの人に乗れるかな？「120 以上」は、120 と、120 より大きい数です。

120 ちょうどもふくむので、乗れます。

「ちょうど」をふくむかどうかで、ことばと記号がかわります。 $\geq$ は > と、「等しい」の = を合わせた形です。下の線が「ちょうどその数もふくむ」という印です。

ことば	記号	3 をふくむ？
3 以上（3 と、3 より大きい）	$\square \geq 3$	ふくむ
3 以下（3 と、3 より小さい）	$\square \leq 3$	ふくむ
3 より大きい（3 をこえる）	$\square > 3$	ふくまない
3 未満（3 より小さい）	$\square < 3$	ふくまない

数直線にかくと、下のようになります。●はその数をふくむ、○はふくまない、という印です。





図2 ●はふくむ、○はふくまない。

…、-2、-1、0、1、2、…のような数を整数といいます。0.5や-2.5や $\frac{1}{2}$ のように、整数と整数のあいだにある数は、整数ではありません。

$0 < \square < 6$ は、「 $0 < \square$ （ $\square$ は0より大きい）」と「 $\square < 6$ （ $\square$ は6より小さい）」の2つを、まん中の $\square$ でつないで、1行にしたものです。 $\square$ の数は、0と6のあいだにあります（上の図のいちばん下）。

物理の本では、 $\square$ のかわりに x や a のような文字を使います（文字は2-11でくわしく学びます）。 $0 < x < 6$ は「 x は0より大きく6より小さい」、 $a > 0$ は「 a は正」、 $a < 0$ は「 a は負」と読みます。

④ +の向きは、自分で決める

東西にのびる道で、ソラは東へ3m、ミナは西へ3m歩きました。東を+と決めると、ソラは+3m、ミナは-3mです。西は東の反対の向きなので、マイナスをつけるのです。





図3 東を+と決めると、西向きはマイナスで表す。

西を^{にし}と決めれば、ソラが^き -3 、ミナが^き $+3$ になります。どちらを^かにしてもかまいません。でも、とちゅうで^か変えると、^{こた}答えがめちゃくちゃになります（56ページのまちがえやすいところ）。

マイナスは「^{はんたい}反対の^む向き」を表す。^{あらわ} $+$ の^む向きは、はじめに^き決めて^か変えない。これが^{だいじ}大事なきまりです。

⑤ たし算は、数直線の上の動き

朝の^{あさ}気温は^き -3°C 。昼までに^{ひる} 5°C 上がり、夜までに^{よる} 4°C 下がりました。昼と夜の^{よる}気温は何^き $^{\circ}\text{C}$ かな？ 数直線の上で動いてみよう。



① 正の数をたす

5°C 上がることは、 $+5$ です。たし算は右へ進むことでした（1-6）。 $(-3) + 5$ は、 -3 から^{みぎ}右へ^{すす}5進んで2。昼の^{ひる}気温は^き 2°C です。

② 負の数をたす

4°C 下がることは、「上がる」の^{はんたい}反対なので、 -4 と表します。それを^{あらわ}たすので、 $2 + (-4)$ と書きます。「 -4 を^かたす」は「^{みぎ}右へ^{すす} -4 進む」こと。マイナスは^{はんたい}反対の^む向きなので、「^{ひだり}左へ^{すす}4進む」ことです。2から^{ひだり}左へ^{すす}4進んで -2 。夜の^{よる}気温は^き -2°C です。

負の数に負の数を^ふたすときも^ふ同じです。 $(-3) + (-2)$ は、 -3 から^{ひだり}左へ^{すす}2進んで -5 です。

③ お金でたしかめる

おこづかいを 500 円もらい (+500)、300 円使いました (-300)。お金は、 $500 + (-300) = 200$ で、200 円ふえています。500 円から 300 円使うと 200 円残るので、合っていますね。負の数をたすと、数は小さくなります。

	数直線の上で	例
正の数をたす	右へ進む	$(-3) + 5 = 2$
負の数をたす	左へ進む	$2 + (-4) = -2$

表1 たし算のまとめ

6 ひき算は、反対の数をたすこと

ひき算は左へ進むことでした (1-6)。2 - 6 は、2 から左へ 6 進んで -4 です。0 より左にも数があるので、小さい数から大きい数をひくこともできます。

では、2 - (-3) のように、負の数をひくときはどうなるでしょう。「-3 をひく」は「左へ -3 進む」こと。マイナスは反対の向きなので、「右へ 3 進む」ことです。2 から右へ 3 進んで 5 です。





図5 正の数をひくと左へ、負の数をひくと右へ進む。

本当に $2 - (-3) = 5$ になるのか、別の方法でもたしかめましょう。2 から、ひく数を 1 ずつ小さくしていきます。

しき式	2 - 3	2 - 2	2 - 1	2 - 0	2 - (-1)	2 - (-2)	2 - (-3)
こたえ	-1	0	1	2	3	4	5

表2 ひく数が 1 小さくなると、答えは 1 大きくなる。

左の4つは、今までの計算でわかります。ひく数が1小さくなるたびに、ひかれる量がへるので、答えは1ずつ大きくなっています。このならびを右へつづけると、赤い数になります。2 - (-3) = 5 で、数直線と同じ答えです。



3 と -3 のように、0 をはさんで反対がわの、0 から同じ距離にある数を、**反対の数**とよびます。

2 - (-3) と 2 + 3 は、どちらも「2 から右へ 3」で 5。2 - 6 と 2 + (-6) は、どちらも「2 から左へ 6」で -4。だから、ひくことは、**反対の数をたすことと同じ**です。

$$2 - (-3) = 2 + 3 = 5 \quad 2 - 6 = 2 + (-6) = -4$$

⑦ かわった量は「あと-まえ」


朝 -3℃ だった気温が、昼に 5℃ になりました。何℃ 上がったかな？ かわった量は「あと-まえ」で求めます (1-5)。

$$5 - (-3) = 5 + 3 = 8$$

答えは +8 で、8℃ 上がりました。温度計でたしかめると、-3 から 0 まで 3 目もり、0 から 5 まで 5 目もりで、合わせて 8 目もり上がっています。反対に、2℃ から -6℃ になったときは、

$$(-6) - 2 = (-6) + (-2) = -8$$

答えのマイナスは「下がった」という反対の向きを表し、8℃ 下がったことがわかります。



⑧ かけ算：× (-1) で向きが反対になる

① 負の数×正の数

かけ算は「1 つ分の数×いくつ分」でした (1-12)。(2) × 3 は「2 が 3 つ分」なので、(2) + (2) + (2) です。0 から左へ 2 ずつ、3 回進んで -6 です。




図6 $(-2) \times 3$ は、 -2 が3つ分。左へ2ずつ3回で -6 。

② 正の数×負の数

$3 \times (-2)$ は「3が -2 こ分」ですが、これでは意味がよくわかりません。そこで、かける数を1ずつ小さくしたならびで考えます。

しき式	3×3	3×2	3×1	3×0	$3 \times (-1)$	$3 \times (-2)$
こた答え	9	6	3	0	-3	-6

表3 かける数が1小さくなると、答えは3小さくなる。

かける数が1へるたびに、3が1つ分へるので、答えは3ずつ小さくなります。このならびをつづけると、 $3 \times (-1) = -3$ 、 $3 \times (-2) = -6$ です。 $3 \times (-2)$ と $(-2) \times 3$ は、どちらも -6 。かけ算は入れかえても答えが同じ(1-13)なので、合っています。

$3 \times (-1) = -3$ を見てください。3に -1 をかけると、3の反対の数 -3 になりました。 $\times (-1)$ は、向きを反対にするかけ算です。反対に言うと、 -3 は $3 \times (-1)$ のこと。負の数は、正の数に -1 をかけた数です($-2 = 2 \times (-1)$ 、 $-5 = 5 \times (-1)$)。




図7 $\times (-1)$ で向きが反対になる。2回で、もとの向きにもどる。

③ 負の数×負の数

$(-2) \times (-3)$ はいくつでしょう。3つの方法でたしかめます。

(ア) 時刻と場所で ミナが西へ、1秒に2mずつ走っています。東が+なので、1秒に -2 mずつ進みます。今(0秒)は0の場所にいます。3秒後は

$(-2) \times 3 = -6$ で、西へ 6m の所です。では、3 秒前はどこにいたかな？ 「後」の反対の「前」を負の数で表し、3 秒前を -3 秒として、表にします。

時刻 (秒)	-3	-2	-1	0	1	2	3
場所 (m) $(-2) \times$ 時刻	6	4	2	0	-2	-4	-6

表 4 西へ走る人は、前の時刻には東 (+) にいた。

西へ進んでいる人は、前の時刻には、今より東にいたはずで、1 秒前は東へ 2m、3 秒前は東へ 6m。だから 3 秒前は $+6$ で、 $(-2) \times (-3) = 6$ です。

(イ) ならば ②と同じように、かける数を 1 ずつ小さくします。

式	$(-2) \times 2$	$(-2) \times 1$	$(-2) \times 0$	$(-2) \times (-1)$	$(-2) \times (-2)$	$(-2) \times (-3)$
答え	-4	-2	0	2	4	6

表 5 かける数が 1 小さくなると、答えは 2 大きくなる。

-2 が 1 つ分へるので、答えは 2 ずつ大きくなります。このならばをつづけていくと、いちばん右は $(-2) \times (-3) = 6$ になります。

(ウ) $\times (-1)$ で $-2 = 2 \times (-1)$ 、 $-3 = 3 \times (-1)$ なので、

$$\begin{aligned}
 (-2) \times (-3) &= 2 \times (-1) \times 3 \times (-1) \quad (-2 \text{ と } -3 \text{ を書きかえる}) \\
 &= 2 \times 3 \times (-1) \times (-1) \quad (\text{かけ算の順番を入れかえる}) \\
 &= 6 \times (-1) \times (-1) \quad (6 \text{ を } \times (-1) \text{ で } -6、\text{もう } 1 \text{ 回で } 6) \\
 &= 6
 \end{aligned}$$

$\times (-1)$ を 2 回すると、向きが 2 回反対になって、もとの向き (+) にもどりま。3 つの方法で、同じ 6 になりました。

かけられる 数	$\times$ 正	$\times$ 負
正	+	-
負	-	+

数の前の + や - を符号といいます。かけ算の答えの符号は、同じ符号どうしなら +、ちがう符号なら - です。

3つ以上かけるときは、負の数の1つ1つが「 $\times (-1)$ 」を1回ずつ運んでく
 ると考えます。 $\times (-1)$ が2回・4回（偶数回）ならもとの向きで+、1回・3回
 （奇数回）なら反対で-です。

9 わり算も、かけ算の逆で

わり算はかけ算の逆でした（1-14）。 $6 \div 2$ は「2に何をかけると6になるか」
 で、3です。負の数でも同じように考えます。

わり算	かんが かんが 考え方	こた 答え
$6 \div 2$	$2 \times 3 = 6$ なので	3
$(-6) \div 2$	$2 \times (-3) = -6$ なので	-3
$6 \div (-2)$	$(-2) \times (-3) = 6$ なので	-3
$(-6) \div (-2)$	$(-2) \times 3 = -6$ なので	3

表6 わる数に何をかけると、わられる数になるか。

わり算の答えの符号も、かけ算と同じです。同じ符号どうしなら+、ちがう符
 号なら-。0でわることは、負の数でもできません（1-14）。

たいせつ

マイナスは反対の向き。+の向きは、はじめに決めて変えない。

$a > 0$ は正、 $a < 0$ は負。 $0 < x < 6$ は「0より大きく6より小さい」。

ひくことは、反対の数をたすことと同じ。

かけ算・わり算：同じ符号なら+、ちがう符号なら-。

この章で出てきたことば

正の数・負の数 0 より大きい数・0 より小さい数。0 はどちらでもない。

不等号 大きさをくらべる記号。<、>、≤、≥。

整数 …、-2、-1、0、1、2、…のような数。

反対の数 0 をはさんで反対がわの、0 から同じ距離にある数。3 と -3。

符号 数の前につける+と-。

例題でたしかめよう

例題1 正の数・負の数で表す

東へ 300 m 進むことを +300 m と表します。(1) 西へ 200 m 進むことは？ (2) -500 m はどんなことを表しますか。(3) はじめから西を+と決めていたら、東へ 300 m 進むことは？

考え方 +と決めた向きの反対は、マイナスで表します。

しき (1) 東が+なので、反対の西向きはマイナス。

(2) マイナスなので、+ (東) の反対の西向き。

(3) 西が+なので、反対の東向きはマイナス。

こたえ (1) -200 m (2) 西へ 500 m 進むこと (3) -300 m

じぶんでこう1

5 kg ふえることを +5 kg と表します。(1) 2 kg へることは？ (2) -3 kg はどんなことを表しますか。(3) はじめから「へる」を+と決めていたら、5 kg ふえることは？

例題2 不等号と以上・未満

(1) -5 と -2 、(2) -1.5 と 0.5 の大きさを、不等号で表しましょう。(3) -3 以上 2 未満の整数を、すべて書きましょう。

考え方 数直線で、左にあるほうが小さい。以上はその数をふくみ、未満はふくまない。



しき (1) -5 は -2 より左にある。(2) -1.5 は 0.5 より左にある。

(3) -3 はふくみ、 2 はふくまない。 -3 から 1 までの整数。

こたえ (1) $-5 < -2$ (2) $-1.5 < 0.5$ (3) $-3, -2, -1, 0, 1$

じぶんでとこう2

(1) -1 と -4 、(2) 0 と -2.5 の大きさを、不等号で表しましょう。(3) -2 より大きく 3 以下の整数を、すべて書きましょう。

例題3 たし算

(1) $(-3) + 5$ (2) $2 + (-6)$ (3) $(-3) + (-2)$

考え方 正の数をたすと右へ、負の数をたすと左へ進みます。

しき (1) -3 から右へ 5 進む。 -3 から 0 まで 3 、さらに 2 で、 2 。

(2) 2 から左へ 6 進む。 2 から 0 まで 2 、さらに 4 で、 -4 。

(3) -3 から左へ 2 進んで、 -5 。

こたえ (1) 2 (2) -4 (3) -5


じぶんでとこう 3

(1) $(-4) + 7$ (2) $3 + (-5)$ (3) $(-1) + (-6)$

例題 4 ひき算 れいだい ざん

(1) $(-1) - 4$ (2) $3 - (-2)$ (3) $(-2) - (-6)$

考え方 かんが かつ ひき算は、反対の数をたすたし算になおしてから、数直線で進みます。 はんたい かず ざん すうちよくせん すす



しき (1) $(-1) - 4 = (-1) + (-4)$ 。-1 から左へ4で、-5。 ひだり

(2) $3 - (-2) = 3 + 2$ 。3 から右へ2で、5。 みぎ

(3) $(-2) - (-6) = (-2) + 6$ 。-2 から右へ6で、4。 みぎ

こたえ (1) -5 (2) 5 (3) 4

じぶんでとこう 4


(1) $1 - 5$ (2) $(-4) - (-7)$ (3) $0 - (-3)$

1
例題5 かわった量と差

(1) $-3^{\circ}\text{C} \rightarrow 5^{\circ}\text{C}$ の変化 (2) $2^{\circ}\text{C} \rightarrow -6^{\circ}\text{C}$ の変化

(3) 最高気温が -4°C 、最低気温が -9°C の日の、最高と最低の差

考え方 かわった量は「あと－まえ」。差は「大きいほう－小さいほう」です。



しき (1) $5 - (-3) = 5 + 3 = 8$

(2) $(-6) - 2 = (-6) + (-2) = -8$

(3) -4 のほうが大きい。 $(-4) - (-9) = (-4) + 9 = 5$

こたえ (1) $+8^{\circ}\text{C}$ (8°C 上がった) (2) -8°C (8°C 下がった) (3) 5°C

じぶんでとこう5

(1) $-7^{\circ}\text{C} \rightarrow -1^{\circ}\text{C}$ の変化 (2) $4^{\circ}\text{C} \rightarrow -3^{\circ}\text{C}$ の変化

(3) 最高気温が 1°C 、最低気温が -6°C の日の、最高と最低の差

例題 6 かけ算

(1) $(-4) \times 3$ (2) $5 \times (-2)$ (3) $(-3) \times (-4)$ (4) $(-2) \times (-3) \times (-1)$

考え方 符号をのぞいて計算します。負の数1つが $\times (-1)$ 1回なので、その回数で符号を決めます。

しき (1) $4 \times 3 = 12$ 。負の数が1つ ($\times (-1)$ が1回) で－
 (2) $5 \times 2 = 10$ 。 $\times (-1)$ が1回で－
 (3) $3 \times 4 = 12$ 。 $\times (-1)$ が2回で、もとの向き (+)
 (4) $2 \times 3 \times 1 = 6$ 。 $\times (-1)$ が3回で、反対の向き (－)

こたえ (1) -12 (2) -10 (3) 12 (4) -6

じぶんでこう 6

(1) $(-6) \times 2$ (2) $3 \times (-7)$ (3) $(-5) \times (-2)$ (4) $(-1) \times 4 \times (-3)$

例題 7 わり算

(1) $(-12) \div (-3)$ (2) $(-15) \div 3$ (3) $16 \div (-4)$

考え方 「わる数に何をかけると、わられる数になるか」を考えます。符号は、かけ算と同じきまりです。

しき (1) $(-3) \times 4 = -12$ なので4。同じ符号どうしで＋
 (2) $3 \times (-5) = -15$ なので－5。ちがう符号で－
 (3) $(-4) \times (-4) = 16$ なので－4。ちがう符号で－

こたえ (1) 4 (2) -5 (3) -4

じぶんでとこう7


(1) $(-18) \div 6$ (2) $(-24) \div (-8)$ (3) $21 \div (-7)$

例題8 向きのある量のかけ算

東を+とします。西へ1秒に3mずつゆっくり進む車が、今0の場所にいます。2秒後と2秒前の場所はどこ？

考え方 1秒に-3m。時刻は、2秒後が+2、2秒前が-2です。場所=(1秒に進む量) × (時刻)。

しき 2秒後： $(-3) \times 2 = -6$ 2秒前： $(-3) \times (-2) = 6$



こたえ 2秒後は西へ6m、2秒前は東へ6m

じぶんでとこう8

上が+。1秒に2mずつ下がるエレベーターが、今高さ0の所にいます。3秒後と3秒前の高さは？

⚠ まちがえやすいところをチェック

⚠ まちがえやすいところ

ふ かず おお
負の数の大きさ

✗ $-5 > -2$ (5は2より大きいから)

○ $-5 < -2$ (-5 のほうが左。 -5°C のほうが寒い)

ふ かず とお ちい
負の数は、0から遠いほど小さくなります。

⚠ まちがえやすいところ

ふ かず
負の数をひく

✗ $4 - (-3) = 1$

○ $4 - (-3) = 4 + 3 = 7$ (-3 をひく=反対の $+3$ をたす)

「 $-$ 」が2つ続いたら、ひき算を反対の数のたし算に書きなおしてから計算します。

⚠ まちがえやすいところ

ふ かず せい かず
負の数から正の数をひく

✗ $(-3) - 2 = -1$ (3から2をひいて1にした)

○ $(-3) - 2 = (-3) + (-2) = -5$ (-3 から左へ2)

ひくと左へ進むので、答えは -3 より小さくなるはずです。

⚠ まちがえやすいところ

ふ かず
負の数どうしのかけ算

✕ $(-3) \times (-4) = -12$ (マイナスがあるから-)

○ $(-3) \times (-4) = 12$ ($\times (-1)$ が2回で、もとの向き)
たし算の $(-3) + (-4) = -7$ とまぜないようにしよう。

⚠ まちがえやすいところ

とちゅうで+の向きを変える

✕ ひがし 東へ 3m (+3)、次に つぎ にし 西へ 5m を +5 と書いて、 $3 + 5 = 8$

○ にし 西へ 5m は -5。 $3 + (-5) = -2$ で、しゅっぱつてん にし 出発点の西へ 2m
ひがし 東を+と決めたら、さいご 最後まで ひがし 東が+です。


⚠ まちがえやすいところ

み まん
「未満」に、その数を入れてしまう

✕ み まん 未満の せいすう 整数に、6 を入れる

○ はい 6 は入らない (6 以下なら入る。 $\leq$ の下の線が「等しい」)

ぶつり こうがく つか
物理・工学ではこう使う



0℃より下にも、底がある


約 -273°C より低い温度はありません。そこで科学では、このいちばん低い温度を 0 とする目もり（単位は K、ケルビン）も使います。超電導リニアには、約 -269°C （約 4 K）まで冷やして使う磁石があります。K の数は、 $^{\circ}\text{C}$ の数に約 273 をたした数です（ $-269 + 273 = 4$ 、 $0 + 273 = 273$ ）。

℃の向き

$^{\circ}\text{C}$ の目もりを決めたセルシウスは、はじめ、ふつとうする温度を 0、こおる温度を 100 にしていました。向きは決め方しだいなのです。

飛行機が飛ぶ空は、とても寒い

空気は、高い所ほど冷たくなります。旅客機が飛ぶ高さ約 10000 m では、外の気温は約 -50°C です。地上が 15°C の日なら、差は $15 - (-50) = 65$ で、約 65°C 。飛行機は、温度計（センサー）でこのマイナスの温度をはかり、窓やつばさが凍らないように温めたり、客室を暖かく保ったりしています。





しょうまつもんだい
章末問題


2-2 のまとめ

きほん
基本




1 海面より 40 m 高い所を +40 m と表します。(1) 海面より 15 m 低い所は？ (2) -120 m はどんな所ですか。

2 □に < か > を入れましょう。下の数直線を使ってもかまいません。
(1) -6 □ -1 (2) 0 □ -3 (3) -2.5 □ 2



3 (1) -4 以上 1 以下の整数を、すべて書きましょう。(2) -2 より大きく 3 未満の整数を、すべて書きましょう。ノートに下のような数直線をかいて、入る数に印をつけよう。



4 次の計算をしましょう。


(1) $(-2) + 6$ (2) $1 + (-4)$ (3) $(-3) + (-2)$
(4) $3 - 7$ (5) $(-5) - (-1)$ (6) $0 - (-4)$

5 次の計算をしましょう。

(1) $(-7) \times 3$ (2) $4 \times (-5)$ (3) $(-6) \times (-6)$
(4) $(-20) \div 4$ (5) $(-15) \div (-5)$

チャレンジ ★★

6 ある日の南極の気温は、最高が -2°C 、最低が -11°C でした。最高と最低の差は何 $^{\circ}\text{C}$ ですか。右の温度計で確かめよう。



7 上向きを+と決めます。ボールが下へ 15m 落ちたとき、高さのかわった量は何 m ですか。下向きを+と決めたら、どうなりますか。



8 次の計算をしましょう。(1) $(-2) \times 3 \times (-5)$ (2) $(-1) \times (-1) \times (-1)$

✓ ふりかえり できるようになったかな？

- ☐ 0 より小さい数を負の数で表し、数直線にかける。 → 39 ページ
- ☐ 不等号 ($< \cdot > \cdot \leq \cdot \geq$) で、数の大きさをくらべられる。 → 41 ページ
- ☐ 正の数・負の数の $+ - \times \div$ の計算ができる。 → 43 ページ

チェックがつかなかったところは、→のページにもどって、もう一度読んでみよう。



ソラ

マイナスは「反対の向き」。向きのある量は、この先、矢印（ベクトル）に育つんだって。



2-3

＋ － × ÷ は、
なに あらわ
何を表しているの？

📌 通しるべ

この章の前に

1-5

1-12

1-14

2-1

2-2

この章の先に

2-10

3-5

5-1

5-9

📌 この章でできるようになること

- ★ 同じ種類の量を、単位をそろえてたしたりひいたりできる。
- ★ ひき算で変化量を求め、 Δ を使って書ける。
- ★ わり算で速さを、かけ算で道のりを求められる。


？ はてな？

自転車^{じてんしゃ}が、1秒^{びよう}に5m^{メートル}ずつ進^{すす}みます。4秒^{びよう}では何m^{メートル}進むかな？




$5 \times 4 = 20$ で、20m ですね。この進み方を右のような図にかくと、たて5、よこ4の長^{ちやうほうけい}方形^{めんせき}ができます。面積も $5 \times 4 = 20$ 。道のり^{みち}と面積^{めんせき}が、同じ20になりました。これは、たまたまかな？

1秒に進む長さ (m)



△ やってみよう 歩く速さをくらべよう

- 1 まきじゃくで、10 m のコースと 15 m のコースをつくろう。
- 2 1 人が 10 m、もう 1 人が 15 m を、ふつうに歩こう。かかった時間を、友だちにストップウォッチではかってもらおう。
- 3 2 人の歩く速さは、どちらが速いかな？ 電卓を使って考えよう。



ソラは、かかった時間が短い。でも、歩いた道のりも短い。ミナは、道のりが長いけれど、時間も長い。このままでは、どちらが速いかくらべられません。どうすればよいかは、数学の道具③で考えます。

🕒 思い出そう この章で使う、前に学んだこと

- 1-5 ひき算で「のこり」「ちがひ」「かわった量（あとーまえ）」を求める。
- 1-12 かけ算は「1 つ分の数 $\times$ いくつ分」。わり算は同じ数ずつ分けた 1 つ分を求める（1-14）。
- 1-8 $1\text{ cm} = 10\text{ mm}$ 、 $1\text{ m} = 100\text{ cm}$ 。重さは $1\text{ kg} = 1000\text{ g}$ 、かさは $1\text{ L} = 1000\text{ mL}$ （1-9）。
- 1-21 長方形の面積 = たて $\times$ よこ。単位は cm^2 や m^2 。
- 2-1 量 = 数値 $\times$ 単位。5 m は 1 m の 5 ぶん。
- 2-2 マイナスは反対の向きを表す。数直線の上の動きで計算できる。




ミナ

道のりも時間ももちがうと、くらべにくいね。どちらかを同じにそろえられたらいいのに。

数学の道具

① たし算・ひき算は「同じ種類」どうし

2m のひもと 40cm のひもをつなぐと、何 cm かな？ 数だけを見て $2 + 40 = 42$ とすると、42 cm？ 42 m？ どちらもおかしいですね。



量は「数値×単位」でした (2-1)。2m は 1m が 2 つ、40cm は 1cm が 40 こで、1 つ分の大きさがちがいます。2 と 40 をそのままたすのは、100 円玉 2 枚と 1 円玉 40 枚をあわせて「42 枚だから 42 円」と言うようなものです。だから、単位 (1 つ分の大きさ) をそろえてからたします。

cm にそろえる 1m = 100 cm (1-8) なので、2m は 100 cm が 2 つ分で、 $100 \times 2 = 200$ より 200 cm です。

$$2\text{ m} + 40\text{ cm} = 200\text{ cm} + 40\text{ cm} = 240\text{ cm}$$

m にそろえても同じ 1cm は 1m を 100 に分けた 1 つ分で 0.01m (2-1)。だから 40cm は 0.01m が 40 こで 0.4m です。


$$2\text{ m} + 40\text{ cm} = 2\text{ m} + 0.4\text{ m} = 2.4\text{ m}$$

2.4m と 240cm は、同じ長さを別の単位で書いたものです。どちらにそろえてもかまいません。

りょう 量	たん い 単位のつながり	れい 例
なが 長さ	1 m = 100 cm, 1 cm = 10 mm	3 m = 300 cm
かさ かさ	1 L = 10 dL = 1000 mL	2 L = 2000 mL
おも 重さ	1 kg = 1000 g	1.5 kg = 1500 g


ひょう 表1 だい 1 巻 (1-8・1-9) で学んだ単位のつながり。

ひき算も同じです。では、「3 m + 2 秒」は？
なが 長さとは、たん い 単位をどうそろえても同じ種類の
りょう 量にならないので、たせません。



2 ひき算で「変化量」

あるひ 日の気温は、あさ 朝 9 時に 12°C、ひる 昼 12 時に 18°C、よる 夜 9 時に 10°C でした。
なん 何°C 変わったかな？



ず 図1 ○まえ ●あと。右へ動けばプラス、左へ動けばマイナス。

あさ 朝 → ひる 昼は $18 - 12 = 6$ で、6°C 上がりました。ひる 昼 → よる 夜は $10 - 18 = -8$ です。
マイナスは「下がった」という反対の向きを表します (2-2)。


なぜ「あとーまえ」なの？ 「まえ」の気温に、変わった分をたすと「あと」の
き おん 気温になります。

$$12 + 6 = 18, \quad 18 + (-8) = 10$$

「まえ + 変わった分 = あと」なので、変わった分は「あとーまえ」で求められま
す。こうすると、ふえたときはプラス、へったときはマイナスと、向きも答えの
なか はい 中に入ります。

このように「あとーまえ」で求めた、どれだけ変わったかを表す量を、**変化量**といいます。1-5の「かわった量」に、名前がつきました。

変化量は、ギリシャ文字の Δ (デルタ) を使って書きます。 Δ はアルファベットの D にあたる文字です。「ちがい」を表す英語 difference の頭文字も d なので、変化量のしるしに使われています。物理では、位置 (スタートから何 m のところ) に x 、時刻に t という名前をつけることがよくあります。(文字の使い方は、2-11 でくわしく学びます。)



ここで、「時刻」と「時間」のちがいに気をつけましょう。**時刻**は、ストップウォッチがその瞬間に指している数 (いつ?)。 **時間**は、2つの時刻のあいだの長さ (どれだけのあいだ?) です。



図2 時刻は数直線の上の「点」、時間は2つの点のあいだの「長さ」。

時刻の変化量 (かかった時間) は $\Delta t = 25 \text{ s} - 10 \text{ s} = 15 \text{ s}$ (s は秒の記号。second の s)、位置の変化量 (進んだ道のり) は $\Delta x = 75 \text{ m}$ です。 Δx は「 x の変化量」と読みます。 Δ と x のかけ算ではなく、2つで1つの記号です。

③ わり算で「1あたりの量」

①やってみようの2人は、「1秒あたり何m進んだか」にそろえてくらべます。10mを8秒で進んだなら、10mを8つに等しく分けた1つ分が、1秒分の道のりです(1-14)。

ソラ 10mを8秒  $10 \div 8 = 1.25$

ミナ 15mを10秒  $15 \div 10 = 1.5$


自転車 20mを4秒  $20 \div 4 = 5$

図3 こい色の1つ分が1秒分。自転車は「はてな？」の自転車。

$10 \div 8$ は、電卓で計算すると1.25です。確かめると、 $1.25 \times 8 = 10$ で、8秒分あわせるとちゃんと10mにもどります。ソラは1秒あたり1.25m、ミナは1.5m。ミナのほうが1秒に長く進むので、速いとわかります。どれも、道のりを時間でわっています。この「1秒あたりに進む道のり」を、速さといいます。


速さ = 進んだ道のり ÷ かかった時間

もう1つのそろえ方 反対に、「1mあたり何秒かかったか」にそろえても、くらべられます。ソラは $8 \div 10 = 0.8$ で1mに0.8秒、ミナは $10 \div 15 = 0.66\cdots$ で1mに約0.67秒。1mに短い時間しかかからないミナのほうが速く、答えは同じです。でもこの数は、小さいほど速いので、まちがえやすいですね。そこで、数が大きいほど速い「1秒あたりの道のり」を、速さとよぶことにしています。1秒あたり1.5mの速さを、1.5m/s(1.5メートル毎秒)と書きます。sは秒、/は÷のしるしです(1-14のコラム)。単位も数といっしょにわり算できます。

$$15\text{m} \div 10\text{s} = 1.5\text{m/s}$$

②の自転車の速さは、 $\Delta x \div \Delta t = 75\text{m} \div 15\text{s} = 5\text{m/s}$ です。とちゅうで速さが変わっても、道のり÷時間で出した速さは全体をならした速さで、平均の速さといいます(平均は2-6でくわしく学びます)。

速さのほかに、「1あたり」にそろえる
とくらべられる量があります。遊び場A
は6m²に12人、Bは8m²に20人。
どちらがこんでいるかな？



1マスが1m²

広さがちがうので、1m²あたりの人数
にそろえます。人数を広さでわります。

$$A : 12 \div 6 = 2 \quad B : 20 \div 8 = 2.5$$

1m²あたりの人数が多いBのほうが、こんでいます。この「1m²あたりの人数」をこみぐあいといいます（単位は人/m²）。速さもこみぐあいも、わり算でつくる「1あたりの量」です。

4 かけ算で「新しい量」

②はてな？ の自転車は、速さ5m/sです。4秒では、1秒分の5mが4つ分。いくつ分かを「何倍」ともいうので、5mの4倍です。

$$5 \text{ m/s} \times 4 \text{ s} = 20 \text{ m}$$


③の反対に、「1あたり」から全体をつくる計算です。

単位はどうなる？ m/sは「m ÷ s」でした。それにsをかけると、「m ÷ s × s」です。数で考えると、20 ÷ 4 × 4 = 5 × 4 = 20のように、同じ数でわってかけると元にもどります。単位も同じで、÷ s と × s で元にもどり、m だけがのこります。だから答えの単位は、道のりのmになります。

$$m/s \times s = m$$

$$\text{道のり} = \text{速さ} \times \text{時間}$$

はや
速さ (m/s)



よこ じ かん はや
横に時間、たてに速さをとります。こ
いろ ほそ ちょうほうけい
い色の細い長方形 (たて 5、よこ 1) の
めんせき
面積 $5 \times 1 = 5$ は、びょうかん すす
1 秒間に進む 5 m。
ちょうほうけい めんせき
4 つならべた長方形の面積 $5 \times 4 = 20$
は、びょうかん みち
4 秒間の道のり 20 m です。

はや じ かん
速さ $\times$ 時間も、たて $\times$ よこも、同じかけ算です。だから、速さが一定なら、速
さ じ かん ちょうほうけい めんせき すす みち
さと時間のグラフの長方形の面積が、進んだ道のりになります。【? はてな?】の
こたえは「たまたまではない」です。はや じ かん
速さを v 、時刻を t で表すことが多いので、
このグラフを v - t グラフともいいます。

たいせつ

- + 同じ種類 (おな しゅるい りょう) の量 (たん い) どうし。単位 (けいさん) をそろえてから計算する。
- 変化量 (へんかりょう) = あと - まえ (Δ で書く。マイナスにもなる)
- $\div$ 速さ (はや) = 進んだ道のり (すす みち) $\div$ かかった時間 (じ かん) (1 あたりの量 (りょう))
- $\times$ 道のり (みち) = 速さ (はや) $\times$ 時間 (じ かん)。速さが一定なら、
速さと時間のグラフ (はや じ かん) の長方形 (ちょうほうけい) の面積 (めんせき) が道のり (みち)

この章 (しやう) で出てきたことば

- 変化量 (へんかりょう) あと - まえ。 Δ で書く。
- 速さ (はや) 1 秒 (びよう) あたりに進む (すす) 道のり (みち)。 m/s
(メートル (まいびよう) 毎秒 (まいびよう))。
- こみぐあい 1 m^2 あたりの人数 (にんずう)。
- v - t グラフ 速さ (はや) と時間 (じ かん) のグラフ。

記号 (きごう) カード

初めて (はじめて) 出た章 (しやう) 2-3



読み方 (よみかた) デルタ
意味 (いみ) 変化量 (へんかりょう)。「あと - まえ」で
求める。 Δx は x の変化量 (へんかりょう)。
英語 (えいご) delta



デルタ

Δ は、ばく (なまえ) の名前 (おな) と同じ「デルタ」。第 5 巻 (だい かん) の微分 (びぶん) でも、毎 (まい) ページの
よう (で) に出てくるしるしだよ。

例題でたしかめよう

例題1 たせる？ たせない？

計算できるかな？ (1) $3\text{ m} + 40\text{ cm}$ (2) $1\text{ L} - 300\text{ mL}$
(3) $5\text{ m} + 3$ 秒

考え方 (1) は長さどうし。 $1\text{ m} = 100\text{ cm}$ を使って cm にそろえる。(2) はかさどうし。 $1\text{ L} = 1000\text{ mL}$ を使って mL にそろえる。(3) は長さとし時間。

しき (1) $3\text{ m} = 300\text{ cm}$ なので、 $300\text{ cm} + 40\text{ cm} = 340\text{ cm}$

(2) $1\text{ L} = 1000\text{ mL}$ なので、 $1000\text{ mL} - 300\text{ mL} = 700\text{ mL}$

こたえ (1) 340 cm (2) 700 mL (3) 種類がちがうので計算できない

じぶんでとこう1

計算できる？ (1) $1\text{ kg} + 250\text{ g}$ (2) $2\text{ m} - 60\text{ cm}$ (3) 10 分 + 10 m

例題2 変化量を求める

気温が、朝 -2°C → 昼 7°C → 夜 1°C と変わりました。(1) 朝 → 昼、(2) 昼 → 夜の変化量は？

考え方 あとーまえ。(1) は数直線で -2 から 7 まで右へ 9 進む (2-2)。

しき (1) $7 - (-2) = 9$ (2) $1 - 7 = -6$

こたえ (1) $+9^{\circ}\text{C}$ (上がった) (2) -6°C (下がった)

じぶんでところ 2

気温が、 $-5^{\circ}\text{C} \rightarrow 3^{\circ}\text{C} \rightarrow -1^{\circ}\text{C}$ と変わりました。2つの変化量を求めよう。

例題 3 表から変化量をくらべる

表は、ある日の気温です。気温がいちばん大きく上がったのは、どの2時間でしょう。

時刻	8時	10時	12時	14時
気温 ($^{\circ}\text{C}$)	4	9	12	11

考え方 となりどうしの時刻で、1つずつ「あとーまえ」を計算して、表に書きこむ。プラスで、いちばん大きいものをえらぶ。

しき 8時 $\rightarrow$ 10時 : $9 - 4 = 5$ 10時 $\rightarrow$ 12時 : $12 - 9 = 3$

12時 $\rightarrow$ 14時 : $11 - 12 = -1$

いちばん大きいのは $+5$

こたえ 8時から10時 ($+5^{\circ}\text{C}$)

じぶんでところ 3

水そうの水の量が、0分に10L、2分に16L、4分に25L、6分に31Lでした。いちばん多くふえたのは、どの2分間でしょう。

例題4 Δ を使って速さを求める

電車が、時刻 20 秒にスタートから 150 m、時刻 50 秒に 750 m の位置にいました。 Δt と Δx を求めて、速さを出そう。

考え方 Δt も Δx も「あと－まえ」。速さは $\Delta x \div \Delta t$ 。

しき $\Delta t = 50 \text{ s} - 20 \text{ s} = 30 \text{ s}$ 、 $\Delta x = 750 \text{ m} - 150 \text{ m} = 600 \text{ m}$

$\Delta x \div \Delta t = 600 \text{ m} \div 30 \text{ s} = 20 \text{ m/s}$ **こたえ** 速さ 20 m/s

じぶんでとこう4

水そうに水を入れています。時刻 5 分に 25 L、時刻 9 分に 61 L でした。時刻の変化量と水の量の変化量を求め、1 分あたり何 L ふえたかを出そう。

例題5 へっていくときの1あたり

雨水をためたタンクの水が、時刻 0 分に 50 L、時刻 5 分に 35 L でした。水の量の変化量と、1 分あたり何 L へったかを求めよう。

考え方 変化量は「あと－まえ」。へったので、マイナスになるはず。「1 分あたり何 L へったか」は、へった量（マイナスをとった大きさ）を時間でわる。

しき 水の量の変化量：35 - 50 = -15 (L) 時間：5 - 0 = 5 (分)

15 L へったので、15 ÷ 5 = 3

こたえ 変化量は -15 L (15 L へった)、1 分あたり 3 L へった

じぶんでとこう 5

ろうそくの長さが、時刻 0 分に 12 cm、時刻 20 分に 8 cm でした。長さの変化量と、1 分あたり何 cm へったかを求めよう。

例題 6 速さ $\times$ 時間と、グラフの面積


自転車が 3 m/s で 2 秒、2 m/s で 4 秒 走りました。何 m 進んだかな？

考え方 グラフの 2 つの長方形の面積（速さ $\times$ 時間）をたす。

しき $3 \times 2 = 6$ 、 $2 \times 4 = 8$

$6 + 8 = 14$

こたえ 14 m



じぶんでとこう 6

エアコンが、1 時間あたり 1.2 kWh で 2 時間、そのあと 0.4 kWh で 3 時間使いました。全部で何 kWh でしょう。(kWh は電気の量の単位)

⚠ まちがえやすいところをチェック

⚠ まちがえやすいところ

単位をそろえずにたす (2 m のひもと 40 cm のひもをつなぐ)

✕ $2\text{ m} + 40\text{ cm} = 42$ (42 cm? 42 m?)

○ $2\text{ m} + 40\text{ cm} = 200\text{ cm} + 40\text{ cm} = 240\text{ cm}$

1 つ分 (単位) がちがう数は、そのままたせません。答えにいつも単位を書く、まちがいに気づけます。

⚠ まちがえやすいところ

ひき算の順番がぎゃく (80 °C のお湯が 65 °C に)

✕ まえーあと $80 - 65 = 15$ (15 °C 上がった?)

○ あとーまえ $65 - 80 = -15$ (15 °C 下がった?)

ぎゃくにすると、プラスとマイナスが反対になり、冷めたのに「上がった」ことになります。

⚠ まちがえやすいところ


わる順番がぎゃく (20 m を 4 秒で進んだ速さ)

✕ $4 \div 20 = 0.2$ (0.2 m/s?)

○ $20 \div 4 = 5$ (5 m/s)


速さは「1 秒あたり」の道のり。「〇〇あたり」の〇〇 (ここでは秒) でわります。

ぶつり 物理・ こうがく 工学ではこう使う



スマートフォンの速さの表示

スマートフォンやランニング用の時計は、人工衛星からの電波で、自分の位置を1秒ごとにはかれます (GPS)。1秒で位置が3m変わったら、 $\Delta x \div \Delta t = 3 \div 1 = 3$ で、速さは3m/sと計算できます。




家の電気のメーター

使った電気の量 (電力量) は、kWh (キロワット時) という単位ではかります。1時間あたり0.6kWhを使うエアコンを5時間つけると、 $0.6 \times 5 = 3$ で3kWh。「1あたり×いくつつ分」で、電気の量がわかります。

コラム + - × ÷ は、どこへつながる？

この章の「ひき算・わり算」と「かけ算」は、工学のいちばん大事な道具に育ちます。



微分方程式を使うと、ボールの動きやお湯の冷め方を、式で表して計算できます。その始まりが、この章の「あとーまえ」と「長方形の面積」です。



しょうまつもんだい
章末問題

2-3 のまとめ

きほん
基本



1 次の計算をしましょう。答えには単位をつけましょう。

(1) $3\text{ m} + 25\text{ cm}$ (2) $2\text{ L} - 500\text{ mL}$ (3) $6\text{ m/s} \times 5\text{ s}$ (4) $36\text{ m} \div 9\text{ s}$

2 計算できないものをすべてえらび、その理由も書きましょう。

ア $5\text{ m} + 3\text{ m}$ イ $5\text{ m} + 3\text{ 秒}$ ウ $2\text{ L} + 500\text{ mL}$ エ $6\text{ kg} + 4\text{ }^{\circ}\text{C}$


3 表は、ある冬の日の気温です。

時刻	6時	9時	12時	15時	18時
気温 ($^{\circ}\text{C}$)	-3	1	6	5	0

(1) 6時→12時、(2) 12時→18時の気温の変化量を求めましょう。

(3) 気温がいちばん大きく上がったのは、どの3時間でしょう。

4 電車が、時刻10秒にスタートから80m、時刻40秒に530mの位置にいました。 Δt 、 Δx と速さを求めましょう。



5 自転車が6m/sで25秒走りました。何m進んだでしょう。

6 1時間あたり0.8kWhの電気を使うエアコンを、6時間つけました。使った電気の量は何kWhでしょう。


チャレンジ ★★

7 グラフは、あるラジコンカーの速さと時間の関係です。

(1) はじめの 3 秒で進んだ道のりは？

(2) 5 秒 全部で進んだ道のりは？

(3) (2) は、グラフのどこの面積かな。ノートにグラフをかいて、色をぬろう。



8 水そうに水を入れてあります。時刻 2 分に 30 L、時刻 7 分に 80 L でした。時刻の変化量と水の量の変化量を求め、1 分あたり何 L ふえたかを求めましょう。

9 おふろの水をぬいています。時刻 0 分に 180 L、時刻 6 分に 60 L でした。水の量の変化量は何 L でしょう。また、1 分あたり何 L へったでしょう。

✓ ふりかえり できるようになったかな？

☐ 同じ種類の量を、単位をそろえてたしたりひいたりできる。

→ 62 ページ

☐ ひき算で変化量を求め、 Δ を使って書ける。

→ 63 ページ

☐ わり算で速さを、かけ算で道のりを求められる。

→ 65 ページ



ソラ

つぎの 2-4 では、分数と小数の計算を学ぶよ。この章の「1 あたり」が、また活躍するよ。

2-4

ぶんすう しょうすう けいさん
分数と小数の計算

↑ あち 追するべ

この章のまえに

1-14

1-15

1-16

2-1

2-3

この章の先に

2-5

2-9

2-12

2-15

🚩 この章でできるようになること

- ★ わり算の答えを分数で書き、約分・通分ができる。
- ★★ 分数のたし算・ひき算・かけ算・わり算ができ、わり算で逆数をかけるわけを説明できる。
- ★★ 0 と 1 のあいだの数をかけた・わった答えの大きさがわかる。

? はてな?


ピザが 2 枚あります。3 人で同じ大きさずつ分けると、1 人分は何枚かな？

式は $2 \div 3$ 。でも、1 人分は 1 枚より少なく

て、九九ではわりきれません。こんなわり

算の答えは、どう書けばいいのでしょうか。

第 1 巻の最後のカード「ピザを 3 人で分けると？」の続きです。




🔄 おもいだそう この章で使う、前に学んだこと

- 1-14** わり算は、同じ数ずつ分けた1つ分を求める。0ではわれない。 $6 \div 2 = 3$ なら $3 \times 2 = 6$ 。
- 1-15** $7 \div 3 = 2$ あまり 1。3 こずつ 2 分とれて、1 こあまる。
- 1-16** 同じ大きさに 2 つに分けた 1 分が $\frac{1}{2}$ 、4 つに分けた 1 分が $\frac{1}{4}$ 。
- 2-1** 0.1 は 1 を 10 に分けた 1 分。0.01 は 1 を 100 に分けた 1 分。
- 2-3** 単位をそろえてからたす。1 あたりの量は、わり算で求める。

🍷 やってみよう 紙のピザを分けてみよう

- 紙で同じ大きさの円を 2 枚つくり、それぞれ同じ大きさに 3 つに切ろう。
- 3 人に、同じ数ずつくばろう。1 人分は何切れかな？
- 電卓で $2 \div 3$ を計算しよう。表示はどうなるかな？



1 枚を 3 つに切った 1 切れずつ、2 切れもらえました。電卓では「0.6666666」と、6 がずっと続いてしまいます（画面に入りきらないので、とちゅうで切れています）。




ソラ

2 切れなのはわかるけど、「何枚」かを 1 つの数で言いたいな。

すうがく どうぐ
数学の道具

1 ぶんすう ぶんざん こたえ
① 分数は、わり算の答え

ピザ1枚を3つに分けた1切れは、1枚の $\frac{1}{3}$ （3分の1）です。1人は、2枚のピザのそれぞれから1切れずつもらうので、 $\frac{1}{3}$ が2つで、 $\frac{2}{3}$ （3分の2）枚です。



$2 \div 3$ の答えが $\frac{2}{3}$ です。わられる数の2が**分子**（線の上）、わる数の3が**分母**（線の下）になります。つまり、分数の横の線は「 $\div$ 」と同じ働きをしています。

$$2 \div 3 = \frac{2}{3} \quad 1 \div 4 = \frac{1}{4} \quad 7 \div 3 = \frac{7}{3} \quad 6 \div 2 = \frac{6}{2} = 3$$

最後の $\frac{6}{2}$ のように、わりきれるときは、分数のままにしないで $6 \div 2 = 3$ と計算できます。

もう1つの見方（テープで） 2mのリボンを3人で等しく分けても、同じことがわかります。下の図のように、1mを3つに分けた1つ分が $\frac{1}{3}$ mです。2mの中には $\frac{1}{3}$ mが6つあるので、3人で分けると1人2つずつ。1人分は $\frac{2}{3}$ mです。






図1 太い線で3人分に分けた。1人分は $\frac{1}{3}$ mが2つで $\frac{2}{3}$ m。

電卓では $2 \div 3 = 0.6666 \dots$ と終わりませんが（わけは2-9で学びます）、分数ならぴったり書けます。**②はてな？**の答えは $\frac{2}{3}$ 枚です。反対に、分数を小数にするには、分子÷分母を計算します（ $\frac{1}{4} = 1 \div 4 = 0.25$ ）。

1より大きい分数 ピザ7枚を3人で分けると、1人分は $7 \div 3 = \frac{7}{3}$ 枚です。 $\frac{3}{3}$ や $\frac{7}{3}$ のように、分子が分母と同じか、分母より大きい分数を**仮分数**といいます。 $\frac{3}{3}$ は $3 \div 3 = 1$ なので、ちょうど1です。




$\frac{1}{3}$ 枚の切れが7切れ。3切れで1枚になるので、 $7 \div 3 = 2$ あまり1（1-15）。1枚が2つと、 $\frac{1}{3}$ 枚が1つです。

これを $\frac{7}{3} = 2\frac{1}{3}$ （2と3分の1）とも書きます。この書き方を**帯分数**といいます。反対に帯分数を仮分数にするには、1が $\frac{3}{3}$ なので、2は $\frac{6}{3}$ 。それに $\frac{1}{3}$ をたして $2\frac{1}{3} = \frac{6}{3} + \frac{1}{3} = \frac{7}{3}$ です。帯分数は大きさがすぐわかる書き方ですが、計算するときは仮分数にしてから使います。

🔍 コラム 弦の長さとおとの高さ

ギターの弦をおさえて、ふるえる長さを $\frac{1}{2}$ にすると、音は1オクターブ高くなります。 $\frac{2}{3}$ にすると、ドの音がソの音になります。2500年ほど前のギリシャの人たちは、きれいにひびく音の長さが、かんたんな分数になっていることを見つけました。

2 大きさの同じ分数：約分と通分



$\frac{1}{2}$ 、 $\frac{2}{4}$ 、 $\frac{3}{6}$ は、ぬった長さが同じで
す。上のテープの1切れを2つに切
ると、2段めのテープになります。


切れを2つずつに切ると、全部の切れの数(分母)も、ぬった切れの数(分子)も
2倍になります。でも、ぬった部分の長さは変わりません。だから $\frac{1}{2} = \frac{1 \times 2}{2 \times 2} = \frac{2}{4}$
です。3つずつに切れば $\frac{3}{6}$ です。

たいせつ


分母と分子に同じ数をかけても、同じ数でわっても、分数の大きさは変
わらない(0はのぞく)。

約分 分母と分子を同じ数でわって、小さな数の分数にすることを**約分**とい
います。たとえば $\frac{12}{18}$ は、12も18も6でわりきれるので、 $\frac{12 \div 6}{18 \div 6} = \frac{2}{3}$ です。こ
のように両方をわりきれる数を**公約数**といいます。

では、どの数でわればよいかは、どう見つけるのでしょうか。1と、その数自身
でわかりきれない数(1はのぞく。2、3、5、7、11...)を**素数**といいます。分
母と分子を、素数のかけ算に分けてみます。小さい素数(2、3、5...)から順に、
わりきれる間わっていきます。



$$12 = 2 \times 2 \times 3$$



$$18 = 2 \times 3 \times 3$$

図2 12は2でわると6、6は2でわると3。3は素数なので、ここで終わり。青い数が素
数。

分母と分子の両方にある2と3を消します。

$$\frac{12}{18} = \frac{\cancel{2} \times 2 \times \cancel{3}}{\cancel{2} \times \cancel{3} \times 3} = \frac{2}{3}$$

2 と 3 を消すのは、 $2 \times 3 = 6$ でわるのと同じです。こうすると、わる数を探さなくても、のこさず約分できます。

小数も分数にできます。0.25 は 0.01 が 25 こ (2-1) なので $\frac{25}{100}$ 。25 = 5×5 、100 = $2 \times 2 \times 5 \times 5$ だから、5 を 2 つ消して $\frac{1}{4}$ です。

通分 $\frac{1}{2}$ と $\frac{1}{3}$ は、1 切れの大きさ (単位) がちがいます。2-3 で長さの単位をそろえてからたしたように、分母をそろえると、くらべたりたしたりできます。これを**通分**といいます。

そろえる分母は、2 にも 3 にもなれる数です。2 に 1、2、3…をかけた数 (2 の**倍数**) と、3 の倍数を並べると、両方に出てくる数 (公**倍数**) の中で、いちばん小さいのは 6 です。

2 の倍数	2	4	6	8	10	12
3 の倍数	3	6	9	12	15	18


表 1 両方に出てくるのは 6、12…。いちばん小さい 6 にそろえる。

$\frac{1}{2}$ の分母を 6 にするには 3 をかけ、 $\frac{1}{3}$ の分母を 6 にするには 2 をかけます。分子にも同じ数をかけるので、大きさは変わりません。

$$\frac{1}{2} = \frac{1 \times 3}{2 \times 3} = \frac{3}{6}, \quad \frac{1}{3} = \frac{1 \times 2}{3 \times 2} = \frac{2}{6}$$

12 にそろえてもまちがいはありませんが、数が大きくなり、あとで約分が必要になります。

③ たし算・ひき算は、通分してから




$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{3+2}{6} = \frac{5}{6}$$

分母をたさないのは、 $3\text{ cm} + 2\text{ cm} = 5\text{ cm}$ で「cm」をたさないのと同じです。
 分母の6は「 $\frac{1}{6}$ という1切れの大きさ」を表す単位のようなもので、何切れあ
 るかは分子が表しています。

ひき算も同じで、 $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{3}{6} - \frac{2}{6} = \frac{1}{6}$ です。答えが約分できるときは、約分
 しておきます ($\frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1}{6} + \frac{2}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$)。

④ かけ算は、面積図で



たて $\frac{4}{5}\text{ m}$ 、よこ $\frac{2}{3}\text{ m}$ の長方形の面積は
 $\frac{4}{5} \times \frac{2}{3}$ です (1-21: たて×よこ)。1m 四
 分の正方形を、たて5つ、よこ3つに分ける
 と、全部で $5 \times 3 = 15$ マス。1マスは正方
 形の $\frac{1}{15}$ なので、 $\frac{1}{15}\text{ m}^2$ です。色のマスは、
 たて4つ×よこ2つで8こ。だから $\frac{8}{15}\text{ m}^2$
 です。

$$\frac{4}{5} \times \frac{2}{3} = \frac{4 \times 2}{5 \times 3} = \frac{8}{15}$$

分子どうしのかけ算が色のマスの数、分母どうしのかけ算が全部のマスの数
 です。整数は $3 = \frac{3}{1}$ ($3 \div 1 = 3$) と考えれば、同じやり方でかけられます：
 $\frac{2}{5} \times 3 = \frac{2}{5} \times \frac{3}{1} = \frac{6}{5}$ 。

5 わり算 (その1) : 数直線で考える

$\frac{3}{4}$ dL のペンキで、かべが $\frac{2}{5}$ m² ぬれました。1 dL では何 m² ぬれるかな？

1 あたりの量を求めるので、わり算の $\frac{2}{5} \div \frac{3}{4}$ です (2-3 : 速さ = 道のり ÷ 時間と同じ形)。でも、「 $\frac{3}{4}$ でわる」とは、どう計算すればよいのでしょうか。ペンキの量と面積を、2 本の数直線に並べて考えます。





図3 ペンキが $\frac{1}{4}$ dL ふえるごとに、ぬれる面積も同じだけふえる。

- ① まず、 $\frac{1}{4}$ dL でぬれる面積を求めます。 $\frac{3}{4}$ dL は $\frac{1}{4}$ dL が 3 つなので、 $\frac{1}{4}$ dL では $\frac{2}{5}$ m² の 3 つに 1 つ分。 $\frac{2}{5}$ を 3 でわります。右の図のように、 $\frac{2}{5}$ をさらに 3 つに分けると、1 マスは $\frac{1}{15}$ で、それが 2 つ分です。



全体が 1 m²
全部で 15 マス

- ② 1 dL は $\frac{1}{4}$ dL の 4 つ分なので、4 をかけます。
 $\frac{2}{15} \times 4 = \frac{8}{15}$ で、 $\frac{8}{15}$ m² です。

①で3でわり、②で4をかけました。この2つをまとめて1つの式にすると、

$$\begin{aligned} \frac{2}{5} \div 3 \times 4 &= \frac{2}{5 \times 3} \times 4 \\ &= \frac{2 \times 4}{5 \times 3} = \frac{2}{5} \times \frac{4}{3} \end{aligned}$$

「3でわって4をかける」は、「 $\frac{4}{3}$ をかける」のと同じになりました。

$$\frac{2}{5} \div \frac{3}{4} = \frac{2}{5} \times \frac{4}{3} = \frac{8}{15}$$

わる数の $\frac{3}{4}$ の分母と分子を入れかえた $\frac{4}{3}$ が出てきました。これは、たまたまでしょうか。どんな分数でわっても、いつもこうなるのでしょうか。⑥で、ちがう考え方から確かめてみましょう。



ミナ

ペンキの問題では、たしかに入れかえた数をかけていたね。でも、どうしていつもそうなるのかな？

⑥ わり算（その2）：なぜ、上と下を入れかえた数かけるの？

こんどは、ペンキの場面を使わずに、①～④で学んだきまりだけを使って、 $\frac{2}{5} \div \frac{3}{4}$ を計算します。4つの段に分けて、1つずつ進みます。

① わり算を、分数の形で書く

①で、 $2 \div 3 = \frac{2}{3}$ のように、わり算は分数で書けることを学びました。わられる数が分子（線の上）、わる数が分母（線の下）です。わられる数やわる数が分数のときも、同じように書けます。すると、**分数の中に分数が入った形**になります。

$$2 \div 3 \longrightarrow \frac{2}{3} \quad \div \text{のしるしが、分数の線になる}$$

$$\frac{2}{5} \div \frac{3}{4} \longrightarrow \frac{\frac{2}{5}}{\frac{3}{4}}$$

わられる数（分子）

わる数（分母）

図4 わる数が分数でも、わり算は分数の形で書ける。

$$\frac{2}{5} \div \frac{3}{4} = \frac{\frac{2}{5}}{\frac{3}{4}}$$

ぶん ぼ 分母が「 $\frac{3}{4}$ 」という分数なので、このままでは計算しにくい形です。分母を、もつとかんたんな数にしたいですね。

② 分子と分母に同じ数をかけても、答えは変わらない

②で、分子と分母に同じ数をかけても分数の大きさは変わらないことを、テープで確かめました。ここでは、そのわけを2つの見方でもう一度確かめます。

見方 1：わり算の場面で クッキー6まいを2人で分けると、1人3まい。クッキーも人数も2倍にして、12まいを4人で分けても、やっぱり1人3まいです。




図 5 わられる数もわる数も2倍にしても、1人分は3まいのまま。

$6 \div 2 = 3$ 、 $12 \div 4 = 3$ 、 $60 \div 20 = 3$ 。わられる数とわる数に同じ数をかけても、わり算の答えは変わりません。分数の形で書けば、 $\frac{6}{2} = \frac{12}{4} = \frac{60}{20}$ で、分子と分母に同じ数をかけたことになります。

見方 2：「1 をかける」と考える 同じ数どうしのわり算の答えは、いつも1です。

$$1 \div 1 = 1, \quad 4 \div 4 = 1, \quad \frac{4}{3} \div \frac{4}{3} = 1$$

$\frac{4}{3} \div \frac{4}{3}$ が1なのは、「 $\frac{4}{3}$ m のテープのなかに、 $\frac{4}{3}$ m のテープは何本分ある？」と考えると、ちょうど1本分だからです。だから、次の2つは、どちらも大きさが1です。

$$\frac{4}{4} = 1, \quad \frac{\frac{4}{3}}{\frac{4}{3}} = 1$$

分子と分母に同じ数をかけることは、分数全体に「1」をかけることと同じです。たとえば $\frac{2}{3}$ の分子と分母に4をかけると、④のかけ算のきまりから、

$$\frac{2 \times 4}{3 \times 4} = \frac{2}{3} \times \frac{4}{4} = \frac{2}{3} \times 1 = \frac{2}{3}$$

どんな数に1をかけても、大きさは変わりません ($5 \times 1 = 5$)。②の約分・通分で使ったきまりは、じつは「1をかける」ことだったのです。

③ 分母を1にしたい。 $\frac{3}{4}$ に何をかけると1になる？

なぜ分母を1にしたいのでしょうか。分母が1の分数は、分子そのものだからです。1でわっても数は変わりません ($5 \div 1 = \frac{5}{1} = 5$)。

では、 $\frac{3}{4}$ に何をかけると1になるでしょう。いくつかためてみます。

かける数	計算	1になった？
4	$\frac{3}{4} \times 4 = \frac{12}{4} = 3$	おお 大きすぎる
$\frac{1}{3}$	$\frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$	ちい 小さすぎる
$\frac{4}{3}$	$\frac{3}{4} \times \frac{4}{3} = \frac{12}{12} = 1$	ちょうど1

ひょう表2 $\frac{3}{4}$ の分母と分子を入れかえた $\frac{4}{3}$ をかけると、ちょうど1。

$\frac{3}{4} \times \frac{4}{3}$ は、分子が 3×4 、分母が 4×3 で、同じ12になります。だから1です。テープでも確かめましょう。 $\frac{4}{3}$ をかけるのは、⑤と同じく「3でわって、4をかける」ことです。




図 6 $\frac{3}{4}$ を 3 でわると $\frac{1}{4}$ 。それを 4 倍すると、ちょうど 1。

4 分子と分母の両方に $\frac{4}{3}$ をかける

段 2 で確かめたように、分子と分母に同じ数をかけても、大きさは変わりません。そこで、分母が 1 になる $\frac{4}{3}$ を、分子と分母の両方にかけます。1 行ずつ見ていきましょう。

	しき式	この行でしたこと
1	$\frac{2}{5} \div \frac{3}{4} = \frac{\frac{2}{5}}{\frac{3}{4}}$	わり算を分数の形で書いた (段 1)
2	$= \frac{\frac{2}{5} \times \frac{4}{3}}{\frac{3}{4} \times \frac{4}{3}}$	分子と分母に、同じ $\frac{4}{3}$ をかけた (段 2・3)
3	$= \frac{\frac{2}{5} \times \frac{4}{3}}{1}$	分母は $\frac{3}{4} \times \frac{4}{3} = 1$ になった
4	$= \frac{2}{5} \times \frac{4}{3}$	1 でわっても変わらないので、分母の 1 を消した
5	$= \frac{8}{15}$	④のかけ算 (分子どうし・分母どうし)

表 3 ⑤のペンキの答え $\frac{8}{15}$ と、ぴったり同じになった。

2行めから4行めまでをふり返ると、わる数 $\frac{3}{4}$ は分母から消えて、そのかわり $\frac{4}{3}$ が分子にかけ算で残りました。つまり、

$$\frac{2}{5} \div \frac{3}{4} = \frac{2}{5} \times \frac{4}{3}$$

わる数の分母と分子を入れかえた数を、もとの数の逆数といいます。 $\frac{3}{4}$ の逆数は $\frac{4}{3}$ です。分数でわるときは、わる数の逆数をかければよいのです。

いつでも使えるわけ この方法が使えたのは、「分母を1にする数」が見つかったからです。どんな分数でも、その逆数をかけると、分子と分母が同じ数になって1になります($\frac{5}{7} \times \frac{7}{5} = \frac{35}{35} = 1$)。だから、わる数がどんな分数でも、同じ4つの段で「逆数をかける」になります。⑤の数直線の考え方と、⑥の分数のなか、分数の考え方。ちがう2つの道から、同じきまりにたどりつきました。

もとの数	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{5}$	$3 (= \frac{3}{1})$	$\frac{7}{2}$
逆数	$\frac{4}{3}$	$\frac{5}{1} = 5$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{7}$
かけると	1	1	1	1

表4 整数は、分母が1の分数と考えて入れかえる。もとの数と逆数をかけると、いつも1。

0には逆数がありません。0に何をかけても0で、1にならないからです。0ではわれない(1-14)ことと、ぴったり合っています。

7 いろいろなわり算と、答えの確かめ

整数・小数・帯分数でわる時も、まず分数(仮分数)の形にすれば、同じ「逆数をかける」で計算できます。

整数でわる $\frac{2}{5} \div 3$ は、 $3 = \frac{3}{1}$ と考えると、逆数は $\frac{1}{3}$ です。

$$\frac{2}{5} \div 3 = \frac{2}{5} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{15}$$

⑤の①で、図を使って出した $\frac{2}{15}$ と同じです。

しょうすう 小数でわる $1.2 \div 0.4$ は、**しょうすう ぶんすう** 小数を分数にします。1.2 は 0.1 が 12 こなので $\frac{12}{10}$ 、0.4 は $\frac{4}{10}$ です (2-1)。

$$\begin{aligned} 1.2 \div 0.4 &= \frac{12}{10} \div \frac{4}{10} = \frac{12}{10} \times \frac{10}{4} \\ &= \frac{120}{40} = 3 \end{aligned}$$

だん み かた 段 2 の見方 1 (わられる数とわる数に同じ数をかける) を使って、**つか りょうほう ばい** 両方を 10 倍しても、 $12 \div 4 = 3$ で**おな こた** 同じ答えです。

たいぶんすう 帯分数でわる $2\frac{1}{3} \div 1\frac{3}{4}$ は、まず**りょうほう か ぶんすう** 両方を仮分数にします (①)。

$$2\frac{1}{3} = \frac{6}{3} + \frac{1}{3} = \frac{7}{3}, \quad 1\frac{3}{4} = \frac{4}{4} + \frac{3}{4} = \frac{7}{4}$$

$$2\frac{1}{3} \div 1\frac{3}{4} = \frac{7}{3} \div \frac{7}{4} = \frac{7}{3} \times \frac{4}{7} = \frac{28}{21} = \frac{4}{3}$$

さい ご 最後は、28 と 21 を**りょうほう やくぶん** 両方 7 でわって約分しました。

こた たし 答えの確かめ $6 \div 2 = 3$ なら $3 \times 2 = 6$ のように、「**こた かず** 答え×わる数=わられる数」になります (1-14)。**ぶんすう おな** 分数でも同じです。

$$\frac{8}{15} \times \frac{3}{4} = \frac{24}{60} = \frac{2}{5}$$

わられる数の $\frac{2}{5}$ にもどりました。もし、まちがえて $\frac{5}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{15}{8}$ と**けいさん** 計算していたら、 $\frac{15}{8} \times \frac{3}{4} = \frac{45}{32}$ で、 $\frac{2}{5}$ にもどりません。**たし** 確かめをすると、まちがいに**じぶん** 自分で**き** 気づけます。

⑧ 0 と 1 のあいだの数^{かず}をかける・わる

1m あたり 300 円^{えん}のリボン^{だいきん}の代金は、「1 あたり×いくつつ^{ぶん}」です (2-3)。
0.5m は 1m の半分^{はんぶん}なので、代金^{だいきん}も半分^{はんぶん}の 150 円^{えん}になるはず^{はず}です。

なが 長さ (m)	2	1	0.5	0.2
だいきん しき 代金の式	300×2	300×1	300×0.5	300×0.2
だいきん えん 代金 (円)	600	300	150	60

ひょう 表5 かける数が1より小さいと、代金は300円より少ない。

0と1のあいだの数^{かず}をかけると、答え^{こた}は300より小さ^{ちい}くなります。「かけ算^{さん}の答え^{こた}はいつも大きくなる」とはかぎりません。1より大き^{おお}い数^{かず}をかけたときだけ、大き^{おお}くなります。

✕ 300×0.5 は、かけ算^{さん}だから300より大き^{おお}い

○ $300 \times 0.5 = 150$ で、300より小さ^{ちい}い (0.5m は1m より短^{みじか}いから)

反対^{はんたい}に、0.5m で150円^{えん}のリボンの1m


あたりの値段^{ねだん}は、 $150 \div 0.5$ です。右^{みぎ}の

図^ずのように、1m は0.5m の2つ分^{ぶん}だ

から、値段^{ねだん}も2つ分^{ぶん}の300円^{えん}。 $0.5 = \frac{1}{2}$

でわるのは、逆数^{ぎやくすう}の2をかけると同じ^{おな}

です。



0と1のあいだの数^{かず}でわると、答え^{こた}は大き^{おお}くなります。1より大き^{おお}い数^{かず}でわると、答え^{こた}は小さ^{ちい}くなります。

わる数 ^{かず}	2	1	0.5	0.2
しき 式	$300 \div 2$	$300 \div 1$	$300 \div 0.5$	$300 \div 0.2$
こた 答え	150	300	600	1500

ひょう 表6 わる数が1より小さいと、答えは300より大きい。

たいせつ

ぶんすう
分数はわり算の答え： $2 \div 3 = \frac{2}{3}$

たし算・ひき算：通分して、分子どうしを計算する

かけ算：分子どうし、分母どうしをかける

わり算：わる数の逆数をかける（分母を1にする数を、
分子と分母の両方にかけたから）

0と1のあいだの数をかけると小さく、わると大きくなる

この章で出てきたことば

ぶんし ぶんぼ ぶんすう せん うえ ぶんし した ぶんぼ
分子・分母 分数の線の上が分子、下が分母。

か ぶんすう たいぶんすう $\frac{7}{3}$ のように分子が分母以上の分数・ $2\frac{1}{3}$ のような書き方。

やくぶん ふうぶん ぶんぼ かず おな かず ぶんぼ
約分・通分 分母と分子を同じ数でわる・分母をそろえる。

そすう 1とその数自身でしかわりきれない数（1はのぞく）。

ぎやくすう ぶんぼ ぶんし い かず おな ぶんぼ
逆数 分母と分子を入れかえた数。もとの数とかけると1。 $\frac{3}{4}$ の逆数は $\frac{4}{3}$ 。

もっと知りたい ★★

もう1つの方法：通分してからわる

⑤・⑥とはちがう方法でも、 $\frac{2}{5} \div \frac{3}{4}$ を計算できます。分母を20にそろえ
ると（通分）、 $\frac{2}{5} = \frac{8}{20}$ 、 $\frac{3}{4} = \frac{15}{20}$ です。 $\frac{1}{20}$ を1切れとすると、わられる数
は8切れ、わる数は15切れ。同じ単位どうしなので、 $8\text{cm} \div 15\text{cm}$ と
同じように、切れの数どうしでわれます。




図7 1マスが $\frac{1}{20}$ 。上は8マス、下は15マス。

$$\frac{2}{5} \div \frac{3}{4} = \frac{8}{20} \div \frac{15}{20} = 8 \div 15 = \frac{8}{15}$$

逆数をかけた答えと、やっぱり同じになりました。ただ、通分は手間がかかるので、ふだんは逆数かける方法を使います。

例題でたしかめよう

例題1 分数と小数、約分

分数に (1) $3 \div 5$ (2) 0.6 小数に (3) $\frac{3}{4}$ 約分 (4) $\frac{18}{24}$

帯分数に (5) $\frac{11}{4}$ 仮分数に (6) $3\frac{2}{5}$

考え方 (1) わられる数が分子、わる数が分母。(2) 0.6 は 0.1 が 6 こ。
(3) 分子 $\div$ 分母。(4) 素数のかけ算に分けて、上下にある同じ数を消す。
(5) $11 \div 4$ のあまりを使う。(6) 1 は $\frac{5}{5}$ 。

しき (1) $3 \div 5 = \frac{3}{5}$ (2) $0.6 = \frac{6}{10} = \frac{6 \div 2}{10 \div 2} = \frac{3}{5}$

$$(3) \frac{3}{4} = 3 \div 4 = 0.75$$

$$(4) \frac{18}{24} = \frac{\cancel{2} \times \cancel{3} \times 3}{\cancel{2} \times 2 \times 2 \times \cancel{3}} = \frac{3}{4}$$

$$(5) 11 \div 4 = 2 \text{ あまり } 3 \text{ なので、} \frac{11}{4} = 2\frac{3}{4}$$

$$(6) 3 = \frac{15}{5} \text{ なので、} 3\frac{2}{5} = \frac{15}{5} + \frac{2}{5} = \frac{17}{5}$$

こたえ (1) $\frac{3}{5}$ (2) $\frac{3}{5}$ (3) 0.75 (4) $\frac{3}{4}$ (5) $2\frac{3}{4}$ (6) $\frac{17}{5}$

じぶんでとこう 1

ぶんすう 分数に (1) $4 \div 7$ (2) 0.75 しょうすう 小数に (3) $\frac{2}{5}$ やくぶん 約分 (4) $\frac{20}{30}$
たいぶんすう 帯分数に (5) $2\frac{9}{2}$ かぶんすう 仮分数に (6) $2\frac{3}{4}$

れいだい 例題 2 つうぶん 通分してたす・ひく

(1) $\frac{2}{3} + \frac{1}{4}$ (2) $\frac{5}{6} - \frac{1}{2}$ (3) $\frac{3}{4} + \frac{5}{6}$

かんが 考えた そろえる分母は、両方の分母の公倍数でいちばん小さい数。(1) 3の倍数 3、6、9、**12** と、4の倍数 4、8、**12** から 12。(2) 6は2の倍数でもあるので 6。(3) 4の倍数 4、8、**12** と、6の倍数 6、**12** から 12。答えが約分できたら約分し、1より大きければ帯分数でも表してみる。

しき (1) $\frac{2}{3} + \frac{1}{4} = \frac{2 \times 4}{3 \times 4} + \frac{1 \times 3}{4 \times 3} = \frac{8}{12} + \frac{3}{12} = \frac{11}{12}$
(2) $\frac{5}{6} - \frac{1}{2} = \frac{5}{6} - \frac{1 \times 3}{2 \times 3} = \frac{5}{6} - \frac{3}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$
(3) $\frac{3}{4} + \frac{5}{6} = \frac{3 \times 3}{4 \times 3} + \frac{5 \times 2}{6 \times 2} = \frac{9}{12} + \frac{10}{12} = \frac{19}{12}$
 $19 \div 12 = 1$ あまり 7 なので、 $\frac{19}{12} = 1\frac{7}{12}$

こたえ (1) $\frac{11}{12}$ (2) $\frac{1}{3}$ (3) $\frac{19}{12}$ ($1\frac{7}{12}$)

じぶんでとこう 2

(1) $\frac{1}{2} + \frac{2}{5}$ (2) $\frac{3}{4} - \frac{2}{3}$ (3) $\frac{2}{3} + \frac{3}{4}$ (4) 1Vの電池に、3Ωと6Ωの抵抗を並列につなぐと、それぞれに $\frac{1}{3}$ A と $\frac{1}{6}$ A の電流が流れます。電流は全部で何 A? (並列は→ 99 ページ)


例題3 1あたりのかけ算・わり算

(1) 1m で $\frac{3}{4}$ kg の棒、 $\frac{2}{5}$ m では何 kg? (2) $\frac{2}{3}$ dL で $\frac{4}{9}$ m² ぬれるペンキ、1dL では何 m²?

考え方 (1) 1あたり (1m の重さ) × いくつ分 (長さ) なので、かけ算。
(2) 1あたり (1dL でぬれる面積) を求めるので、全体 ÷ いくつ分のわり算。わる数の逆数をかける。

しき (1) $\frac{3}{4} \times \frac{2}{5} = \frac{3 \times 2}{4 \times 5} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$
(2) $\frac{4}{9} \div \frac{2}{3} = \frac{4}{9} \times \frac{3}{2} = \frac{12}{18} = \frac{2}{3}$ 確かめ: $\frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{9}$

こたえ (1) $\frac{3}{10}$ kg (2) $\frac{2}{3}$ m²



じぶんでとこう3

(1) 1m² あたり $\frac{5}{6}$ dL のペンキ。 $\frac{3}{5}$ m² では何 dL? (2) $\frac{3}{4}$ m で $\frac{3}{5}$ kg の針金。1m では何 kg? (3) $\frac{5}{6}$ dL で $\frac{5}{8}$ m² ぬれるペンキ。1dL では何 m²?

例題 4 整数・小数・帯分数でわる

(1) $\frac{4}{9} \div 2$ (2) $0.9 \div 0.6$ (3) $1\frac{1}{2} \div 2\frac{1}{4}$ (4) $\frac{3}{5} \div 1.2$ 答えは確かめよう。

考え方 まず分数(仮分数)の形にしてから、逆数をかける。(1) $2 = \frac{2}{1}$ の逆数は $\frac{1}{2}$ 。(2) 0.9 は 0.1 が 9 こ、0.6 は 0.1 が 6 こ。(3) $1 = \frac{2}{2}$ 、 $2 = \frac{8}{4}$ 。(4) 分数と小数がまざっていたら、小数を分数にそろえる。 $1.2 = \frac{12}{10}$ 。

しき (1) $\frac{4}{9} \div 2 = \frac{4}{9} \times \frac{1}{2} = \frac{4}{18} = \frac{2}{9}$ 確かめ: $\frac{2}{9} \times 2 = \frac{4}{9}$
 (2) $0.9 \div 0.6 = \frac{9}{10} \times \frac{10}{6} = \frac{90}{60} = \frac{3}{2}$ 確かめ: $\frac{3}{2} \times \frac{6}{10} = \frac{18}{20} = \frac{9}{10}$
 (3) $1\frac{1}{2} \div 2\frac{1}{4} = \frac{3}{2} \div \frac{9}{4} = \frac{3}{2} \times \frac{4}{9} = \frac{12}{18} = \frac{2}{3}$
 確かめ: $\frac{2}{3} \times \frac{9}{4} = \frac{18}{12} = \frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$
 (4) $\frac{3}{5} \div 1.2 = \frac{3}{5} \times \frac{10}{12} = \frac{30}{60} = \frac{1}{2}$ 確かめ: $\frac{1}{2} \times \frac{12}{10} = \frac{12}{20} = \frac{3}{5}$

こたえ (1) $\frac{2}{9}$ (2) $\frac{3}{2}$ (1.5) (3) $\frac{2}{3}$ (4) $\frac{1}{2}$

じぶんでとこう 4

答えを確かめよう。(1) $\frac{6}{7} \div 3$ (2) $0.8 \div 0.6$ (3) $2\frac{1}{2} \div 1\frac{2}{3}$
 (4) $\frac{9}{10} \div 1.5$

例題5 答えは大きくなる？ 小さくなる？

60 より大きくなるのは？ ア 60×0.8 イ $60 \div 0.8$ ウ 60×1.5
エ $60 \div 1.2$

考え方 0 と 1 のあいだの数をかけると小さく、わると大きくなる。1 より大きい数をかけると大きく、わると小さくなる。


しき ア $60 \times 0.8 = 48$ (小さくなる)

イ $60 \div 0.8 = 75$ (大きくなる)

ウ $60 \times 1.5 = 90$ (大きくなる)

エ $60 \div 1.2 = 50$ (小さくなる)

こたえ イ、ウ



じぶんでとこう5

40 より小さくなるのは？ ア 40×0.5 イ $40 \div 0.5$ ウ 40×1.2
エ $40 \div 1.25$



デルタ

分数の計算は、「1 切れの大きさ (分母)」と「何切れ (分子)」を分けて考えるとわかりやすいよ。

⚠ まちがえやすいところをチェック

⚠ まちがえやすいところ

^{ぶん ぼ}
分母どうしもたしてしまう

✕ $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{1+1}{2+3} = \frac{2}{5}$

○ $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$

^{ぶん ぼ}分母は1切れの^き大きさ。たすのは^{ぶん し}分子（^{なん き}何切れ）だけです。 $\frac{2}{5}$ は $\frac{1}{2}$ より^{ちい}小さいので、「たしたのにへった」ことになり、おかしいとわかります。

⚠ まちがえやすいところ

^{かず}
わられる数のほうを^{ぎやくすう}逆数にする

✕ $\frac{2}{5} \div \frac{3}{4} = \frac{5}{2} \times \frac{3}{4}$

○ $\frac{2}{5} \div \frac{3}{4} = \frac{2}{5} \times \frac{4}{3} = \frac{8}{15}$

^{ぎやくすう}逆数にするのは、÷のうしろの「^{かず}わる数」だけです。⑥で、^{ぶん ぼ}分母（^{かず}わる数）を1にするために $\frac{4}{3}$ をかけたことを思い出しましょう。

⚠ まちがえやすいところ

かけ算でも^{ざん}逆数^{ぎやくすう}にしてしまう

✕ $\frac{2}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{2}{5} \times \frac{4}{3}$

○ $\frac{2}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{2 \times 3}{5 \times 4} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$

^{ぎやくすう}逆数をかけるのは、わり算^{ざん}のときだけ。かけ算^{ざん}は、そのまま分子^{ぶんし}どうし・分母^{ぶんぼ}どうしをかけます。

⚠ まちがえやすいところ

^{ぎやくすう}逆数にしたのに、÷のままにする

✕ $\frac{2}{5} \div \frac{3}{4} = \frac{2}{5} \div \frac{4}{3}$

○ $\frac{2}{5} \div \frac{3}{4} = \frac{2}{5} \times \frac{4}{3}$

「^{ぎやくすう}逆数にする」と「÷を×にする」は、いつも^{おな}同じときにします。

⚠ まちがえやすいところ


^{たいぶんすう}帯分数のまま^{ぎやくすう}逆数にする

✕ $2\frac{1}{3}$ の^{ぎやくすう}逆数は $2\frac{3}{1}$

○ $2\frac{1}{3} = \frac{7}{3}$ なので、^{ぎやくすう}逆数は $\frac{3}{7}$

^{さき}先に^{かぶんすう}仮分数にしてから^い入れかえます。確かめ： $\frac{7}{3} \times \frac{3}{7} = \frac{21}{21} = 1$ 。

ぶつり こうがく つか
物理・工学ではこう使う



へいれつ つないだ抵抗
並列につないだ抵抗

抵抗は電流の流れにくさで、単位は Ω

(オーム) です。1V (ボルト) の電池

に 2Ω の抵抗をつなぐと、電流は $\frac{1}{2}$ A

(アンペア)、 3Ω なら $\frac{1}{3}$ A 流れます

(電流 = 電圧 ÷ 抵抗。くわしくは2-15)。


2つを並べてつなぐと (並列)、電流は

両方の道に分かれて流れるので、電池

から出る電流は $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$ A。電気の

回路の設計では、よく分数のたし算を

します。



はぐるま
歯車

かみ合ったところでは、2つの歯車の歯が 1

こずつ同じ数だけ送られます。歯の数が 30

の歯車が 1 回転すると、歯が 30 こ送られま

す。歯の数が 12 の歯車は、歯 12 こで 1 回


転なので、30 ぶんでは $30 \div 12 = \frac{30}{12} = \frac{5}{2}$

回転 ($2\frac{1}{2}$ 回転) します。かみ合った歯車は、

反対の向きに回ります。

コラム 2つの抵抗を1つにまとめると？（逆数の出番）

99 ページの並列の回路では、1V の電池から $\frac{5}{6}$ A の電流が出ていました。この2つの抵抗を、電池から見て同じ電流が流れる「1つの抵抗」におきかえると、何Ω になるでしょう。



「電流 = 電圧 ÷ 抵抗」でした。「答え × わる数 = わられる数」(⑦) なので、電流 × 抵抗 = 電圧。だから「抵抗 = 電圧 ÷ 電流」で求められます。

$$1 \div \frac{5}{6} = 1 \times \frac{6}{5} = \frac{6}{5} = 1\frac{1}{5} (\Omega)$$

分数でわるので、逆数をかけました。まとめた抵抗 $\frac{6}{5}$ Ω (1.2 Ω) は、2 Ω よりも小さくなります。電流の通り道がふえて、流れやすくなったからです。

並列につなぐ抵抗	1V で流れる電流 (A)	まとめると
2 Ω と 2 Ω	$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$	$1 \div 1 = 1 \Omega$
2 Ω と 3 Ω	$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$	$\frac{6}{5} \Omega$
3 Ω と 6 Ω	$\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$	2 Ω

表7 電流をたして、その逆数をとると、まとめた抵抗になる。

電気の回路を設計する人は、「逆数をたして、また逆数にもどす」計算を、いつも使っています（くわしくは2-15）。



しょうまつもんだい
章末問題

2-4 のまとめ

きほん
基本



- 1 わり算の答えを分数で書きましょう。(1) $2 \div 5$ (2) $7 \div 4$ (3) $1 \div 6$
- 2 ピザ 5 枚を 4 人で同じ大きさずつ分けると、1 人分は何枚でしょう。分数と小数で答えましょう。
- 3 約分しましょう。(1) $\frac{8}{12}$ (2) $\frac{15}{25}$ (3) $\frac{14}{21}$
- 4 分数は小数に、小数は分数にしましょう。(1) $\frac{3}{4}$ (2) $\frac{2}{5}$ (3) 0.4
(4) 0.25
- 5 (1) $\frac{13}{5}$ を帯分数に、(2) $4\frac{2}{3}$ を仮分数にしましょう。
- 6 計算しましょう。(1) $\frac{1}{3} + \frac{1}{6}$ (2) $\frac{3}{4} - \frac{1}{3}$ (3) $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4}$ (4) $\frac{3}{5} \div \frac{9}{10}$
- 7 わり算をして、「答え×わる数」で確かめましょう。(1) $\frac{5}{6} \div \frac{5}{9}$ (2) $\frac{3}{4} \div 6$
(3) $1\frac{1}{3} \div 0.8$
- 8 1 m の重さが $\frac{4}{5}$ kg の棒があります。(1) $\frac{3}{8}$ m では何 kg? (2) べつの棒は、 $\frac{2}{3}$ m で $\frac{1}{2}$ kg です。1 m では何 kg?
- 9 計算しましょう。1 より大きい答えは、帯分数でも表しましょう。
(1) $\frac{5}{6} + \frac{2}{9}$ (2) $\frac{7}{8} + \frac{1}{2}$
- 10 計算しましょう。(1) $\frac{7}{10} - \frac{1}{4}$ (2) $\frac{4}{7} \times \frac{7}{8}$ (3) $\frac{5}{9} \div \frac{10}{3}$ (4) $2\frac{2}{3} \div 4$
(5) $0.75 \div \frac{3}{8}$

- 11 (1) $\frac{2}{3}$ 分で 50 m 歩きました。1 分あたり何 m 歩いたでしょう。(2) 1 m あたり $\frac{2}{5}$ kg の鉄の棒があります。 $\frac{7}{4}$ m では何 kg でしょう。

チャレンジ ★★

- 12 ミナは、 $\frac{3}{5} \div \frac{2}{7} = \frac{6}{35}$ と計算しました。「答え×わる数」で確かめて、まちがいかどうかを調べましょう。まちがっていたら、どこでまちがえたかを書き、正しい答えを求めましょう。

- 13 答えが、わられる数やかかけられる数の $\frac{3}{4}$ より大きくなるものをすべてえらびましょう。計算しないで考え、あとで計算して確かめよう。

ア $\frac{3}{4} \times \frac{2}{3}$ イ $\frac{3}{4} \div \frac{2}{3}$ ウ $\frac{3}{4} \times \frac{5}{4}$ エ $\frac{3}{4} \div \frac{5}{4}$


- 14 $1\frac{1}{2}$ dL のペンキで、かべが $2\frac{1}{4}$ m² ぬれました。1 dL では何 m² ぬれますか。答えを確かめてから、帯分数で答えましょう。

- 15 答えが 120 より大きくなるものをすべてえらびましょう。計算しないで考え、あとで電卓で確かめよう。

ア 120×0.9 イ $120 \div 0.9$ ウ 120×1.1 エ $120 \div 1.1$ オ $120 \div \frac{1}{3}$

- 16 $\frac{3}{8} \div \frac{3}{4}$ がなぜ $\frac{3}{8} \times \frac{4}{3}$ になるのかを、「分数の中に分数」の形に書いて、分母を 1 にする方法で、1 行ずつノートに説明しましょう。答えも求めましょう。

17 図のように、1Vの電池に、2Ω、3Ω、6Ωの抵抗を並列につなぎました。それぞれの抵抗に $\frac{1}{2}$ A、 $\frac{1}{3}$ A、 $\frac{1}{6}$ Aの電流が流れます。




(1) 電池から流れ出る電流は、全部で何Aでしょう。

(2) 6Ωの抵抗をはずすと、全部で何Aになるでしょう。

18 歯の数が36の歯車が1回転すると、かみ合った歯の数が24の歯車は何回転するでしょう。分数で答え、約分しましょう。

ヒント：かみ合ったところでは、2つの歯車の歯が同じ数ずつ進みます。小さい歯車は歯36こ分回り、1回転は歯24こ分なので、 $36 \div 24$ です（→99ページ）。



✓ ふりかえり できるようになったかな？

☐ わり算の答えを分数で書き、約分・通分ができる。 → 78 ページ

☐ 分数の $+$ $-$ $\times$ $\div$ ができ、わり算で逆数をかけるわけを説明できる。 → 84 ページ

☐ 0と1のあいだの数をかけた・わった答えの大きさがわかる。 → 89 ページ



ミナ

つぎの2-5では、比と割合を学ぼう。分数がそのまま使えるよ。

2-5

ひ わりあい ひやくぶんりつ
比・割合・百分率

↑ みる 追するべ この章のまえに 1-14 2-3 2-4 この章の先に 2-6 2-15 5-6

🚩 この章でできるようになること

- ★ 2つの量の関係を比で表し、等しい比をつくれる。
- ★★ 比をかけ算でつないで、歯車の回転を求められる。
- ★ 割合を百分率で表し、「20%引き」の量を求められる。

？ はてな？

テストで全部正解すると、正しく答えた割合は「100%」。それより上はありません。

ところが、お店で「いつもの20%増量」というおかしを見つけました。いつものふくろとくらべると、何%になるのかな？ 100%をこえることは、あるのでしょうか。



100%



100%




なん 何%?

△ やってみよう 同じ味のジュースをつくろう

ようい 用意するもの

うすめて飲むジュースの^の原液、水、大さじ、コップ3つ

- ① コップAに、^{げんえき おお}原液を大さじ1 ぱい、^{みず おお}水を大さじ4 はい入れて、まぜよう。
- ② コップBには^{げんえき}原液2 はいと^{みず}水8 ぱい、Cには^{げんえき}原液2 はいと^{みず}水4 はいを入れよう。
- ③ ^の飲みくらべよう。^{おな あじ}同じ味のコップは、どれとどれかな？ いちばんこいのは、どれかな？



🕒 おも だ 思い出そう この章で使う、前に学んだこと

- 2-3** 1あたりの量は、わり算でつくる。速さ＝道のり÷時間
- 2-4** 分数はわり算の答え： $1 \div 4 = \frac{1}{4} = 0.25$ 。分母と分子を同じ数でわっても、
^{おお}大きさは同じ（約分）
- 2-4** 0と1のあいだの^{かず}数をかけると、もとより小さくなる： $1000 \times 0.8 = 800$



ミナ

AとBは同じ味だったよ。Bは量が2倍なのに、味は変わらない。Cはこかった！

数学の道具

1 比と比の値

コップAの原液と水の量の関係を1:4と書き、「1対4」と読みます。このように表したものを比といいます。Bは2:8、Cは2:4です。

A  1:4

C  2:4

B  2:8 (Aが2つ分)

図1 1マスが大さじ1ぱい。BはAを2つ合わせたものなので、量は2倍でも味は同じ。

1:4の前の数を後ろの数でわった $1 \div 4 = 0.25$ を、比の値といいます。比の値は、「前の量が、後ろの量の何倍か」を表しています。Aでは、原液は水の0.25倍です。分数で書くと $1 \div 4 = \frac{1}{4}$ (2-4)で、原液は水の $\frac{1}{4}$ だとわかります。

Bは $2 \div 8 = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$ (約分)で、Aと同じです。だから同じ味になりました。

Cは $2 \div 4 = \frac{2}{4} = 0.5$ で大きく、原液の多いこいジュースです。

比の値が同じ比を等しい比といい、 $1:4 = 2:8$ と書きます。図のように、BはAを2つ合わせたものなので、原液も水も2倍です。このように、比の両方に同じ数をかけても、比の値は変わりません (2-4:分子と分母に同じ数をかけても、分数の大きさは変わらない)。同じ数でわっても同じです。

$$1:4 = 2:8 = 3:12 \quad \left(\frac{1}{4} = \frac{2}{8} = \frac{3}{12} \right)$$

できるだけ小さな整数の比にすることを、「比をかんたんにする」といいます。12:18なら、両方を6でわって2:3です。6は、12と18を素数のかけ算に分けると (2-4)、 $12 = 2 \times 2 \times 3$ 、 $18 = 2 \times 3 \times 3$ で、両方にある $2 \times 3 = 6$ です。

$$12:18 = (12 \div 6):(18 \div 6) = 2:3$$

2 比はかけ算でつなげる

図の歯車は、歯の数がAは48、Bは16、Cは8です。かみ合ったところでは、2つの歯車の歯が同じ数ずつ送られます(2-4)。Aが1回転すると歯が48こ送られるので、Bは $48 \div 16 = 3$ 回転します。回転の比はA:B=1:3。同じように、Bが1回転するとCは $16 \div 8 = 2$ 回転するので、B:C=1:2です。Aが1回転すると、Cは何回転するかな？




図2 Bが3回転すると、Cは $3 \times 2 = 6$ 回転。 $\times 3$ と $\times 2$ をつないで $\times 6$ 。

- ① Aが1回転すると、Bは3回転します($\times 3$)。
- ② Bが1回転するごとに、Cは2回転します。Bが3回転すると、Cは「2回転」が3回分で、 $2 \times 3 = 6$ 回転します($\times 2$)。

確かめてみましょう。CはAの歯48こ分を(Bを通して)受けとるので、 $48 \div 8 = 6$ 回転。同じになりました。式で書くと、

$$A:B=1:3, \quad B:C=1:2 \quad \text{なら} \quad A:C=1:(3 \times 2)=1:6$$

比は、かけ算でつなげるのです。Aを1秒に2回転させれば、Cは1秒に $2 \times 6 = 12$ 回転します。

3 割合：もとにする量を1とみる

シュートを10本打って6本入ったAさんと、20本打って11本入ったBさん。どちらが上手かな？ 打った本数がちがうので、1本あたりに直してくらべます。

$$\text{Aさん} \quad 6 \div 10 = 0.6$$

$$\text{Bさん} \quad 11 \div 20 = 0.55$$




図3 打った本数（もとにする量）を1とみると、Aさんの0.6のほうが大きい。

この0.6や0.55のように、もとにする量を1とみたとき、くらべる量がいくつにあたるかをあらわす数を割合といいます。数直線から「10の0.6倍が6」とわかるので、3つの式が作れます。

わりあい 割合 = くらべる量 ÷ もとにする量	$6 \div 10 = 0.6$
くらべる量 = もとにする量 × 割合	$10 \times 0.6 = 6$
もとにする量 = くらべる量 ÷ 割合	$6 \div 0.6 = 10$

表1 Aさんでたしかめた3つの式。覚えなくても、数直線をかけば作れる。

3つの式は、それぞれ次のように考えると作れます。

- ① 割合は「もとにする量1あたり、くらべる量はいくつか」。1あたりの量なので、2-3の速さと同じくわり算です（ $6 \div 10 = 0.6$ ）。
- ② 割合は「何倍か」でもあります。もとにする量の10を0.6倍すると、くらべる量の6になります（ $10 \times 0.6 = 6$ ）。
- ③ ②のかけ算の反対です。「答え×わる数＝わられる数」（2-4）なので、 $6 \div 0.6 = 10$ でもとにする量にもどります。

4 ひゃくぶんりつ 百分率：もとを 100 とみる

割合 0.6 は、もとを 100 とみると 60 にあたります。これを 60% と書き、「60 パーセント」と読みます。この表し方を百分率といいます。

記号カード
初めて出た章 2-5

%

読み方 パーセント
意味 ひゃくぶんりつ 百分率の記号。割合の
0.01 が 1%
英語 percent

野球の打率「3 割 2 分 5 厘」のように、0.1 を 1 割、0.01 を 1 分、0.001 を 1 厘とする表し方を歩合といいます。

割合	1	0.6	0.325	0.1	0.01
百分率	100%	60%	32.5%	10%	1%
歩合	10 割	6 割	3 割 2 分 5 厘	1 割	1 分

表2 割合に 100 をかけると百分率

なぜ 100 をかけるのでしょうか。もとにする量を「1」とみていたのを「100」とみなおすので、もとが 100 倍になり、くらべる量も 100 倍になるからです。反対に、百分率を割合にもどすときは、100 でわります（30% → $30 \div 100 = 0.3$ 、115% → $115 \div 100 = 1.15$ ）。計算するときは、割合（0.3 や 1.15）にもどしてから使います。

5 20% 引きは 0.8 倍、20% 増しは 1.2 倍

1000 円のくつが 20% 引きです。いくらかな？ もとのねだんを 100% とすると、はらうのは $100 - 20 = 80$ (%) で 0.8 倍。 $1000 \times 0.8 = 800$ (円) です。ねびき $1000 \times 0.2 = 200$ (円) を引いても、同じになります。




図4 1 マスが 10%。20% 引きは 8 マス、20% 増量は 12 マス。

20% 増量も、同じように考えます。もとの 100% に 20% をたすと 120% で、割合にもどすと 1.2 です。だから 1.2 倍です。

$$100 + 20 = 120, \quad 120 \div 100 = 1.2$$

第1巻の最後のカード『『20% 引き』ってどれだけ?』の答えは、「もとのねだんの 0.8 倍」です。

6 100% をこえる割合、こえない割合

「? はてな?」の「20% 増量」は、いつもを 100% とすると $100 + 20 = 120$ (%) です。くらべる量がもとより多いので、**100% をこえます**。「去年の 120%」も同じです。

テストの正解の数のように、くらべる量がもとの一部なら、100% をこえません。モーターに入れた電気のエネルギーも、一部は熱や音になってにげます。役に立つ仕事になった割合を**効率**といいます。エネルギーは、どこからかわいてきてふえることはないので、**効率は 100% をこえません**。電気のエネルギーは、1 秒あたりの大きさを W (ワット) という単位で表します。

もっと知りたい ★★

3つの比を1度にか

歯車の回転は $A : B : C = 1 : 3 : 6$ とも書けます。 $A : B = 2 : 3$ 、 $B : C = 4 : 5$ のように、 B の数がそろっていないときは、2-4 の通分と同

じく、3 と 4 の公倍数の 12 に B をそろえます。2 : 3 の両方に 4、4 : 5 の両方に 3 をかけます。

$$A : B = 8 : 12, \quad B : C = 12 : 15 \quad \text{だから} \quad A : B : C = 8 : 12 : 15$$

たいせつ

比の両方に同じ数をかけても、わっても、等しい比になる。

比はかけ算でつなげる。A : B = 1 : 3、B : C = 1 : 2 なら A : C = 1 : 6

割合 = くらべる量 ÷ もとにする量。0.01 が 1%

20% 引きは 0.8 倍、20% 増しは 1.2 倍

この章で出てきたことば

比・比の値 1 : 4 (1 対 4) のように表した 2 つの量の関係。1 ÷ 4 が比の値。

割合 もとにする量を 1 とみたとき、くらべる量がいくつにあたるか。

百分率・歩合 もとを 100 とみた割合 (%)。0.1 を 1 割とする表し方。

効率 入れたエネルギーのうち、役に立つ仕事になった割合。




図 5 上と下が同じ位置どうしで対応する。もとにする量が 1 にあたる。



ミナ

割合の問題は、まずこの 2 本の数直線をかいて、どれがもとにする量をきを決めるといいね。

例題でたしかめよう

例題1 等しい比

(1) $24 : 36$ をかんたんにしましょう。(2) 酢と油を $2 : 3$ でまぜます。酢が 40 mL なら、油は何 mL ?

考え方 (1) は両方を 12 でわる。(2) は両方に $40 \div 2 = 20$ をかける。

しき (1) $24 : 36 = (24 \div 12) : (36 \div 12) = 2 : 3$

(2) $2 : 3 = (2 \times 20) : (3 \times 20) = 40 : 60$

こたえ (1) $2 : 3$ (2) 60 mL

じぶんでとこう1

(1) $18 : 30$ をかんたんに。(2) 青 : 白 = $1 : 4$ 。青 6 g なら白は?

例題2 比をかけ算でつなぐ

歯車 $A \cdot B \cdot C$ の回転の比は、 $A : B = 1 : 2$ 、 $B : C = 1 : 5$ です。A を 1 分に 10 回転させると、C は 1 分に何回転しますか。

考え方 $\times 2$ と $\times 5$ をつなぐと、 $A : C = 1 : (2 \times 5) = 1 : 10$

しき $10 \times 10 = 100$ **こたえ** 100 回転

じぶんでとこう2

$A : B = 1 : 4$ 、 $B : C = 1 : 3$ の歯車。A が 1 秒に 3 回転なら、C は?

例題3 歯の数から回転を求めてつなぐ

自転車の前のギアは歯の数が36、後ろのギアは12です。後ろのギアとタイヤは同じ軸についていて、いっしょに回ります。タイヤは1回転で2m進みます。ペダル（前のギア）を1分に50回転させると、1分で何m進みますか。

考え方 チェーンは、前と後ろのギアの歯を同じ数ずつ送る。ペダル→タイヤ（歯の数でわる）と、タイヤ→道のり（2mをかける）を、かけ算でつなぐ。

しき ペダル1回転で歯が36こ送られるので、タイヤは $36 \div 12 = 3$ （回転）

ペダル1回転で進む道のり： $3 \times 2 = 6$ （m）

1分では： $50 \times 6 = 300$ （m） **こたえ** 300m

じぶんでとこう3

前のギアの歯が44、後ろのギアの歯が22の自転車。タイヤは1回転で2m進みます。ペダルを1分に60回転させると、1分で何m進みますか。

例題4 割合を百分率で

(1) シュート 25 本 中 18 本入った割合は何 %? 歩合では? (2) 50 W (ワット) の電気をいれると、40 W 分の仕事をするモーターの効率はいくらか?

考え方 もとにする量は、(1) は打った 25 本、(2) は入れた電気の量です。

しき (1) $18 \div 25 = 0.72$ $0.72 \times 100 = 72$ で 72%

0.72 は 0.1 が 7 こと 0.01 が 2 こなので、7 割 2 分

(2) $40 \div 50 = 0.8$ $0.8 \times 100 = 80$ で 80%

こたえ (1) 72%、7 割 2 分 (2) 80%

じぶんでとこう 4

(1) 40 問 中 34 問正解は何 %? 歩合では? (2) 200 W 入れて 170 W 分の仕事。効率は?

例題5 100% をこえる割合

図書館の本を借りた人は、去年が 600 人、今年が 690 人でした。(1) 今年はいくら増えたのか? (2) 何 % 増えましたか。

考え方 「去年の」とあるので、もとにする量は去年の 600 人。くらべる量がもとより多いので、100% をこえるはず。

しき (1) $690 \div 600 = 1.15$ $1.15 \times 100 = 115$ (%)

(2) $115 - 100 = 15$ (%) たしかめ: $600 \times 0.15 = 90$, $600 + 90 = 690$

こたえ (1) 115% (2) 15%

じぶんでとこう 5

去年 250 本とれたきゅうりが、今年は 300 本とれました。(1) 今年は去年の何 % ですか。(2) 何 % ふえましたか。

例題 6 百分率から量を求める

(1) 2500 円のくつの 30% 引きは、いくら？ (2) 「20% 増量」で 600 mL のジュース。いつもは何 mL？

考え方 (1) はらうのは 70%。(2) もとにする量 = くらべる量 ÷ 割合

しき (1) $2500 \times 0.7 = 1750$ (円)

(2) $600 \div 1.2 = 500$ (mL) たしかめ: $500 \times 1.2 = 600$

こたえ (1) 1750 円 (2) 500 mL

じぶんでとこう 6

(1) 1800 円の 15% 引きは？ (2) 「25% 増量」で 150 g。いつもは何 g？
(3) いつも 450 mL のジュースが「20% 増量」になると何 mL？

れいだい 例題7 さか 坂のこう配 ばい

すいへい 水平に 200 m すす 進むと 16 m あ 上がる坂があります (こう配は→ 118 ページ)。

(1) こう配は何 % ですか。(2) この坂を水平に 450 m すす 進むと、何 m あ 上がる坂がありますか。

考え方 もとにする量は水平に進んだ長さ、くらべる量は上がった高さ。

(2) は、くらべる量 = もとにする量 × 割合。

しき (1) $16 \div 200 = 0.08$ $0.08 \times 100 = 8$ (%)

(2) $450 \times 0.08 = 36$ (m)

こたえ (1) 8% (2) 36 m




図6 水平に 200 m で 16 m、450 m で 36 m。高さはたてにのばしてかいた。

じぶんでとこう7

すいへい 水平に 300 m すす 進むと 15 m あ 上がる坂。(1) こう配は何 %? (2) 水平に 800 m すす 進むと、何 m あ 上がる?

⚠ まちがえやすいところをチェック

⚠ まちがえやすいところ

20% 引きを 2 回すると、40% 引き？

1000 円を 20% 引きにして、さらにその 20% 引きにすると……

✕ $20 + 20 = 40$ で 40% 引き。 $1000 \times 0.6 = 600$ (円)

○ $1000 \times 0.8 \times 0.8 = 640$ (円)。36% 引き

2 回目は 800 円がもとにする量なので、% どうしはたせません。割合も、かけ算でつながります。

⚠ まちがえやすいところ

逆から見ると、もとにする量も変わる

今年の 180 人は去年の 150 人の 120%。では、去年は今年の何 %？

✕ $100 - 20 = 80$ で 80%

○ $150 \div 180 = 0.833 \dots$ で、およそ 83% (もとは今年の 180 人)

⚠ まちがえやすいところ

比の順番を入れかえる


「原液 1 に水 4」の比は……

✕ 原液 : 水 = 4 : 1 (とてもこいジュースになる)

○ 原液 : 水 = 1 : 4

何と何の比かを、ことばで書いてから数を入れましょう。

ぶつり こうがく つか
物理・工学ではこう使う



うし 後ろの歯の数	は かず タイヤの回転	かいてん すすみ道のり
14	$42 \div 14 = 3$	やく 約 6 m
21	$42 \div 21 = 2$	やく 約 4 m
28	$42 \div 28 = 1.5$	やく 約 3 m

ず 図 7 ペダル 1 回転あたり。タイヤは 1 回転で約 2 m 進む。

● 自転車の変速ギア

「ペダル→タイヤ」と「タイヤ→道」の比を、かけ算でつないでいます。のぼり坂で歯の数が 28 のギアにすると、進む道のりは半分になるかわりに、ペダルが軽くなります。

● ロボットの減速機

モーターは速く回るけれど、回す力は弱いので、歯車で回転をおそくして力を強くします。1つの軸に大小 2つの歯車をつけて 2段つなぐと、回転は $\frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$ のように、かけ算で大きく変わります。

● 坂のこう配

坂の急さは、水平に進んだ長さをもとにした、上がった高さの割合で表します。これをこう配といいます。水平に 100 m で 10 m 上がる坂は、 $10 \div 100 = 0.1$ で 10%。道路の標識で知らせます。鉄道では、もとを 1000 とみた%（パーミル）を使い、箱根登山鉄道には 80 ‰の坂があります。



コラム コピー機の「141%」と「71%」

コピー機で、A4 の紙を A3 の大きさに拡大するときには「141%」、A3 を A4 に縮小

するときには「71%」をえらびます。もと

にする量は、もとの紙の辺の長さです。

A4 のたての長さ 297 mm の 141% は、


$297 \times 1.41 = 418.77$ で約 419 mm。A3

のたての長さ 420 mm とほぼ同じです。

反対に、A3 の長さ 420 mm の 71% は、 $420 \times 0.71 = 298.2$ で約

298 mm。A4 の 297 mm にほぼもどります。なぜ 141 と 71 という

半端な数なのかは、2-8 の平方根でわかります（ $1.41 \dots \times 1.41 \dots$ がちょうど 2 になる数）。



コラム スマートフォンの電池の「%」

スマートフォンの電池の表示「25%」は、満タンにためられる電気の量を

もとにする量（100%）にした割合です。満タンで動画を 10 時間見られる

電池なら、25% の残りでは $10 \times 0.25 = 2.5$ で、約 2.5 時間見られます。

古くなった電池は、満タンの量そのもの（もとにする量）が小さくなるの

で、同じ「100%」でも短い時間しか使えなくなります。



ソラ

チラシの「全品 30% オフ」や天気予報の「降水確率」にも % があるよ。何をもとにしているか、考えてみよう！



しょうまつもんだい
章末問題


2-5 のまとめ

きほん
基本



1 ひ 比をかんたんにしましょう。(1) $8:12$ (2) $45:30$ (3) $36:48$


2 かべ 壁にぬるモルタルは、セメントとすなを $1:3$ の
ひ 比でまぜてつくります。セメントを 4 kg 使うと、すな
は何 kg いらいますか。



3 はぐるま 歯車 $A \cdot B \cdot C$ のかいてん ひ 回転の比は、 $A:B=1:3$ 、 $B:C=1:4$ です。(1) $A:C$
もと を求めましよう。(2) A を 1 分に 20 回転させると、 C は 1 分に何回転しますか。

4 ほん 20 本のシュートのうち 13 本入りました。はい 割割合を、わりあい 百分率と歩合で
あらわ 表ましよう。

5 (1) 3200 円のかばんの 25% 引きは、いくら
ですか。(2) 「 10% 増量」で 440 mL のシャンプー。
いつもは何 mL ですか。




6 (1) 去年 480 人だったお祭りの参加者が、今年は 552 人でした。今年は去
ねん なん 年の何 $\%$ ですか。(2) 60 W の電気をい 入れると、 45 W 分の仕事をするモーター
のこうりつ なん 効率は何 $\%$ ですか。

チャレンジ




7 A 店では 3000 円のゲームが 25% 引き、B 店では同じゲームが 2600 円
で、さらにその 10% 引きです。どちらの店が何円安いですか。

8 自転車の前のギアは歯の数が48、後ろのギアは歯の数が16です。タイヤは1回転で2m進みます。(1) ペダルを1回転させると、タイヤは何回転しますか。(2) ペダルを1分に60回転させると、1分で何m進みますか。



9 水平に500m進むと35m上がる坂のこう配は何%ですか。この坂を水平に1200m進むと、何m上がりますか。



✓ ふりかえり できるようになったかな？

- ☐ 2つの量の関係を比で表し、等しい比をつくれる。 → 106 ページ
- ☐ 比をかけ算でつないで、歯車の回転を求められる。 → 107 ページ
- ☐ 割合を百分率で表し、「20%引き」の量を求められる。 → 109 ページ



デルタ

「何をもとにするか」で、同じ数でも意味が変わるんだ。次の2-6では、はかった数の「ずれ」を割合で表すよ。

2-6

はかった数には「ずれ」がある

追しるべ この章の前に 1-11 1-16 2-1 2-5 この章の先に 2-13 3-14 5-8


この章でできるようになること

- ★ 最小目もりの10分の1まで読み、平均を求められる。
- ★ 四捨五入で、がい数をつくれる。
- ★★ 「5.0 cm」と「5 cm」のちがいを、ずれのはば(±)で説明できる。

? はてな?

クラスの10人が、同じえんぴつの長さを、ものさしではかります。1 mmの目もりのあいだも、目でよく見て細かく読みます。

10人とも、同じ数になるかな? ちがう数になったら、どれが正しいのかな?



△ やってみよう 同じえんぴつを、みんなではかろう

ようい 用意するもの

えんぴつ 1 本、1 mm の目もりのあるものさし、電卓

- ① ものさしの 0 の目もりを、えんぴつのおしりにぴったり合わせよう。
- ② 先が、どの目もとりとどの目もりのあいだにあるかを見よう。
- ③ 1 mm のあいだを 10 に分けたつもりで、いくつ目かを読もう。
- ④ 班の全員が同じえんぴつをはかって、ノートに書こう。全部同じになったかな？




図 1 ものさしを大きくした図。目もりは 1 mm (0.1 cm) ごと。

おも だ 思い出そう この章で使う、前に学んだこと

- 1-11 目もりのあいだは、近いほうを読んで「だいたい」をつける。
- 1-16 $1\text{ mm} = 0.1\text{ cm}$ 。0.1 が 10 こで 1。 $1\text{ cm} = 10\text{ mm}$
- 2-1 小数点のすぐ右が小数第 1 位 ($\frac{1}{10}$ の位)、その右が小数第 2 位 ($\frac{1}{100}$ の位)。
- 2-2 「以上」はその数をふくむ。「未満」はその数をふくまない。
- 2-5 割合 = くらべる量 ÷ もとにする量。割合の 0.01 が 1%




ソラ

ぼくは 14.63、ミナは 14.64、デルタは 14.62。みんなちがう！ だれがまちがえたのかな？

すうがく 数学の道具

1 ^{さいしやうめ}最小目もりの10^{ぶん}分の1^よまで読む

ものさしのいちばんちい小さな目もりを、**最小目もり**とといいます。ふつうのものさしの最小目もりは1mm、つまり0.1cmです。えんぴつの先は、14.6と14.7のあいだにあります。



1 mm を 10 に^わ分けて見る

図2 ^{さいご}最後の3は、^め目で見て決めた数^{かず}（^{めぶんりやう}目分量）。

先は、14.6 から 1 mm の10^{ぶん}分の3^{すす}ぐらい進んだところです。だから 14.63 cm と読みます。このように、最小目もりの10^{ぶん}分の1まで、目で見て読むことを、**目分量**で読むとといいます。

▶ 「10^{ぶん}分の3^き」は、どうやって決めるの？

目もりのない1mmのあいだを、いきなり10に分けるのはむずかしいですね。次の順に考えると、決めやすくなります。下の図は、1mmのあいだを、ほぼ100mmにまで大きくしたものです。




図3 ^{あか}赤い点線は、ほんとうはない目もり。^め頭の中でひいてみる線です。

- ① まず、先が**まん中**（10^{ぶん}分の5）より左か右かを見ます。左なら1～4、右なら6～9のどれかです。ちょうどまん中なら5です。

② 左のとき、「14.6 の目もりのすぐ近く (1 か 2)」「まん中のすぐ近く (4)」「その間 (3)」のどれかを選びます。図の先は、14.6 とまん中のほぼ真ん中なので、3 です。

③ 読んだ数を、14.6 の後ろにつけます。14.6 と 0.03 で、14.63 cm です。

なぜ 10 分の 1 までで止めるの？ 人の目は、1 mm のあいだを、だいたい 10 に分けるくらいまでなら見分けられます。100 に分けようとしても、細かすぎて、もう見ても決められません。それは「はかった」のではなく、「あてずっぽう」になってしまいます。だから、見て決められるいちばん細かいところ、10 分の 1 まで読むのです。

14.63 cm は、何 mm？ 1 cm は 10 mm なので、cm の数を 10 倍すると mm の数になります (2-1 : 10 倍すると小数点が右へ 1 つ)。14.63 × 10 = 146.3 で、146.3 mm です。「14 cm と 6 mm と、さらに 1 mm の 10 分の 3」という意味です。

最後のけたの 3 は、目で決めた数です。人によって 2 や 4 になります。

❓ はてな？ の答えは、「ぜんぶ同じにはならない」です。だれかがまちがえたのではありません。はかった数には、いつも「ずれ」があるのです。

② 平均：でこぼこをならして 1 つの数にする

10 人がはかった結果です。どれも正しい読み方なので、1 つだけを選ぶことはできません。みんなの数を、1 つの数にまとめる方法を考えましょう。

番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
長さ (cm)	14.63	14.65	14.62	14.64	14.66	14.64	14.63	14.65	14.64	14.64

表 1 同じえんぴつを 10 人がはかった長さ

▶ まず、つみ木で「ならす」を見てみよう

3つの山に、つみ木が4こ、2こ、3こあります。でこぼこしていますね。いちばん高い山から1こを、いちばん低い山へ動かすと、どの山も3こになって、たいらになります。これを「ならす」といいます。




図4 1こを動かしても、全部の数（合計）は9こで変わらない。

動かしても、全部の数は9このままです。たいらにした高さは、「9こを3つの山に同じ数ずつ分けた数」と同じです。同じ数ずつ分けるのは、わり算でしたね（1-14）。だから、動かさなくても、計算で求められます。

$$(4 + 2 + 3) \div 3 = 9 \div 3 = 3$$

このように、いくつかの数を同じ大きさにならした数を**平均**といいます。「全部たして（合計）、数の個数でわる」のは、「合計を変えずに、みんなを同じにする」ためです。

$$\text{平均} = \text{合計} \div \text{個数}$$

▶ えんぴつの長さの平均

10人の数を全部たすと146.40です（電卓を使ってよい）。数は10こなので、10でわります。

$$146.40 \div 10 = 14.64$$


10でわると、小数点が左へ1つ動きます（2-1）。平均は14.64 cmです。

くふう：ちがう部分だけたす 10 この
数は、どれも「14.6 何」です。14.60 を
こえた部分だけをたすと、

$$0.03 + 0.05 + 0.02 + \dots + 0.04 = 0.40$$

これを 10 でわると 0.04。14.60 に 0.04
をたして、14.64。同じ答えになります。

小さな数のたし算だけで求められます。




平均は、点が集まっているまん中あたりにきます。ずれは大きいほうにも小さいほうにも出るので、平均すると打ち消しあい、ほんとうの長さに近い数になります。

▶ 平均からのずれ

それぞれの数が、平均からどれだけはなれているかは、ひき算でわかります。大きいほうから小さいほうをひきます。いちばん大きい 14.66 は $14.66 - 14.64 = 0.02$ 、いちばん小さい 14.62 は $14.64 - 14.62 = 0.02$ 。どちらも 0.02 cm (0.2 mm) しかずれていません。10 人の読みは、平均から 0.02 cm の中に全部入っています。平均からのずれが小さいほど、みんなの読みがそろっている、ということです。

3 がい数と四捨五入

14.64 cm を「だいたい何 cm」と、小数第 1 位 (0.1 の位) まで言うとうどんなかな？ 14.64 は、14.6 と 14.7 のどちらに近いでしょう。



数直線で見ると、14.64 は 14.6 に近いので、だいたい 14.6 cm です。近いほうの 14.6 にするときは、小数第 2 位の 4 を捨てるので、切り捨てといいます。

14.67 なら 14.7 のほうが近いので、14.6 を 1 つ上の 14.7 にします。これを切り上げといいます。

14.60 から 14.70 までの数を、全部 表にしてみましょう。

もとの数	14.60	14.61	14.62	14.63	14.64	14.65	14.66	14.67	14.68	14.69	14.70
小数第 1 位まで	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7

表2 青は切り捨て、だいたいは切り上げ

求める位の 1 つ下の数字が 0、1、2、3、4 なら切り捨て、5、6、7、8、9 なら切り上げます。これを四捨五入といい、四捨五入などで求めた、だいたいの数をがい数といいます。「4 までは捨て、5 からは入れる（上にくり上げる）」という意味の名前です。

なぜ 5 は切り上げなの？ 14.65 は、14.6 と 14.7 のちょうどまん中です。どちらにも同じだけ近いので、近さでは決められません。そこで、「5 は上にする」と約束しました。約束があれば、だれが計算しても同じがい数になります。表を見ると、切り捨ても切り上げも 5 つずつで、ちょうど半分ずつになっています。

整数のがい数も同じ 152.3 g を一の位までのがい数にするときは、1 つ下の小数第 1 位の 3 を見て切り捨て、152 g です。

4 「5.0 cm」と「5 cm」はちがう

ある長さを小数第 1 位まではかったら、ちょうど 5 cm の目もりの上でした。これを「5.0 cm」と書くか「5 cm」と書くかで、伝わるのがちがいます。四捨五入を逆から考えてみましょう。

▶ 四捨五入して 5.0 になるのは、どんな長さ？

小数第 2 位まで細かくした長さを、小数第 1 位まで四捨五入してみます。

長さ (cm)	4.94	4.95	4.96	4.97	4.98	4.99	……	5.03	5.04	5.05
四捨五入	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	……	5.0	5.0	5.1

表3 5.0 になるのは、4.95 から 5.04……まで (5.05 は 5.1 になる)

4.94 は 4.9 になり、4.95 から 5.0 になります。上のほうは 5.04 (5.049……もふくむ) まだが 5.0 で、5.05 になると 5.1 です。だから、小数第 1 位まで四捨五入して 5.0 cm になる長さは、**4.95 cm 以上 5.05 cm 未満**です (2-2)。




図 6 「5.0 cm」の 0 は、小数第 1 位まではかったしるし。ずれのはばは 10 分の 1 になる。

5.0 から下へ 0.05、上へ 0.05 のはんいです。だから、5.0 cm と書けば、**およそ ±0.05 cm のずれをふくみます**。「±」は「プラスマイナス」と読み、「大きいほうにも小さいほうにも、それだけずれているかもしれない」という意味です。

同じように、「5 cm」とだけ書くと、一の位まで四捨五入して 5 になる長さ、つまり 4.5 cm 以上 5.5 cm 未満です。ずれは 10 倍の ±0.5 cm もあります。

0.05 はどこから来たの？ 書きたいちばん下のけたは、5.0 なら小数第 1 位で、その 1 つ分は 0.1 です。四捨五入は「近いほう」に決めるので、ずれは 0.1 の半分より大きくなりません。0.1 ÷ 2 = 0.05 です。「5」なら 1 の半分で 0.5、「14.63」なら 0.01 の半分で 0.005 です。まとめると、**ずれのはばは、書きたいちばん下のけたの 1 つ分の半分**です。覚えていなくても、表や数直線をかけば、いつでも確かめられます。

5.0 の 0 は「何もない」ではなく、「小数第 1 位まではかって 0 だった」という意味です。このように、はかった数のうち意味のある数字を**有効数字**といいます。5.0 は 2 けた、5 は 1 けた、14.63 は 4 けたです。

前につく 0 は数えない 0.092 mm の、前の 2 つの 0 は、小数点の位置を表すための 0 です。はかって決まった数字は 9 と 2 なので、有効数字は 2 けたです。

記号カード

初めて出た章 2-6

±

読み方 プラスマイナス
意味 ずれのはば。50.0 ± 0.1 は、49.9 から 50.1 まで
英語 plus-minus

5 ずれの^{おお}大きさを割合で^{わりあい}くらべる

はかった^{あた}値とほんとうの^{あた}値との^ごずれを、^さ誤差といいます。5.0 cm も 50.0 cm も、ずれは ± 0.05 cm です。どちらが^{こま}細かくはかれているかな？

5.0 cm : ずれ 0.05 は、長さの 100 分の 1 (1%)

50.0 cm : ずれ 0.05 は、長さの 1000 分の 1 (0.1%)

図 7 赤い線の^{あか}あたりが、ずれ (± 0.05 cm)。長い^{なが}ほうが、ずれが^め目だたない。

ずれの^{かず}数は同じでも、短い^{おな}物の^{みじか}ずれの^{もの}ほうが^め目立ちます。そこで、はかった^{なが}長さをもとにする^{りょう}量、ずれを^{りょう}くらべる^{わりあい}量にして、ずれの^{もと}割合を求めます (2-5 : 割合 = ^{あい}くらべる^{りょう}量 $\div$ ^{りょう}もとにする^{わりあい}量)。割合に 100 をかけると % になります (割合の 0.01 が 1% だから)。


$$0.05 \div 5.0 = 0.01 \text{ (1\%)}$$

$$0.05 \div 50.0 = 0.001 \text{ (0.1\%)}$$

ずれのは^{おな}ばが同じでも、長い^{なが}物をは^{もの}かった^{わりあい}ほうが、ずれの^{ちい}割合は小さくなります。50.0 cm の^{ばいこま}ほうが、10 倍細かくはかれているのです。

6 まとめては^{かず}かって、数で^わわる

コピー用紙 1 まいの^{ようし}厚さは、ものさしでははかれません。1 mm より^{あつ}ずっとうすいからです。そこで 100 まい^{かさ}重ねてはかると、9.2 mm でした。100 まいが^{おな}同じ^{あつ}厚さだとすると、1 まい^{ぶん}分は 100 に^{ひと}等しく^わ分けた 1 つです。



$$9.2 \div 100 = 0.092 \text{ (mm)}$$

100 で^{しょうすうてん}わると、^{ひだり}小数点は左へ 2 つ^{うご}動きます (2-1)。

なぜ、まとめてはかるとよいの？ ものさしを^よ読む^{なん}ときの^{かさ}ずれは、何まい^{かい}重ねても、1 回^{かい}読む^よかぎり ± 0.05 mm ぐらいで^{おな}同じです。下の^{した}表で、1 まい^{ひょう}だけは^{ばあい}かった場合とくらべましょう。

	1 まいだけのはかる	100 まいはかって 100 でわる
と ^{かず} 読んだ数	やく ^め 0.1 mm (目もり 1 つもない)	9.2 mm → 1 まいは 0.092 mm
ずれ	±0.05 mm	±0.05 mm を 100 でわって ±0.0005 mm
ずれの割合 ^{わりあい}	$0.05 \div 0.1 = 0.5$ (50%)	$0.0005 \div 0.092 = 0.0054 \dots$ (やく ^め 0.5%)

表4 まとめてはかると、ずれの割合が 100 分の 1 になる


1 まいだけだと、ずれが厚さの半分もあって、ほとんど役に立ちません。100 まいまとめてはかると、1 まいあたりのずれは 100 分の 1 になります。

時間も同じ 振り子の 1 往復の時間は 1 秒ぐらいと短いので、ストップウォッチをおすときのずれ (0.1 秒ぐらい、143 ページ) が目だちます。10 往復をはかって 10 でわると、ずれは 10 分の 1 の 0.01 秒ぐらいになります。

ストップウォッチの表示「01:11.50」は、「1 分 11.50 秒」と読みます。「:」の左が分、右が秒です。1 分は 60 秒なので、秒だけで表すと

$$60 \text{ 秒} + 11.50 \text{ 秒} = 71.50 \text{ 秒}$$

分と秒がまざったままでは、わり算ができません。単位を秒にそろえてから計算します (2-10 でくわしく学びます)。



たいせつ

最小目もりの 10 分の 1 まで、目分量で読む。平均 = 合計 ÷ 個数

うすい物や短い時間は、まとめてはかって、数でわる。単位をそろえてから計算する。

はかった値にはずれ (誤差) がある。

5.0 cm と書けば、およそ ±0.05 cm のずれをふくむ。

この章で出てきたことば

目分量 最小目もりのあいだを、目で見ても10に分けて読むこと。

平均 いくつかの数をならした数。合計÷個数。


四捨五入・がい数 0～4は切り捨て、5～9は切り上げ。だいたいの数。

誤差・有効数字 はかった値のずれ。はかった数の、意味のある数字。

例題でたしかめよう

例題1 目分量で読む

消しゴムを、3 cm の目もりから置きました。右のはしは何 cm ですか。
1 mm の10分の1まで読みましょう。



考え方 目もりの数を読んでから、最後の1けたを目分量で決めます。


しき ① はしは、7.3 と 7.4 の目もりのあいだ。

② まんちゅう (10 分の 5) より、すこし右。6 ぐらい。

③ $7.3 + 0.06 = 7.36$ **こたえ** 7.36 cm

じぶんでとこう 1

あお
青いテープの^{みぎ}右のはしは^{なん}何 cm? 1 mm
の^{ぶん}10 分の^よ1 まで読もう。



れいだい 例題 2 ^{へいきん}平均と、まとめてはかる

コピー用紙^{ようし} 100 まいの^{あつ}厚さを^{かい}3 回はかると、9.1 mm、9.3 mm、9.2 mm
でした。(1) ^{へいきん}平均は何 mm? (2) 1 まいの^{あつ}厚さは^{なん}何 mm?

かんが 考え方 (1) ^{ぜんぶ}全部たして、^{かず}数の^{こすう}個数 (はかった^{かいすう}回数^{かいすう}の 3) でわる。(2) 100
まいの^{あつ}厚さを 100 ^{とうぶん}等分するので、^{へいきん}平均を 100 でわる。

しき (1) $9.1 + 9.3 + 9.2 = 27.6$ 、 $27.6 \div 3 = 9.2$

(2) $9.2 \div 100 = 0.092$ (^{しょうすうてん}小数点を^{ひだり}左へ 2 つ)

こたえ (1) 9.2 mm (2) 0.092 mm

じぶんでとこう 2

ふりこ^この 10 ^{おうふく}往復を^{かい}3 回はかると、14.2、14.5、14.2 ^{びよう}秒。(1) ^{へいきん}平均は?
(2) 1 ^{おうふく}往復は何 ^{なんびよう}秒?



例題3

単位をそろえてから、まとめてわる

1円玉を20まい重ねると、高さは3.0 cm でした。1円玉1まいの厚さは何 mm ですか。

考え方

答えは mm で聞かれているので、先に cm を mm になおします。1 cm は 10 mm なので、cm の数を 10 倍します。それから 20 でわります。

しき

① $3.0 \text{ cm} \text{ は } 3.0 \times 10 = 30 \text{ で } 30 \text{ mm}$

② $30 \div 20 = 1.5$

こたえ

1.5 mm



じぶんでとこう3

同じ大きさのクッキーを 15 まい重ねると、高さは 6.0 cm でした。クッキー 1 まいの厚さは何 mm ですか。



例題4

ストップウォッチの表示を秒にする

振り子の 50 往復をはかると、ストップウォッチの表示は「01:11.50」でした。1 往復は何秒ですか。

考え方

「01:11.50」は 1 分 11.50 秒。1 分は 60 秒なので、まず全部を秒にそろえます。それから 50 でわります。

しき

① $60 \text{ 秒} + 11.50 \text{ 秒} = 71.50 \text{ 秒}$

② $71.50 \div 50 = 1.43$

こたえ

1.43 秒

じぶんでとこう 4

振り子の 40 往復をはかると、表示は「01:02.40」でした。1 往復は何秒ですか。

例題 5 四捨五入でがい数にする

(1) 9.96 cm を小数第 1 位までのがい数にしましょう。(2) 2.348 秒を小数第 2 位までのがい数にしましょう。(3) 6.45 kg を小数第 1 位までのがい数にしましょう。

考え方 求める位の、1 つ下の位の数字を見ます。

しき (1) 小数第 2 位は 6 なので切り上げ。9.9 に 0.1 をたして 10.0
小数第 1 位まで書くので、10.0 の 0 は消さない

(2) 小数第 3 位は 8 なので切り上げ。2.348 → 2.35

(3) 小数第 2 位は 5。5 は切り上げなので、6.45 → 6.5

こたえ (1) 10.0 cm (2) 2.35 秒 (3) 6.5 kg

じぶんでとこう 5

がい数にしましょう。(1) 8.27 m を小数第 1 位まで (2) 0.465 秒を小数第 2 位まで (3) 3.95 L を小数第 1 位まで

例題6 有効数字とずれのはば

「8.0 cm」と書いた長さは、何 cm 以上何 cm 未満？ ずれのはばは？

考え方 小数第1位まで四捨五入して8.0になるはんいを考えます。

しき 7.94 は切り捨てて 7.9。7.95 は切り上げて 8.0。

8.04 は切り捨てて 8.0。8.05 は切り上げて 8.1。

ずれのはばは $8.0 - 7.95 = 0.05$ (0.1 の半分)

こたえ 7.95 cm 以上 8.05 cm 未満。±0.05 cm

じぶんでとこう6

「3.6 m」と書かれた長さは、何 m 以上何 m 未満？ ずれのはばは？

例題7 部品のずれと、ずれの割合

部品の長さが「50.0 ± 0.1 mm」と決められています。(1) 何 mm から何 mm までならよいですか。(2) ずれの割合は何 % ですか。

考え方 ±0.1 は「0.1 大きくても小さくてもよい」。(2) はずれ 0.1 がくらべる量、50.0 がもとにする量。

しき (1) 小さいほう $50.0 - 0.1 = 49.9$ 、大きいほう $50.0 + 0.1 = 50.1$

(2) $0.1 \div 50.0 = 0.002$

% にするため 100 をかけて、 $0.002 \times 100 = 0.2$

こたえ (1) 49.9 mm から 50.1 mm まで (2) 0.2%

じぶんでこう7

「 20.0 ± 0.5 g」のおかし。(1) 何^{なん} g から何^{なん} g まで？ (2) ずれ^{わりあい}の割合は？

例題8 はんい^{はい}に入っているかをしら^{しら}べる

「 25.0 ± 0.2 mm」の部品^{ぶひん}を4つはかると、24.75、25.18、25.23、24.81 mm でした。決められたはんい^{はい}に入っているのはどれですか。


かんが^{かんが} かんた^{かんた} 考え方 まず、はんい^{はんい}の両^{りょう}はしを求めます。次に、1つずつ、はし^{はし}の数と^{かず}大きさをくらべます。数直線^{すうちよくせん}にかくと見やすくなります。

しき ① はんいは $25.0 - 0.2 = 24.8$ から $25.0 + 0.2 = 25.2$ まで

② $24.75 < 24.8$ なので外^{そと} (小^{ちい}きすぎ)

$25.23 > 25.2$ なので外^{そと} (大^{おお}きすぎ)

③ 25.18 と 24.81 は、24.8 と 25.2 の間^{あいだ}なので中^{なか}



こたえ 25.18 mm と 24.81 mm

じぶんでこう8

「 10.0 ± 0.1 g」のおもりを4つはかると、9.95、10.12、9.88、10.06 g でした。はんい^{はい}に入っているのはどれですか。

1
例題9 平均と、平均からのずれ

4人が同じロープの長さをはかると、2.31、2.35、2.28、2.34 m でした。

(1) 平均は何 m? (2) 平均からいちばんずれているのはどの値で、何 m ずれていますか。

かんが かんた **考え方** (1) 合計÷個数。(2) 大きいほうから小さいほうをひいて、平均との差を1つずつ求め、くらべます。

しき (1) $2.31 + 2.35 + 2.28 + 2.34 = 9.28$, $9.28 \div 4 = 2.32$
(2) 2.31 は $2.32 - 2.31 = 0.01$, 2.35 は $2.35 - 2.32 = 0.03$
2.28 は $2.32 - 2.28 = 0.04$, 2.34 は $2.34 - 2.32 = 0.02$
いちばん大きいのは、2.28 の 0.04

こたえ (1) 2.32 m (2) 2.28 m で、0.04 m

じぶんでところ9

5回はかった重さが、0.52、0.47、0.50、0.55、0.46 kg でした。(1) 平均は? (2) 平均からいちばんずれているのはどの値で、何 kg?

コラム 身のまわりの「はかる道具」の最小目もり

最小目もり（表示のいちばん小さなきざみ）は道具ごとにちがいます。目もりを読む道具は10分の1まで目分量で読み、数字が出る道具は表示をそのまま読みます。

道具	最小目もり	読み方の例
ものさし	1 mm	14.63 cm（目分量）
理科の温度計	1℃	23.4℃（目分量）
体重計（数字が出る）	0.1 kg	35.2 kg（表示どおり）
ストップウォッチ	0.01 秒	「00:10.08」で 10.08 秒

例題 10 まとめてはかったときの、1 つあたりのずれ

同じ消しゴム 20 こを重ねて高さをはかると、240.0 mm でした。ものさしの読みのずれは ± 0.05 mm です。(1) 1 こ分の高さは何 mm ですか。(2) 1 こあたりのずれは何 mm ですか。

考え方 ものさしは 1 回しか読んでいないので、20 こ分の高さのずれは ± 0.05 mm のままです。高さも、ずれも、20 こで同じように分けるので、どちらも 20 でわります。

しき (1) $240.0 \div 20 = 12.0$

(2) $0.05 \div 20 = 0.0025$

こたえ (1) 12.0 mm (2) ± 0.0025 mm (1 こだけはかるときの 20 分の 1)

じぶんでとこう 10

おな えんだま かさ たか
同じ 1 円玉 50 まいを重ねると、高さは 75.0 mm でした。読みのずれは
±0.05 mm です。(1) 1 まいの厚さは？ (2) 1 まいあたりのずれは？

⚠ まちがえやすいところをチェック

⚠ まちがえやすいところ

5.0 の 0 を消してしまう

しょうすうだい い
小数第 1 位まではかったら、ちょうど 5 cm の目もりでした。

✕ 「5 cm」と書く (ずれが ±0.5 cm のはかり方に見える)

○ 「5.0 cm」と書く (±0.05 cm まではかったしるし)

はかった数の 0 は、「どこまではかったか」を伝える大事な数字です。

⚠ まちがえやすいところ

ししゃごにゅう かい 四捨五入を 2 回してしまう

しょうすうだい い
2.348 を、小数第 1 位までのがい数にすると……

✕ 2.348 → 2.35 → 2.4 (先に小数第 2 位までにしてから、もう 1 度)

○ 2.348 → 2.3 (小数第 2 位の 4 を見て、1 回で切り捨て)

ししゃごにゅう もと くらい した くらい み かい き
四捨五入は、求める位のすぐ下の位だけを見て、1 回で決めます。2.348
は 2.3 と 2.4 のあいだで、2.3 のほうが近いですね (2.35 より小さい)。

⚠ まちがえやすいところ

へいきん 平均で、わる数^{かず}をまちがえる

2重^{じゅう}とびの記録^{きろく}が、3回^{かい}、0回^{かい}、5回^{かい}、4回^{かい}のとき、平均^{へいきん}は……

✕ 0回^{かい}は数え^{かぞ}ない。 $12 \div 3 = 4$ (回^{かい})

○ 0回^{かい}もいれて4つ。 $12 \div 4 = 3$ (回^{かい})

0回^{かい}も1回^{かい}分の記録^{きろく}です。記録^{きろく}は4つなので、4でわります。

⚠ まちがえやすいところ

わりあい ずれの割合で、わる数^{かず}とわられる数^{かず}を逆にする

5.0 cm (ずれ^{わりあい} ± 0.05 cm) のずれの割合^{わりあい}は……

✕ $5.0 \div 0.05 = 100$ で 100%

○ $0.05 \div 5.0 = 0.01$ で 1%

割合^{わりあい}は、くらべる量^{りょう} (ずれ) $\div$ もとにする量^{りょう} (はかった長さ^{なが}) です (2-5)。

ずれ^{なが}が長さ^{なが}と同じ 100% もあるはずがない、と気づけば、まちがい^{まちが}を見つけられます。

⚠ まちがえやすいところ

ストップウォッチの「:」をしょうすうてん おも小数点と思う

表示「01:11.50」を秒になおすと……

✗ 111.50 秒（「:」を消して、そのままならべた）

○ 60 秒 + 11.50 秒 = 71.50 秒

「:」の左は分です。1 分は 100 秒ではなく 60 秒なので、数字をならべるだけではまちがいます。

🔍 コラム ストップウォッチで「10.00 秒ぴったり」をねらおう

画面を見ないでスタートし、10.00 秒だと思ったところで止めます。5 回の記録の例です。

かい 回	1	2	3	4	5
きろく びょう 記録 (秒)	10.21	9.96	10.15	10.08	10.10

5 回の合計は 50.50 なので、平均は次のとおりです。


$$50.50 \div 5 = 10.10 \text{ (秒)}$$

10.00 秒からのずれは $10.10 - 10.00 = 0.10$ で 0.10 秒。ずれの割合は $0.10 \div 10.00 = 0.01$ 、つまり 1% です。ものさしで反応時間をはかる方法は、2-13 で式から作ります。

ぶつり こうがく つか
物理・工学ではこう使う

● ぶひん すんぽう
部品の寸法

せつけいず 設計図には、ゆるされるずれ（公差）も書きます。図の軸の太さが「 50.0 ± 0.1 」なら、こうじょう 工場では部品をはかって、 $49.9 \sim 50.1$ mm に入らないものをはねます。ずれが大きいと、じく あな はい 軸が穴に入らなかったり、がたついたりするからです。



● でん し 電子はかり

ひょうじ 表示が 0.1 g ずつなので、よ 読みのずれは 0.1 はんぶん 半分の ± 0.05 g。そのうえ さいご 最後のけたが少しゆれるので、およそ ± 0.1 g と考えます。



● ストップウォッチとはんのう じ かん 反応時間

ひと み 人は、見てからボタンをおすまでにやく びょう 約 0.2 秒かかります（はんのう じ かん 反応時間）。スタートでもストップでも びょう 約 0.2 秒ぐらいおくれるので、おくれの多くは打ち消しあいます。でも、おくれはまいかいすこ 毎回少しずつちがうので、て 手ではかった時間には はんぶん 半分の びょう 約 0.1 秒ぐらいのずれが残ります。りくじょうきょうぎ 陸上競技ではでん き 電気で時間をはかり、おと 音のき 音から びょう 約 0.1 秒より早く うご 動き出すと、フライングになります。おと き 音を聞いてから びょう 約 0.1 秒より早く うご 動くことは、ひと 人にはできないと考えられているからです。




しょうまつもんだい
章末問題

2-6 のまとめ

きほん
基本



1 最小目もりが1mmのものさしで、物の
のはしが9.5cmと9.6cmの目もりのあい
だの、10分の2ぐらいのところにありまし
た。何cmと読みますか。



2 50mを走るタイムを5回はかると、8.4秒、8.1秒、8.3秒、8.0秒、8.2秒でした。平均は何秒ですか。

3 コピー用紙500まいのたばの厚さは4.6cmでした。1まいの厚さは何mmですか。

4 振り子の20往復をはかると、ストップウォッチの表示は「01:05.20」でした。1往復は何秒ですか。

5 四捨五入して、()の位までのがい数にしましょう。


- (1) 3.14 (小数第1位) (2) 12.55 (小数第1位) (3) 0.506 (小数第2位)
(4) 19.97 (小数第1位)

6 「6.0cm」と書かれた長さは、何cm以上何cm未満と考えられますか。また、ずれのはばはおよそ何cmですか。


7 「 30.0 ± 0.3 mm」と決められた部品があります。(1) 何mmから何mmまでならよいですか。(2) ずれの割合は何%ですか。

チャレンジ ★★

8 「 $12.0 \pm 0.2 \text{ mm}$ 」の部品^{ぶひん}を4つはかると、11.85、12.15、12.24、11.79 mm でした。決め^{きめ}られたはんい^{はんい}に入っているのはどれですか。



9 5人^{にん}が同じ^{おな}ひもの長さ^{なが}をはかると、1.52 m、1.49 m、1.54 m、1.46 m、1.54 m でした。(1) 平均^{へいきん}は何^{なん} m ですか。(2) 平均^{へいきん}からいちばんずれているのは、どの値^{あたい}ですか。何^{なん} m ずれていますか。



10 同じ紙^{おな かみ}を、次の2つの方法^{つぎ ほうほう}ではかります。ものさし^よの読み^{よみ}のずれは、どちらも $\pm 0.05 \text{ mm}$ です。

ア 10 まいで 0.9 mm イ 200 まいで 18.4 mm

(1) それぞれ、1 まいの厚さ^{あつ}は何^{なん} mm ですか。(2) 1 まいあたりのずれは、それぞれ何^{なん} mm ですか。どちらがより細かくはかれていますか。

11 振り子^{ふりこ}の20 往復^{おうふく}を3 回^{かい}はかると、表示^{ひょうじ}は「00:40.20」「00:39.90」「00:40.50」でした。(1) 20 往復^{おうふく}の時間^{じかん}の平均^{へいきん}は何^{なん} 秒^{びょう}ですか。(2) 1 往復^{おうふく}は何^{なん} 秒^{びょう}ですか。

12 電子^{でんし}はかりの表示^{ひょうじ}が「152.3 g」でした。(1) 小数第1 位^{しょうすうだい い}まで四捨五入^{ししゃごにゆう}して152.3 になる重さ^{おも}は、何^{なん} g 以上何^{いじょうなん} g 未満^{みまん}ですか。(2) 152.3 g を一の位^{いち くらい}までのが^{いすう}い数^{すう}にしましょう。

13 次の長さ^{なが}の有効数字^{ゆうこうすうじ}は何^{なん} けたですか。(1) 8.0 cm (2) 14.63 cm (3) 0.092 mm

14 振り子^{ふりこ}の30 往復^{おうふく}を3 回^{かい}はかると、表示^{ひょうじ}は「01:01.20」「01:00.90」「01:01.50」でした。1 往復^{おうふく}は何^{なん} 秒^{びょう}ですか。平均^{へいきん}を求めてから30 でわりま^{もと}しょう。

- 15 「 $40.0 \pm 0.2 \text{ mm}$ 」のねじがあります。(1) 何 mm から何 mm までならよいですか。(2) ずれの割合は何 % ですか。(3) 39.75、40.18、40.25 mmのうち、はんに入っているのはどれですか。


コラム 工場を使う、もっと細かくはかれる道具

機械の部品は、ものさしよりずっと細かくはかります。道具が細かいほど、書けるけた（有効数字）がふえます。

道具	最小目もり	書き方の例
ものさし	1 mm	25.3 mm（目分量）
ノギス	0.05 mm	25.35 mm
マイクロメーター	0.01 mm	25.347 mm（目分量）

コラム 「ずれ」と「まちがい」はちがう

目分量のずれは、どんなにいていねいにはかっても少しは残ります。でも、目もりをななめから見たり、ものさしのはしを0とまちがえたりするのは「まちがい」で、気をつけられなくせます。目もりは、右の図の緑の目のように、**真上（真正面）**から読みましょう。ななめから見ると、先の下にある目もりとちがう目もりに重なって見えます。



コラム 1 つだけ大きくちがう値があったら？

4 人がえんぴつをはかると、14.63、14.65、14.64、15.63 cm でした。15.63 だけが 1 cm も大きく、自分量のずれ (0.01 cm ぐらい) では説明できません。cm の目もりを 1 つ読みちがえた「まちがい」かもしれません。

● 4 つの平均：合計は 59.55 なので、 $59.55 \div 4 = 14.8875$ (約 14.89)

● 15.63 をのぞいた 3 つの平均： $43.92 \div 3 = 14.64$

1 つのまちがいで、平均が約 0.25 cm も大きくなってしまいました。大きくちがう値が出たら、すぐに平均に入れず、もう一度はかり直して確かめましょう。

✓ ふりかえり できるようになったかな？

- ☐ 最小目もりの 10 分の 1 まで読み、平均を求められる。 → 124 ページ
- ☐ 四捨五入で、がい数をつくれる。 → 127 ページ
- ☐ 「5.0 cm」と「5 cm」のちがいを ± で説明できる。 → 128 ページ



ミナ

はかった数は、「どこまではかったか」もいっしょに伝えているんだね。0 も大事な数字なんだ。

おお かず ちい かず たん い 大きな数・小さな数・単位

? かみ かい お つき とど
紙を42回折ると、月まで届く？

? めん せき せい ほう けい ぺん なん
面積が 2m^2 の正方形、1辺は何m？

? じ そく びょう そく なん
時速72kmは、秒速何m？



とても大きな数も小さな数も、10を何回かけたかで書けるよ。
2回かけると2になる数や、世界じゅうで使う単位のきまりも
学ぼうよ。

この部^ぶで学^{まな}ぶこと

2-7

なんかい 何回もかける：累乗^{るいじょう}と指数^{しすう}

×2 ★★★★★ P.150

かみ 紙を 42 回折ると、月^{つき}まで届^{とど}く？

2-8

かい 2 回かけると口^{くち}になる数^{かず}：平方根^{へいほうこん}

×2 ★★★★★ P.168

めんせき 面積^{めんせき}が 2m^2 の正方形^{せいほうけい}、1 辺^{へん}は何^{なん} m？

2-9

ぶんすう 分数^{ぶんすう}で書^かけない数^{かず}がある？

🚀 ★★★★★ P.184

$\sqrt{2}$ は、どこまで計算^{けいさん}しても終^おわらない

2-10

たんい 単^{たん}位の^い世界^{せかい}ルール：SI 単^{たん}位^い

🏆 ★★★★★ P.202

じそく 時速^{じそく} 72km は、秒速^{びょうそく} 何^{なん} m？

この部^ぶを読^よむと…

ひかり はや 光^{ひかり}の速^{はや}さも原子^{げんし}の大き^{おお}さも、同^{おな}じ書^かき方^{かた}で書^かけるようになります。単^{たん}位^いをそろえる力^{ちから}は、計^{けい}算^{さん}のまちがいを見^みつけ^{ちから}る力^{ちから}になります。

2-7

何回もかける： 累乗と指数

道しるべ この章の前に 1-2 1-21 2-1 2-2 この章の先に 2-8 2-10 2-12 2-17 5-14

この章でできるようになること

- ★ 同じ数を何回もかけた数を、 2^3 のような累乗で書いて計算できる。
- ★ 体積の単位 ($\text{cm}^3 \cdot \text{m}^3 \cdot \text{L}$) や大きな数を、10 の累乗で表せる。
- ★★ 指数のきまりで計算でき、0 乗やマイナスの指数の意味がわかる。

? はてな?

コピー用紙 1 枚の厚さは、約 0.1 mm です。半分に折ると、厚さは 2 倍。もう 1 回折ると、そのまた 2 倍になります。もし何回でも折れるとしたら、42 回折った紙の厚さは、地球から月（約 38 万 km）までとどこでしょうか？



折るたびに 2 倍、2 倍、……。同じ数を何回もかけると、数はおどろくほど速く大きくなります。この章では、そんな計算を短く書く方法と、その計算のきまりを見つけます。


△ やってみよう 紙を折って、重なりを数えよう

① コピー用紙を1枚用意して、半分に折る。

② 折るたびに、紙が何枚重なったかを数えて、ノートの上に書こう（折り目の反対がわからなくなるとよい）。

③ 5回折ったら、ものさしで厚さをはかろう。

④ 何回まで折れたかな？



折った回数	0	1	2	3	4	5	6
重なった枚数	1	2	4	?	?	?	?
厚さ (mm)	0.1	0.2	0.4	?	?	?	?

1回折るごとに、枚数は何倍になるかな？ 5回折った厚さは、計算すると何mmかな？


🕒 思い出そう この章で使う、前に学んだこと

- 1-2 10が10こで100、100が10こで1000。10こ集まると、1つ左の位に進む。
- 1-21 1辺が1cmの正方形の広さが 1cm^2 。長方形の面積は、たて×よこ。
- 1-9 $1\text{L} = 1000\text{mL}$
- 2-1 $\frac{1}{10}$ にすると、小数点が左へ1けた動く（ $1 \rightarrow 0.1 \rightarrow 0.01$ ）。

数学の道具

1 同じ数を何回もかける：累乗

㊦ やってみよう で、紙を折るたびに、重なった枚数は2倍になりました。枚数を、かけ算の式で書いてみましょう。



3 回折ったときの $2 \times 2 \times 2$ は、2 を 3 回かけた数です。これを短く 2^3 と書き、「2 の 3 乗」と読みます。右かたの小さな数を**指数**といいます。

2^3 ← 指数：2 を 何回かけるか

$$2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$$

2^3 のように、同じ数をいくつかかけたものを**累乗**といいます。折った回数が、そのまま指数になっていますね。4 回折ると $2^4 = 16$ 枚です。1 回だけのときは、2 を 1 つだけ書くので $2^1 = 2$ と書きます。

▶ 表にすると、1 つ右へ行くごとに $\times 2$

2^4 は、 $2^3 = 8$ にもう 1 つ 2 をかけたものです。だから、前の答えに 2 をかければ、次の答えが出ます。2 を何回も書かなくて済みます。

累乗	2^1	2^2	2^3	2^4	2^5	2^6	2^7	2^8	2^9	2^{10}
答え	2	4	8	16	32	64	128	256	512	1024

表1 2 の累乗。右へ 1 つ進むと、2 を 1 回多くかけるので 2 倍になる。

指数がたった 10 なのに、答えは 1000 をこえました。 $2^{10} = 1024$ は、この章で何度も使います。


▶ 2 以外の数でも同じ

累乗は、どんな数でも作れます。3 を 2 回かけた $3 \times 3 = 9$ は 3^2 (3 の 2 乗)、10 を 3 回かけた $10 \times 10 \times 10 = 1000$ は 10^3 (10 の 3 乗) です。1 は何回かけても 1 なので、 $1^5 = 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 = 1$ です。

② 面積は 2 乗、体積は 3 乗


1 辺 3 cm の正方形の面積は、 $3 \times 3 = 3^2 = 9$ で 9 cm^2 です (1-21)。 cm^2 の小さな 2 も、「cm を 2 回かけた」というしるしです。

では、1 辺 3 cm の立方体 (さいころの形) の大きさは？ 1 辺 1 cm の立方体は何こ入るか数えると、1 だんに $3 \times 3 = 9$ こ、それが 3 だんで $3 \times 3 \times 3 = 3^3 = 27$ こです。



cm^2 (平方センチメートル) の 2 は、たて (cm) とよこ (cm) の 2 つの長さをかけたので、cm を 2 回かけている、という意味です。同じように、立方体の大きさは、たて・よこ・高さの 3 つの長さをかけるので、cm を 3 回かけた cm^3 で表します。1 辺 1 cm の立方体の大きさを 1 cm^3 (1 立方センチメートル) といい、物の大きさ (かさ) を **体積** といいます。2 乗を **平方**、3 乗を **立方** ともいいます。

1 L は、1 辺 10 cm の立方体に入る水の量と決められています。その体積は $10^3 = 10 \times 10 \times 10 = 1000$ で 1000 cm^3 。1 L は 1000 mL でもあるので (1-9)、 1000 等分した 1 mL は、ちょうど 1 cm^3 です。



(絵の大きさの比はちがいます)

1辺1mの立方体の体積は 1m^3 (1立方メートル) です。これは何 cm^3 でしょう。1mは100cmなので、1辺1cmの立方体が、1だんに $100 \times 100 = 10000$ こならび、それが100だん重なります。

$$1\text{m}^3 = 100 \times 100 \times 100\text{cm}^3 = 1000000\text{cm}^3$$

1000cm^3 が1Lなので、Lにするには1000でわります。

$$1000000 \div 1000 = 1000$$

だから、 $1\text{m}^3 = 1000\text{L}$ です。おふろの水 (約200L) の $1000 \div 200 = 5$ で、5はい分です。

3 大きな数は、10の累乗で

10を何回もかけると、10、100、1000、……と、1のあとの0が1つつふえます。10を4回かけた 10^4 は10000で、1万です。

	数字	累乗
1万	10000	10^4
1億	100000000	10^8
1兆	1000000000000	10^{12}

0が4つつえるごとに、名前が万→億→兆と変わります。指数は、1のあとにつく0の数です。

光は1秒間に、約3000000000m進みます。0を数えるのはたいへんです。3000000000は、3のあとに0が8つ。 1000000000 (1億) の3つ分なので、 $3000000000 = 3 \times 1000000000 = 3 \times 10^8$ です。 3×10^8 と書けば、ひと目で「3億」とわかります。

▶ 3でない数のとき：小数点を動かして考える

地球から月までの約38万km (380000km) は、どう書けばよいでしょう。10倍すると小数点が右へ1つ動きます (2-1)。3.8を10倍、10倍、……としていくと、




図 1 3.8 に 10 を 5 回かけると 380000。だから $380000 = 3.8 \times 10^5$

10 を 5 回かけると 380000 になるので、 $380000 = 3.8 \times 10^5$ です。反対に、380000 の小数点を左へ 5 つ動かすと 3.8 になる、と考えても同じです。動かした数が指数になります。

なぜ×の前を 1 以上 10 より小さくするの？ 380000 は 38×10^4 と 0.38×10^6 と書けます。書き方がいくつもあると、くらべにくいですね。そこで、×の前を 1 以上 10 より小さい数にする約束にします。すると、指数を見るだけで大きさの見当がつかます。 3.8×10^5 （月まで）と 3×10^8 （光が 1 秒で進む距離。ただし m）なら、指数の 5 と 8 がすぐ目に入ります。

理科では、光の速さを $3.0 \times 10^8 \text{ m/s}$ と書きます。ほんとうの値は約 $2.998 \times 10^8 \text{ m/s}$ ですが、有効数字 2 けた（2-6）に四捨五入して 3.0 です。3.0 の 0 は、「小数第 1 位まで考えて 0」というしるしでしたね。

④ 指数のきまり：かけ算は指数をたす

$10^2 \times 10^3$ はいくつでしょう。10 を全部で何回かけているか、数えてみます。

$$10^2 \times 10^3 = \underbrace{10 \quad 10}_{2 \text{ 回}} \times \underbrace{10 \quad 10 \quad 10}_{3 \text{ 回}} = 10^5$$

$2 + 3 = 5 \text{ 回}$

10 を 2 回と 3 回、あわせて 5 回かけています。指数は $2 + 3 = 5$ なので、答えは 10^5 です。 $100 \times 1000 = 100000$ で、たしかに 0 が 5 つです。2 でも同じで、 $2^3 \times 2^4 = 2^{3+4} = 2^7 = 128$ ($8 \times 16 = 128$)。同じ数の累乗どうしのかけ算は、**指数をたせばよい**のです。

わり算は、**分数の形にして約分**します（2-4）。

$$10^5 \div 10^2 = \frac{10 \times 10 \times 10 \times \cancel{10} \times \cancel{10}}{\cancel{10} \times \cancel{10}} = 10^3$$

10 が2つ消えるので、指数は $5 - 2 = 3$ 。わり算は、**指数をひけばよい**のです ($100000 \div 100 = 1000$)。

② はてな? の答え 42 回折った紙は 2^{42} 枚。 $42 = 10 + 10 + 10 + 10 + 2$ なので、指数のきまりから

$$2^{42} = 2^{10} \times 2^{10} \times 2^{10} \times 2^{10} \times 2^2$$

$2^{10} = 1024$ は、ほぼ 1000 です。だから、10 回折るごとに、厚さは約 1000 倍になります。電卓で、0.1 mm に 1024 をくり返しかけていきましょう。数が大きくなったら、単位を大きくして読みやすくします。

お折る	けいさん 計算 (mm)	たんい 単位をなおす
10 回	$0.1 \times 1024 = 102.4$	1 cm = 10 mm なので $\div 10$ 。約 10 cm
20 回	$102.4 \times 1024 = \text{約 } 104858$	1 m = 1000 mm なので $\div 1000$ 。約 105 m
30 回	約 105 m の約 1024 倍	約 107374 m。1 km = 1000 m なので $\div 1000$ 。約 107 km
40 回	約 107 km の約 1024 倍	約 109951 km。約 11 万 km
42 回	40 回の $2^2 = 4$ 倍	約 439805 km。約 44 万 km

ひょう 表2 単位をなおすときは、1 つ上の単位の中に、下の単位がいくつ入るかでわる。

数の大きさを、身近なものにたとえてみると、こうなります。


お折る回数	10 回	20 回	30 回	40 回	42 回
あつ 厚さ	約 10 cm	約 105 m	約 107 km	約 11 万 km	約 44 万 km
たとえば	はがきのはば	ビルの 30 階	宇宙に入る	地球を約 3 周	つきをこえる

(ビルは 1 階約 3.5 m で、 $105 \div 3.5 = 30$ 。地球 1 周は約 4 万 km で、 $11 \div 4 = 2.75$ で約 3 周。宇宙は地上約 100 km から。)

42 回で約 44 万 km。月までの約 38 万 km をこえるので、答えは「とどく」です (41 回では約 22 万 km で、まだとどきません)。ただし、ほんとうの紙は、7~8 回折るのがやっとです。

5 0 乗とマイナスの指数

10 の累乗を、指数を 1 つずつへらしてならべてみましょう。



指数が 1 へると、数は 10 でわった大きさになっています。このきまりがつかうように、10 でわって、その先を決めます。

$$10^0 = 1, \quad 10^{-1} = \frac{1}{10} = 0.1, \quad 10^{-2} = \frac{1}{10^2} = \frac{1}{100} = 0.01$$

2 の累乗でも、 $2^2 = 4$ 、 $2^1 = 2$ から 2 でわっていくと、

$$2^0 = 1, \quad 2^{-1} = \frac{1}{2}, \quad 2^{-2} = \frac{1}{2^2} = \frac{1}{4}$$

0 乗は、10 でも 2 でも 1。マイナスの指数は、「1 をその数で何回わるか」を表します。

▶ わり算のきまりからも、同じ答えになる

「わり算は指数をひく」のきまりで、 $10^3 \div 10^3$ を計算してみます。同じ数でわるので、答えは 1 です ($1000 \div 1000 = 1$)。指数をひくと $3 - 3 = 0$ で、 10^0 です。2 つの答えは同じはずなので、 $10^0 = 1$ と決めるのが自然です。

同じように、 $10^2 \div 10^3$ は、 $100 \div 1000 = \frac{100}{1000} = \frac{1}{10}$ 。指数をひくと $2 - 3 = -1$ で、 10^{-1} です。だから $10^{-1} = \frac{1}{10}$ 。表で作った答えと、ぴったりあ合いますね。

紙の枚数でも確かめられます。0 回折った (まだ折っていない) 紙は 1 枚で、 $2^0 = 1$ です (🔄 やってみよう の表の 0 回)。

こう決めると、指数のきまりがそのまま使えます。 $10^3 \times 10^{-1} = 10^{3+(-1)} = 10^2$
($3 + (-1) = 2$ は 2-2 のたし算) は、 $1000 \times \frac{1}{10} = 100$ とぴったり合います。

10^{-1} はマイナスの数ではない $10^{-1} = 0.1$ は、0 より大きい数です。指数のマイナスは「わる」ことを表していて、数がマイナスになるわけではありません。 $10^{-3} = \frac{1}{1000} = 0.001$ は、1 m の 1000 分の 1、つまり 1 mm の大きさです (2-10 でまた使います)。

もっと知りたい ★★

累乗の累乗

10^2 を 3 回かけると、指数は $2 + 2 + 2 = 6$ なので、 $(10^2)^3 = 10^6$ です。
1 m = 10^2 cm なので、 1 m^3 は $(10^2)^3 = 10^6 \text{ cm}^3$ 。数学の道具 2 で求めた 1000000 cm^3 (0 が 6 つ) と合います。

たいせつ

同じ数を 3 回かけた数は、 $2 \times 2 \times 2 = 2^3$ のように書く。

$$10^2 \times 10^3 = 10^{2+3} = 10^5 \quad (\text{かけ算は指数をたす})$$

$$10^5 \div 10^2 = 10^{5-2} = 10^3 \quad (\text{わり算は指数をひく})$$

$$10^0 = 1, 10^{-1} = \frac{1}{10}, 10^{-2} = \frac{1}{10^2} = \frac{1}{100}$$

この章で出てきたことば

累乗 同じ数をいくつかかけたもの。 2^3 は「2 の 3 乗」。

指数 右かたの小さな数。何回かけるかを表す。

平方・立方 2 乗と 3 乗のこと。 cm^2 の 2、 cm^3 の 3。

体積 物の大きさ (かさ)。1 mL = 1 cm^3 、1 L = 1000 cm^3

記号カード

初めて出た章 2-7

2^3

読み方 2 の 3 乗
意味 2 を 3 回かけた数。
 $2 \times 2 \times 2 = 8$
英語 2 to the 3rd power

記号カード

初めて出た章 2-7

cm^3

読み方 立方センチメートル
意味 体積の単位。
 $1\text{L} = 1000\text{cm}^3$
英語 cubic centimeter

例題でたしかめよう

例題 1 累乗を計算する

(1) 3^4 (2) 1^5 (3) 10^5 を計算しましょう。

考え方 指数の数だけ、同じ数をかけます。前から順に 1 つずつかけます。

しき (1) $3^4 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 9 \times 3 \times 3 = 27 \times 3 = 81$

(2) $1^5 = 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 = 1$ (1 は何回かけても 1)

(3) $10^5 = 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 100000$

こたえ (1) 81 (2) 1 (3) 100000

じぶんでとこう 1

(1) 4^3 (2) 1^8 (3) 10^6 を計算しましょう。

例題2 時間を分になおして、倍になる回数を求める

20 分ごとに 2 つに分かれてふえる細菌があります。1 こが 2 時間後には何こになりますか。

考え方 「20 分ごと」なので、時間を分にとそろえます。1 時間は 60 分です。2 時間の中に 20 分がいくつあるかが、2 倍になる回数です。

- しき** ① 2 時間は、60 分の 2 つ分。 $60 \times 2 = 120$ で 120 分
 ② 2 倍になる回数は $120 \div 20 = 6$ (回)
 ③ 1 こを 6 回 2 倍にするので、 $1 \times 2^6 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 64$

こたえ 64 こ

じぶんでとこう2

例題2 の細菌は、1 こが 3 時間後には何こになりますか。

例題3 立方体の体積と L

1 辺 20 cm の立方体の箱に入る水は、何 cm^3 、何 L ですか。

考え方 1 辺 1 cm の立方体が、1 だんに 20×20 こ、それが 20 だん。1 L は 1000 cm^3 なので、L にするには 1000 でわります。

- しき** ① $20^3 = 20 \times 20 \times 20 = 400 \times 20 = 8000$
 ② $8000 \div 1000 = 8$

こたえ 8000 cm^3 、8 L

じぶんでところ 3

1 辺 30 cm の立方体の水そうに入る水は、何 cm^3 、何 L ですか。

例題 4 おお 大きな数を 10 の累乗で

(1) 5 億、(2) 1 億 5000 万を、 $\square \times 10^\Delta$ の形で書きましょう。(3) 4×10^6 を数字で書きましょう。

かんが 考え方 1 億は 100000000 (1 のあとに 0 が 8 つ) なので 10^8 。 $\square$ は 1 以上 10 より小さい数にします。

しき (1) 5 億は 1 億の 5 ぶん。 $500000000 = 5 \times 100000000 = 5 \times 10^8$

(2) 150000000 の小数点を左へ 8 つ動かすと 1.5

だから $150000000 = 1.5 \times 100000000 = 1.5 \times 10^8$

(3) $10^6 = 1000000$ なので、 $4 \times 10^6 = 4 \times 1000000 = 4000000$

こたえ (1) 5×10^8 (2) 1.5×10^8 (3) 4000000 (400 万)

じぶんでところ 4

(1) 7 兆、(2) 1 億 2000 万を、 $\square \times 10^\Delta$ の形で書きましょう。(3) 2.5×10^5 を数字で書きましょう。

例題5 指数のきまりを使う

(1) $10^4 \times 10^3$ (2) $2^7 \div 2^3$ (3) $10^5 \times 10^{-2}$ を累乗で、(4) 10^{-3} を小数で表しましょう。

考え方 かけ算は指数をたす。わり算は指数をひく。マイナスの指数は、1をその数で何回わるか。

しき (1) $10^{4+3} = 10^7$ (2) $2^{7-3} = 2^4$ ($128 \div 8 = 16$)
(3) $10^{5+(-2)} = 10^3$ (4) $10^{-3} = \frac{1}{10^3} = \frac{1}{1000} = 0.001$

こたえ (1) 10^7 (2) 2^4 (16) (3) 10^3 (1000) (4) 0.001

じぶんでとこう5

(1) $10^2 \times 10^6$ (2) $10^8 \div 10^5$ (3) $10^{-1} \times 10^{-2}$ を累乗で、(4) 2^{-3} を分数で表しましょう。

コラム 紙は、ほんとうは何回折れる？

コピー用紙は、7~8回折るのがやっとです。折るたびに厚さは2倍、広さは半分になるからです。2002年、アメリカの高校生が、長さ約1.2kmのトイレットペーパーを12回折ることに成功しました。 $2^{12} = 4096$ 枚の重なりです。

例題6 はじめて口をこえるのは何回め？

厚さ 0.1 mm の紙を、何回でも折れるとします。厚さがはじめて 10 cm をこえるのは、何回折ったときですか。

考え方 単位を mm にそろえます。1 cm = 10 mm なので、10 cm = 100 mm。厚さは「 $0.1 \times (2 \text{ の累乗})$ 」なので、2 の累乗の表を順に見て、100 をこえる所をさがします。

折った回数	7	8	9	10
厚さ (mm)	12.8	25.6	51.2	102.4

しき ① 9 回： $0.1 \times 2^9 = 0.1 \times 512 = 51.2$ (mm)

まだ 100 にとどかない

② 10 回： $0.1 \times 2^{10} = 0.1 \times 1024 = 102.4$ (mm)

100 をこえた

こたえ 10 回 (約 10.2 cm)

じぶんでこう6

1 この細菌が 20 分ごとに 2 倍にふえます。はじめて 100 こをこえるのは何分後ですか。また、それは何時間何分後ですか。

⚠ まちがえやすいところをチェック

⚠ まちがえやすいところ

指数を、かける数にしてしまう

✕ $2^3 = 2 \times 3 = 6$

○ $2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$

指数の3は、2を「3回かける」という意味です。

⚠ まちがえやすいところ

かけ算で、指数どうしをかけてしまう

✕ $10^2 \times 10^3 = 10^{2 \times 3} = 10^6$

○ $10^2 \times 10^3 = 10^{2+3} = 10^5$

10を2回と3回、あわせて5回かけています（0は5つ）。

⚠ まちがえやすいところ

マイナスの指数を、マイナスの数にしてしまう

✕ $10^{-1} = -10$

○ $10^{-1} = \frac{1}{10} = 0.1$

指数のマイナスは「1を10で何回わるか」です。答えは0より大きい数です。

⚠ まちがえやすいところ

2^3 と 3^2 を同じだと思ふ

✗ $2^3 = 3^2$


○ $2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8, 3^2 = 3 \times 3 = 9$

下の大きい数が「かける数」、右かたの数が「かける回数」です。入れかえると別の数になります。

🔗 物理・工学ではこう使う


スイッチとメモリー

スイッチ 1 つは、入 (1) か切 (0) の 2 通り。3 つなら $2^3 = 8$ 通り、10 こなら $2^{10} = 1024$ 通り。コンピュータのメモリーは、0 か 1 をおぼえる小さなスイッチの集まりです (2-17)。メモリーの大きさでは、 $2^{10} = 1024$ を「1K (キロ)」とよぶことがあります (ふつうの 1 km の k は 1000)。



細菌と冷蔵庫

食中毒の原因になる細菌には、あたたかい所で 20 分ほどで 2 倍にふえるものがあります。10 時間は $60 \times 10 = 600$ で 600 分、 $600 \div 20 = 30$ で 30 回 2 倍になるので、 $2^{30} = 1073741824$ 、約 10 億倍です。冷蔵庫で冷やすと、2 倍になるまでの時間がとても長くなります。





しょうまつもんだい
章末問題

2-7 のまとめ

きほん
基本



- 1 次の計算をしましょう。(1) 2^4 (2) 5^3 (3) 10^5 (4) 1^{10}
- 2 1辺 10 cm の立方体の体積は何 cm^3 ですか。それは何 L ですか。また、 1 m^3 は何 L ですか。
- 3 次の数を、 $\square \times 10^\Delta$ の形で書きましょう ($\square$ は1以上10より小さい数)。
(1) 3億 (2) 6兆 (3) 25万 (4) 地球から太陽までの約 150000000 km
- 4 次の計算をして、答えを累乗の形で書きましょう。
(1) $10^3 \times 10^5$ (2) $2^4 \times 2^3$ (3) $10^9 \div 10^4$ (4) $2^{10} \div 2^2$
- 5 次の数を、整数か分数か小数で表しましょう。
(1) 10^0 (2) 10^{-2} (小数で) (3) 2^{-1} (分数で) (4) $10^4 \times 10^{-4}$
- 6 次の数を、ふつうの数字で書きましょう。
(1) 10^6 (2) 2.5×10^4 (3) 7×10^8

チャレンジ



- 7 厚さ 0.1 mm の紙を、何回でも折れるとします。厚さが初めて 1 m (1000 mm) をこえるのは、何回折ったときですか。
- 8 細菌が 20 分ごとに 2 倍にふえます。1 こが 1000 こをこえるのは、何分後ですか。表のつづきをノートに書いて考えましょう。

時間 (分)	0	20	40	60	80	
細菌の数 (こ)	1	2	4	8	?	

9 $10^3 \times 10^{-3}$ を指数のきまりで計算すると、 $10^\square$ になります。□にあてはまる数と、その答えが1になることを、数で確かめましょう。

コラム 兆の次は？

兆の1万倍が1京 (10^{16})、その1万倍が1垓 (10^{20})。名前は0が4つふえるごとににつき、いちばん大きな「無量大数」は 10^{68} です。2012年に完成した日本のスーパーコンピュータ「京」は、1秒間に1京回 (10^{16} 回) の計算ができることから名づけられました。

✓ ふりかえり できるようになったかな？

- ☐ 同じ数を何回もかけた数を、累乗で書いて計算できる。 → 152 ページ
- ☐ 体積の単位や大きな数を、10の累乗で表せる。 → 154 ページ
- ☐ 指数のきまり、0乗、マイナスの指数がわかる。 → 155 ページ



ミナ

指数を使うと、月までの距離も、とても小さな数も、短く書けるね。
次の2-8では、2乗を「逆から」考えるよ。

第2部 大きな数・小さな数・単位

★★

2-8

2回かけると□になる数： 平方根

道しるべ この章の前に 1-21 2-2 2-6 2-7 この章の先に 2-9 2-15 3-10 4-4 6-6

この章でできるようになること

- ★★ 正方形の面積から1辺を、2乗ではさんで求められる。
- ★★ $\sqrt{\quad}$ の意味がわかり、電卓や計算で平方根を求められる。
- ★★ 振り子の周期が、糸の長さの $\sqrt{\quad}$ に比例することを説明できる。

? はてな?


面積が 2 m^2 の正方形の花だん

を作ります。1辺を何 m にすればよいでしょう。


1辺 1 m では 1 m^2 、1辺 2 m では 4 m^2 。1辺を 1.5 m にすると……?



1 m



? m




2 m

2乗すると面積になる数を、逆にさがします。この章では、そんな数に名前と記号をつけ、振り子のゆれる時間にもかかっていることを見つけます。

△ やってみよう 振り子の周期をはかろう

- ① 糸の先におもりをつけて、支点からおりのまん中までを 10 cm にする。
- ② 小さくふらして、10 往復する時間をストップウォッチではかる。3 回はかって平均しよう (2-6)。
- ③ 10 でわって、1 往復の時間を求める。これを周期という。
- ④ 糸の長さを 4 倍の 40 cm、9 倍の 90 cm にして、同じようにはかろう。



いと なが 糸の長さ	10 cm	40 cm	90 cm
おうふく じ かん びょう 10 往復の時間 (秒)	6.3	12.7	19.0
しゅうき びょう 周期 (秒)	0.63	1.27	1.90

ひょう 表 1 はかった例。長さを 4 倍・9 倍にすると、周期は何倍になったかな？

🕒 思い出そう この章で使う、前に学んだこと

- 1-21 正方形の面積 = 1 辺 × 1 辺
- 2-7 $3 \times 3 = 3^2$ (3 の 2 乗)。2 乗を平方ともいう。
- 2-2 マイナス × マイナスはプラス。 $(-3) \times (-3) = 9$
- 2-6 四捨五入で小数 第 2 位までにすると、1.414 は 1.41


すうがく どうぐ 数学の道具

① 面積から1辺を求める

1辺を2乗すると、正方形の面積になります。表を逆に読めば、面積から1辺がわかります。

1辺 (m)	1	2	3	4	5	
	↓ ↑	↓ ↑	↓ ↑	↓ ↑	↓ ↑	↓ 2乗する ↑ もともにもどす
面積 (m ²)	1	4	9	16	25	

たとえば、面積が9m²の正方形なら、1辺1mの正方形が9こ入ります。9こを正方形にならべるには、たてに3こ、よこに3こ(3×3=9)です。だから1辺は3m。面積が25m²なら、5×5=25なので5mです。



つまり、「2乗すると9になる数は？」と考えればよいのです。2乗の計算を、逆の向きにたどっています。

② 2乗ではさんで、少しずつ近づく

では、**②はてな？**の2m²は？ 整数では、2乗してちょうど2になる数はありません。1²=1は2より小さく、2²=4は2より大きいので、1辺は1と2の間です。

▶ 小数の2乗の計算

1.4を2乗するには、どうすればよいでしょう。1.4は $\frac{14}{10}$ です(2-4)。分数のかけ算は、分子どうし・分母どうしをかけるので、

$$1.4 \times 1.4 = \frac{14}{10} \times \frac{14}{10} = \frac{14 \times 14}{10 \times 10} = \frac{196}{100} = 1.96$$

小数点より下のけたが 1 つずつの数をかけると、答えは小数点より下が 2 けたになります。電卓で 1.4×1.4 をおしても、1.96 と出ます。

▶ 表で、2 をはさむ

1.1 から 0.1 ずつ大きくして、2 乗を表にします。

1 辺 (m)	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
2 乗 (m ²)	1.21	1.44	1.69	1.96	2.25

表 2 1.4 と 1.5 のあいだで、2 乗が 2 をこえる

$1.4^2 = 1.96$ は 2 より小さく、 $1.5^2 = 2.25$ は 2 より大きい。だから 1 辺は 1.4 と 1.5 の間です。こうして、2 乗が 2 より小さい数と大きい数ではさみ、はばを $\frac{1}{10}$ ずつせまくしていきます。図の 1 本めの数直線の 1.4~1.5 の間を 10 に分けて大きくしたのが 2 本め、その 1.41~1.42 を大きくしたのが 3 本めです。




図 1 2 乗すると 2 になる数を、はさみうちでさがす。色の部分を次の線で 10 倍に大きくしている。

❓ はてな? の答えは約 1.41 m です。1 m は 100 cm なので、0.41 m は $0.41 \times 100 = 41$ で 41 cm。約 1 m 41 cm です。でも、 1.414^2 も、まだぴったり 2 ではありません。どこまでせまくしても、ぴったりにはならないのです (2-9)。

3 記号 $\sqrt{\quad}$ (ルート)

2乗すると2になる正の数を、 $\sqrt{2}$ と書き、「ルート2」と読みます。

$$\sqrt{2} = 1.41421356\ldots, \quad \sqrt{9} = 3, \quad \sqrt{25} = 5$$

2乗して9になる数は、3だけではありません。

$(-3)^2 = (-3) \times (-3) = 9$ からです (2-2: マイナス×マイナスはプラス)。

2乗して□になる数を、□の平方根といいます。9の平方根は3と-3の2つ。

$\sqrt{9}$ は、そのうちの正のほうの3です。長さはマイナスにならないので、1辺を求めるときは正のほうを使います。

0とマイナスの数は？ $0^2 = 0$ なので、0の平方根は0だけです。また、正の数を2乗しても、負の数を2乗しても、答えはプラスになります。だから、この巻で学ぶ数の中には、2乗して-4のようなマイナスになる数はありません (そういう数は6-8で新しく考えます)。

$\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2$ $\sqrt{2}$ は「2乗すると2になる数」なので、2回かけると、決めたとおりに2になります。電卓で $1.41421356 \times 1.41421356$ を計算すると、1.9999999...と、2にとっても近い数が出ます。

1.9999999...と、2にとっても近い数が出ます。

1.9999999...と、2にとっても近い数が出ます。

1.9999999...と、2にとっても近い数が出ます。

1.9999999...と、2にとっても近い数が出ます。

1.9999999...と、2にとっても近い数が出ます。

1.9999999...と、2にとっても近い数が出ます。

1.9999999...と、2にとっても近い数が出ます。

1.9999999...と、2にとっても近い数が出ます。

1.9999999...と、2にとっても近い数が出ます。

1.9999999...と、2にとっても近い数が出ます。

1.9999999...と、2にとっても近い数が出ます。

1.9999999...と、2にとっても近い数が出ます。

1.9999999...と、2にとっても近い数が出ます。

1.9999999...と、2にとっても近い数が出ます。

1.9999999...と、2にとっても近い数が出ます。

1.9999999...と、2にとっても近い数が出ます。

1.9999999...と、2にとっても近い数が出ます。

1.9999999...と、2にとっても近い数が出ます。

1.9999999...と、2にとっても近い数が出ます。

1.9999999...と、2にとっても近い数が出ます。

1.414213562

2

$\sqrt{\quad}$


2を入れて $\sqrt{\quad}$ キー

5 振り子の周期は、長さの $\sqrt{\quad}$ に比例する

㊤ やってみよう の表では、糸の長さを4倍にすると周期は2倍、9倍にすると3倍になりました。4 = 2²、9 = 3² です。つまり、周期の倍は、長さの倍の $\sqrt{\quad}$ になっています ($\sqrt{4} = 2$ 、 $\sqrt{9} = 3$)。

では、長さを2倍の20 cm にしたら？

予想は $\sqrt{2}$ 倍で、 $0.63 \times 1.41 = 0.89$ 秒。はかってみると約0.90秒で、予想どおりです。グラフは直線ではなく、だんだんねていく曲線になります。



一方が2倍、3倍、……になると、もう一方も2倍、3倍、……になるとき、**比例する**といいます (くわしくは2-15)。振り子の周期は、長さ**に比例する**のではなく、**糸の長さの $\sqrt{\quad}$ に比例**します。

▶ **表で確かめる：周期 ÷ $\sqrt{\text{長さ}}$ はいつも約2**

比例しているなら、周期を $\sqrt{\quad}$ (長さ)でわった数は、いつも同じになるはず。長さをmにして、電卓で計算してみます (10 cm は $10 \div 100 = 0.1$ で 0.1 m)。

長さ (m)	0.1	0.2	0.4	0.9
$\sqrt{\text{長さ}}$	0.316	0.447	0.632	0.949
周期 (秒)	0.63	0.90	1.27	1.90
周期 ÷ $\sqrt{\text{長さ}}$	1.99	2.01	2.01	2.00

表3 どの長さでも、ほぼ2になる

どれもほぼ2です。だから、長さ (m) の $\sqrt{\quad}$ を2倍すると、周期 (秒) のおよその値になります。この2は、はかった表から見つけた数です。1 m の振り子なら $\sqrt{1} = 1$ で、周期は約2秒です。なぜ $\sqrt{\quad}$ になるのか、なぜ約2なのかは、6-6で式から求めます。

グラフが曲がるわけ 長さを0.1から0.4へ0.3ふやすと、周期は0.64秒ふえます。でも0.4から0.9へ、もっと多い0.5ふやしても、周期は0.63秒しかふえません。長くなるほど、周期はふえにくくなるので、グラフはだんだんねていきます。

もっと知りたい ★★

電卓の $\sqrt{\quad}$ キーがないとき

2を1.5でわると1.333…。1.5と1.333…の平均は1.4167。こんどは2を1.4167でわって、また平均をとると1.414216。2回くり返すだけで、 $\sqrt{2} = 1.414213\dots$ のすぐ近くまで来ました。コンピュータも、にた方法で $\sqrt{\quad}$ を計算しています。

たいせつ

2乗すると□になる数を、□の平方根という。

(□が0より大きいとき) 正と負の2つある。正のほうを $\sqrt{\square}$ と書く。

$$\sqrt{9} = 3, \sqrt{2} = 1.41421\dots$$

$$\sqrt{2} \times \sqrt{3} = \sqrt{6} \quad (\text{かけ算は中どうしをかけてよい})$$

振り子の周期は、糸の長さの $\sqrt{\quad}$ に比例する。

この章で出てきたことば

平方根 2乗すると、その数になる数。9の平方根は3と-3。0の平方根は0だけ。

周期 振り子が1往復する時間。くり返す動きの1回分の時間。


比例 一方が2倍、3倍になると、もう一方も2倍、3倍になること(2-15)。

記号カード

初めて出た章 2-8



読み方 ルート
意味 2 乗すると中の数になる正の数。 $\sqrt{9} = 3$
英語 square root



例題でたしかめよう

例題 1 平方根を求める

(1) 49 の平方根を求めましょう。(2) $\sqrt{81}$ (3) $\sqrt{0.09}$ を求めましょう。

考え方 2 乗すると、その数になる数をさがします。平方根は正と負の 2 つ、 $\sqrt{\quad}$ は正のほうです。小数のときは、0.1、0.2、0.3、……を順に 2 乗してさがします。

しき (1) $7^2 = 49$ 、 $(-7)^2 = 49$

(2) $9^2 = 81$

(3) $0.3^2 = \frac{3}{10} \times \frac{3}{10} = \frac{9}{100} = 0.09$

こたえ (1) 7 と -7 (2) 9 (3) 0.3

じぶんでこう 1

(1) 64 の平方根を求めましょう。(2) $\sqrt{100}$ (3) $\sqrt{0.16}$ を求めましょう。

例題2 はさみうちで1辺を求める

面積が 10 m^2 の正方形の1辺を、小数第2位まではさんで求め、四捨五入して小数第1位までのがい数で答えましょう。

考え方 2乗が10より小さい数と大きい数ではさみます。

しき $3^2 = 9$ 、 $4^2 = 16$ なので、3と4の間

$3.1^2 = 9.61$ 、 $3.2^2 = 10.24$ なので、3.1と3.2の間

$3.16^2 = 9.9856$ 、 $3.17^2 = 10.0489$ なので、3.16と3.17の間

こたえ $3.16\cdots$ を四捨五入して、約 3.2 m

じぶんでとこう2

面積が 5 cm^2 の正方形の1辺を、小数第2位まではさんで求め、小数第1位までのがい数で答えましょう。

例題3 $\sqrt{\quad}$ の大きさの見当をつける

$\sqrt{30}$ は、どの2つの整数の間にありますか。

考え方 整数を順に2乗して、30より小さいものと大きいものではさみます。

しき $5^2 = 25$ は30より小さく、 $6^2 = 36$ は30より大きい

2乗して30になる数は、5より大きく6より小さい

こたえ 5と6の間

じぶんでとこう 3

$\sqrt{60}$ は、どの 2 つの整数の間にありますか。

例題 4 電卓と $\sqrt{\quad}$ のかけ算

(1) $\sqrt{3}$ を電卓で求め、小数第 2 位までのがい数にしましょう。(2) $\sqrt{2} \times \sqrt{8}$ (3) $\sqrt{3} \times \sqrt{12}$ を計算しましょう。

考え方 かけ算は、中の数どうしをかけます。

しき (1) $\sqrt{3} = 1.7320\dots$ の小数第 3 位を四捨五入

(2) $\sqrt{2} \times \sqrt{8} = \sqrt{16} = 4$ (3) $\sqrt{3} \times \sqrt{12} = \sqrt{36} = 6$

こたえ (1) 1.73 (2) 4 (3) 6

じぶんでとこう 4

(1) $\sqrt{5}$ を電卓で求め、小数第 2 位までのがい数にしましょう。(2) $\sqrt{2} \times \sqrt{18}$ (3) $\sqrt{5} \times \sqrt{5}$ を計算しましょう。


コラム 1 メートルは振り子で決まるはずだった？

230 年ほど前、フランスで長さの単位を決めるとき、「片道がちょうど 1 秒の振り子の長さ」(約 0.994 m) を 1 メートルにしよう、という案がありました。でも、周期は場所によって少し変わるので、地球の大きさをもとに決めることになりました。それでも、2 つの長さはほとんど同じです(2-10 のコラムも見てください)。

例題 5 面積を何倍かにすると、1 辺は？

1 辺 1 m の正方形があります。(1) 面積を 4 倍にするには、1 辺を何倍にすればよいですか。(2) 面積を 2 倍にするには、約何倍ですか。

考え方 1 辺を□倍にすると、たても□倍、よこも□倍になるので、面積は□×□倍になります(下の図)。□×□が 4 や 2 になる□をさがします。



1 辺を 2 倍にすると、
たても 2 倍、よこも 2 倍。
面積は $2 \times 2 = 4$ (倍)

しき (1) $2 \times 2 = 4$ なので、1 辺は $\sqrt{4} = 2$ で 2 倍

(2) $\square \times \square = 2$ になる□は $\sqrt{2} = 1.41 \dots$

こたえ (1) 2 倍 (2) 約 1.41 倍

じぶんでとこう 5

正方形の (1) 面積を 16 倍にするには、1 辺を何倍に？ (2) 面積を 3 倍にするには、1 辺を約何倍に？ (電卓を使い、小数第 2 位までのがい数で)

例題 6 振り子の周期

長さ 25 cm の振り子の周期は約 1.0 秒です。(1) 長さを 1 m にすると、周期は何秒ですか。(2) 周期を 3.0 秒にするには、長さを何 m にすればよいですか。

考え方 周期の倍は、長さの倍の $\sqrt{\quad}$ 。逆に、長さの倍は、周期の倍の 2 乗です ($\sqrt{\square}$ が 3 なら、 $\square$ は $3^2 = 9$)。倍をくらべるときは、単位をそろえます。

しき (1) ① 1 m は 100 cm なので、長さは $100 \div 25 = 4$ (倍)

② 周期は $\sqrt{4} = 2$ (倍) なので、 $1.0 \times 2 = 2.0$

(2) ① 周期は $3.0 \div 1.0 = 3$ (倍)

② 長さは $3^2 = 9$ (倍) なので、 $25 \times 9 = 225$ (cm)

③ 100 cm が 1 m なので、 $225 \div 100 = 2.25$ (m)

こたえ (1) 約 2.0 秒 (2) 2.25 m

じぶんでこう 6

長さ 10 cm の振り子の周期は 0.63 秒です。(1) 長さ 1.6 m のときの周期は？ (2) 周期を 1.89 秒にするには、長さを何 cm に？

⚠ まちがえやすいところをチェック

⚠ まちがえやすいところ

$\sqrt{\quad}$ のたし算で、中どうしをたしてしまう

✕ $\sqrt{2} + \sqrt{3} = \sqrt{5}$

○ $\sqrt{2} + \sqrt{3} = 1.414\cdots + 1.732\cdots = 3.146\cdots$

$\sqrt{5} = 2.236\cdots$ なので、ちがいます。中どうしをかけてよいのは、かけ算のときだけです。

⚠ まちがえやすいところ

2乗を「2をかける」と思う

✕ $1.4^2 = 1.4 \times 2 = 2.8$

○ $1.4^2 = 1.4 \times 1.4 = 1.96$

2乗は「同じ数を2回かける」ことです(2-7)。2をかけるのではありません。

⚠ まちがえやすいところ

平方根を1つだけ答える

✕ 9の平方根は3

○ 9の平方根は3と-3。 $\sqrt{9}$ は正のほうで3

$(-3)^2 = 9$ なので、-3も9の平方根です。

⚠ まちがえやすいところ

ながさを 2 倍にすると、周期も 2 倍と考える

✗ ながさ 2 倍 → 周期 2 倍

○ ながさ 2 倍 → 周期 $\sqrt{2}$ 倍 (約 1.41 倍)


周期は、ながさの $\sqrt{\quad}$ に比例します。周期を 2 倍にするには、ながさを 4 倍にします。

🌀 物理・工学ではこう使う

A 判の紙

A4 の紙は 210 mm × 297 mm。


$297 \div 210 = 1.414\dots$ で、短い辺と長い辺の比は $1 : \sqrt{2}$ です。この形だと、半分に切っても同じ形になります (A5 は 148 mm × 210 mm、 $210 \div 148 = 1.42$)。面積が 2 倍の A3 にすると、辺は $\sqrt{2}$ 倍。コピー機で A4 を A3 に広げるときの「141%」は、 $\sqrt{2} = 1.41$ のことです。



ぜんたい全体が A3

振り子時計

ながさ約 1m の振り子は、周期が約 2 秒。片道がちょうど 1 秒です。時計が進むときは、おもりを下げてながさを長くし、周期を長くします。ながさのえ方は、周期のえ方の 2 乗になることに注意します。





しょうまつもんだい
章末問題

2-8 のまとめ

きほん
基本



- 1 つぎ かず もと 次の数を求めましょう。(1) 36 の平方根 (2) $\sqrt{121}$ (3) $\sqrt{0.49}$
- 2 めんせき 面積が 30 m^2 の正方形の 1 辺を、小数 第 2 位まではさんで求め、小数 第 1 位までのがい数で答えましょう。
- 3 でんたく もと 電卓で求め、小数 第 2 位までのがい数にしましょう。(1) $\sqrt{7}$ (2) $\sqrt{11}$
- 4 つぎ けいさん 次の計算をしましょう。(1) $\sqrt{3} \times \sqrt{3}$ (2) $\sqrt{2} \times \sqrt{32}$ (3) $\sqrt{5} \times \sqrt{20}$
- 5 なが 長さ 50 cm の振り子の周期は約 1.4 秒です。長さ 2 m の振り子の周期は、約何秒ですか。
- 6 つぎ かず 次の数は、どの 2 つの整数の間にありますか。(1) $\sqrt{20}$ (2) $\sqrt{50}$

チャレンジ



- 7 せいほうけい めんせき 正方形の面積を 9 倍にするには、1 辺を何倍にすればよいですか。面積を 2 倍にするには、約何倍ですか。
- 8 なが 長さ 25 cm で周期 1.0 秒の振り子があります。周期を 2.0 秒にするには、長さを何 cm にすればよいですか。
- 9 $\sqrt{2} \times \sqrt{2}$ と $\sqrt{4}$ は、どちらも 2 になります。 $\sqrt{2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{2}$ はいくつですか。

コラム $\sqrt{\quad}$ の値のおぼえ方

むかし 昔から、ごろ合わせでおぼえる方法があります。電卓で計算して、合っているか確かめよう。

あたい 値	ごろ合わせ
$\sqrt{2} = 1.41421356 \dots$	ひとよひとよにひとみごろ
$\sqrt{3} = 1.7320508 \dots$	ひとなみにおごれや
$\sqrt{5} = 2.2360679 \dots$	ふじさんろくおうむなく

✓ ふりかえり できるようになったかな？

- ☐ 面積から 1 辺を、2 乗ではさんで求められる。 → 170 ページ
- ☐ $\sqrt{\quad}$ の意味がわかり、平方根を求められる。 → 172 ページ
- ☐ 周期が長さの $\sqrt{\quad}$ に比例することを説明できる。 → 173 ページ



ソラ

$\sqrt{2}$ は、どこまで計算しても終わらなかったね。次の 2-9 では、「分数で書けない数」のなぞにせまるよ。

2-9

分数で書けない数がある？

道しるべ この章の前に 1-15 1-19 2-4 2-8 この章の先に 2-19 4-2 4-4 5-14

この章でできるようになること

- ★★ 分数を小数にすると、終わるかくり返すかのどちらかになるわけがわかる。
- ★★ $\sqrt{2}$ や π のように、分数で書けない数（無理数）があることがわかる。
- ★★ 円周 = 直径 $\times \pi$ を使って、円周や直径を求められる。

？ はてな？

電卓で計算してみましょう。1 $\div$ 4 は 0.25 で終わります。1 $\div$ 7 は終わりませんが、142857 がくり返されます。では、2-8 の $\sqrt{2}$ は？ コンピュータで何十けたも計算しても、終わりもしないし、くり返しも見つかりません。 $\sqrt{2}$ は、分数で書けるのでしょうか？

1 $\div$ 4 0.25 （終わる）


1 $\div$ 7 0.142857 142857 142857 ... （くり返す）

$\sqrt{2}$ 1.41421356237309504880168872420969807856 ...

分数は、わり算の答えでした（2-4）。この章では、分数を小数にしたときのきまりを見つけ、そのきまりにあてはまらない数をさがします。

🔪 やってみよう 円周 ÷ 直径をはかろう

- 1 かんやコップなど、丸い物を用意する。
- 2 紙テープを1周まきつけ、重なった所に印をつける。テープの長さが円周。
- 3 直径をものさしではかる。
- 4 電卓で、円周 ÷ 直径を計算しよう。



もの物	かん	コップ	皿	テープのしん
直径 (cm)	6.6	7.5	20.0	7.6
円周 (cm)	20.8	23.5	62.8	23.9
円周 ÷ 直径	3.15	3.13	3.14	3.14

表1 はかった例。大きさがちがっても、円周 ÷ 直径は、いつも同じくらいの数になる。

🕒 思い出そう この章で使う、前に学んだこと

- 2-4** 分数はわり算の答え。 $2 \div 3 = \frac{2}{3}$ 。約分すると $\frac{25}{100} = \frac{1}{4}$
- 1-15** わり算のあまりは、わる数より小さい。
- 2-8** $\sqrt{2}$ は、2乗すると2になる正の数。 $\sqrt{2} = 1.41421 \dots$
- 1-19** 円の直径は、半径の2つ分。

すうがく 数学の道具

1 分数を小数にすると、終わるかくり返す

分数を小数にするには、分子÷分母を計算します（2-4）。まず、終わる例の $\frac{1}{4} = 1 \div 4$ を、1 けたずつ見てみましょう。

▶ わり算を1 けたずつ進める

1 は 4 より小さいので、一の位は 0 です。1 を 0.1 が 10 こ分と考えて（2-1）、10 を 4 でわります。 $10 \div 4 = 2$ あまり 2 なので、小数第 1 位は 2。あまりの 2（0.1 が 2 こ）を、こんどは 0.01 が 20 こ分と考えて、 $20 \div 4 = 5$ あまり 0。小数第 2 位は 5 で、あまりが 0 になったので終わりです。 $\frac{1}{4} = 0.25$ 。


つまり、「あまりに 0 をつけて 10 倍し、また分母でわる」をくり返すと、小数のけたが 1 つずつ出てきます。同じように $\frac{1}{7}$ を、あまりに注目して進めてみましょう。

わられる数	10	30	20	60	40	50	10
商（答えのけた）	1	4	2	8	5	7	1
あまり	3	2	6	4	5	1	3

6 回目のあまりが 1 になり、最初と同じ「 $10 \div 7$ 」にもどりました。同じわり算からは、同じ商と同じあまりが出ます。だから、ここから先は同じ計算のくり返しで、

$$\frac{1}{7} = 0.142857142857 \dots$$

となります。右の図は、あまりがぐるぐる回ります。



▶ なぜ、かならずくり返すの？

7 でわったあまりは、0～6 の 7 通りしかありません（1-15：あまりはわる数より小さい）。

① あまりが 0 になれば、わり算は終わります（ $\frac{1}{4} = 0.25$ のように終わる小数）。

② 0 にならないとき、あまりは 1～6 の 6 通りのどれかです。わり算を 7 回つづけると、あまりが 7 こ出ます。6 通りしかないのに 7 こ出るので、どれか 2 つはかならず同じです（6 つの部屋に 7 人が入ると、どこかの部屋は 2 人になるのと同じ）。

③ 同じあまりが出たら、そこから先は同じ計算のくり返しです。

分母が 7 でなくても、考え方は同じです。分母が 13 なら、あまりは 0～12 の 13 通り。どんな分数でも、かならず終わるか、くり返すかのどちらかになります。

すぐにはくり返さないこともある $\frac{1}{6} = 0.1666\cdots$ は、小数第 1 位の 1 のあとから 6 がくり返します（ $10 \div 6 = 1$ あまり 4、 $40 \div 6 = 6$ あまり 4、……と、あまり 4 がつづく）。はじめの何けたかがちがっても、どこかから先がくり返せば、くり返す小数のなかまです。

たいせつ

分数を小数にすると、終わる小数か、くり返す小数になる。

▶ 反対に、小数を分数にもどす

終わる小数は、 $0.25 = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$ のように、 $10 \cdot 100 \cdot 1000 \cdots$ を分母にして分数にもどせます。0.25 は 0.01 が 25 こ分、つまり $\frac{1}{100}$ が 25 こ分だからです。

くり返す小数はどうでしょう。まず $\frac{1}{9}$ を小数にします。 $10 \div 9 = 1$ あまり 1 で、あまりがいつも 1 なので、 $\frac{1}{9} = 0.111\cdots$ と 1 がずっとつづきます。同じように、 $\frac{1}{99}$ は $100 \div 99 = 1$ あまり 1 がつづくので、 $\frac{1}{99} = 0.010101\cdots$ です。

0.333... は 0.111... の3つ分

$$\rightarrow 3 \times \frac{1}{9} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

0.121212... は 0.010101... の12こ分

$$\rightarrow 12 \times \frac{1}{99} = \frac{12}{99} = \frac{4}{33}$$

だから、小数点のすぐ後からくり返す小数は、くり返す部分を、くり返すけたの数だけ9をならべた数（1けたなら9、2けたなら99）でわった分数にもどせます。電卓で $12 \div 99$ を計算して確かめよう。整数も $3 = \frac{3}{1}$ と書けます。このように、分子も分母も整数の分数で表せる数を**有理数**といいます。

② $\sqrt{2}$ は分数で書けない

$\sqrt{2}$ に近い分数を2乗して、ぴったり2になるものをさがします。たとえば $\frac{7}{5}$ を2乗すると、分数のかけ算（2-4）で

$$\frac{7}{5} \times \frac{7}{5} = \frac{7 \times 7}{5 \times 5} = \frac{49}{25}$$

2を分母25の分数にすると $\frac{50}{25}$ です。49と50はおいしいけれど、ちがいますね。

2乗がぴったり2になるには、**分子×分子が、分母×分母の2倍とぴったり同じ**でなければなりません。もっと大きな分数でもためてみましょう。

分数	分子×分子	分母×分母×2	2乗すると
$\frac{7}{5}$	49	50	1.96
$\frac{17}{12}$	289	288	2.0069...
$\frac{41}{29}$	1681	1682	1.9988...
$\frac{99}{70}$	9801	9800	2.0002...
$\frac{577}{408}$	332929	332928	2.000006...

表2 $\sqrt{2}$ に近い分数。いつも1だけずれて、ぴったり2にならない。

じつは、どんな分数を2乗しても、ぴったり2にはならないことが証明できます（もっと知りたい）。分子も分母も整数の分数で表せない数を**無理数**といいます。 $\sqrt{2}$ は無理数なので、小数にすると、終わりもくり返しもしません。これ

が **② はてな？** の答えです。√ の中が 1、4、9、16、…… (整数の 2 乗) でない整数のときも、同じように分数で書けません。

🔍 もっと知りたい ★★★

√2 が分数で書けないわけ

2 でわりきれぬ整数 (2、4、6、……) を偶数、わりきれない整数 (1、3、5、……) を奇数といいます。奇数 × 奇数は奇数 ($3 \times 3 = 9$ 、 $5 \times 7 = 35$)、偶数にどんな整数をかけても偶数です。

もし $\sqrt{2}$ が、これ以上約分できない分数で書けたとすると、


- 分子 × 分子 = 2 × 分母 × 分母。右は偶数なので、分子 × 分子も偶数。奇数 × 奇数は奇数なので、分子は偶数。
- 分子 = 2 × □ と書くと、 $4 \times \square \times \square = 2 \times \text{分母} \times \text{分母}$ 。両方を 2 でわって、 $\text{分母} \times \text{分母} = 2 \times \square \times \square$ 。1. と同じように、分母も偶数。
- 分子も分母も偶数なら、2 で約分できます。「これ以上約分できない」に合いません。だから、「分数で書けた」がまちがいです。

③ えんしゅうりつ 円周率 π

㊦ やってみよう では、円の大きさがちがっても、円周 ÷ 直径はいつも 3.14 くらいになりました。この数を円周率といい、ギリシャ文字の π (パイ) で表します。

$$\pi = 3.14159265358979 \dots, \quad \text{円周} = \text{直径} \times \pi$$

はかると、どうしても少しずれます。計算で π をはさんでみましょう。円の内側の正六角形は、6つの正三角形に分けられ、1辺が半径と同じなので、まわりの長さは半径6つ分、つまり直径の3倍。外側の正方形のまわりは直径の4倍。円周はその間なので、 π は3より大きく4より小さい。外側も正六角形にすると 3.464...倍。角の数をふやすと、多角形が円にぴったりよりそっていき、はさむはばがせまくなります。



内側に正六角形、外側に正方形

正多角形の角の数	6	12	24	48	96
π より小さい (内側)	3	3.105	3.132	3.139	3.1410
π より大きい (外側)	3.465	3.216	3.160	3.147	3.1428

表3 正多角形のまわり ÷ 直径。内側は小さめに、外側は大きめにけたを切った。2200年ほど前、アルキメデスは正96角形で 3.14 まで求めた。

12角形から先の数は、4-4 で学ぶ三平方の定理をくり返し使うと計算できます。

なぜ、どんな円でも円周 ÷ 直径は同じなの？

円は、どれも同じ形で、大きさだけがちがいます。直径を2倍にした円は、小さい円をそのまま2倍に拡大したものなので、まわりの長さも2倍になります。

直径も円周も2倍なので、わたた答えは変わりません ($\frac{2 \times \text{円周}}{2 \times \text{直径}}$ は2で約分

できる)。(A) やってみよう で、かんでも皿でも 3.14 くらいになったのは、このためです。円周 ÷ 直径が π なので、かけ算にもどすと、円周 = 直径 × π です (速さ = 道のり ÷ 時間から、道のり = 速さ × 時間にもどすのと同じ。2-3)。

円周 ÷ 直径はいつも同じ数ですが、円周と直径を両方とも整数にすることはできません。 π も無理数であることが証明されています（大学で学ぶ方法を使います）。3.14 は、 π に近い数です。

4 数直線は、すきまなく数でうまっている

数直線の上に、 $\sqrt{2}$ の点をコンパスでとってみます。1 辺 1 の正方形の対角線は $\sqrt{2}$ です（2-8 の $\sqrt{\quad}$ のカードのとなりの図）。0 を中心に、対角線の長さで円をかくと、数直線と $\sqrt{2}$ の所で交わります。




図 1 緑は有理数、ほかは無理数。どちらも数直線の上にある。

分数の点だけでは、 $\sqrt{2}$ や π の所が「穴」になってしまいます。有理数と無理数をあわせると、数直線はすきまなくうまります。5-14 で学ぶ $e = 2.71828 \dots$ も、分数で表せない数です。分数で書けない数は、じつはたくさんあるのです。

たいせつ

分子も分母も整数の分数で表せる数が有理数、表せない数が無理数。 $\sqrt{2}$ 、 π は無理数。

円周 = 直径 $\times \pi$ ($\pi = 3.14159 \dots$ 、計算では 3.14 を使う)

この章で出てきたことば

有理数 分子も分母も整数の分数で表せる数。小数にすると、終わるか、くり返す。

無理数 分子も分母も整数の分数で表せない数。小数にすると、終わらず、くり返もしない。


円周率 円周 ÷ 直径。どんな円でも同じ数で、 π と書く。

記号カード

初めて出た章 2-9

π

読み方 パイ
意味 円周率。円周 ÷ 直径。
3.14159...
英語 pi



例題でたしかめよう

例題1 分数を小数にする

- (1) $\frac{3}{8}$ (2) $\frac{5}{11}$ を小数に。 (3) $\frac{5}{11}$ の小数第10位の数字は？

考え方 分子÷分母を計算します。くり返すときは、くり返す部分を見つめます。

しき (1) $3 \div 8 = 0.375$ (あまりが6、4、0 となって終わる)

(2) $5 \div 11 = 0.454545\ldots$ (あまりが6、5、6、5、……)

(3) 「45」の2けたを1組と考える。 $10 \div 2 = 5$ あまり0
ちょうど5組で終わるので、組の最後のけたの5

こたえ (1) 0.375 (終わる) (2) 0.4545... (くり返す) (3) 5

じぶんでとこう1

- (1) $\frac{7}{20}$ (2) $\frac{2}{7}$ を小数に。 (3) $\frac{3}{11}$ の小数第9位の数字は？

例題 2 くり返しが長いときの第○位

$\frac{2}{7} = 0.285714285714\ldots$ の、小数第 10 位の数字は何ですか。

考え方 「285714」の 6 けたが 1 組でくり返します。10 けたの中に 6 けたの組がいくつあり、何けたあまるかを、わり算で求めます。

しき ① $10 \div 6 = 1$ あまり 4

② 1 組 (6 けた) が終わったあと、4 けためまで進む

③ 「2、8、5、7、1、4」の 4 けためは 7

こたえ 7

じぶんでこう 2

$\frac{3}{7} = 0.428571428571\ldots$ の、小数第 8 位の数字は何ですか。

例題 3 小数を分数にする

(1) 0.6 (2) 0.125 (3) 0.3333... を分数にしましょう。

考え方 終わる小数は $10 \cdot 100 \cdot 1000$ を分母に、すぐくり返す小数は 9 や 99 を分母にして約分します。

しき (1) $0.6 = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$ (2) $0.125 = \frac{125}{1000} = \frac{1}{8}$
 (3) $0.333\ldots$ は $\frac{1}{9} = 0.111\ldots$ の 3 分なので、 $\frac{3}{9} = \frac{1}{3}$

こたえ (1) $\frac{3}{5}$ (2) $\frac{1}{8}$ (3) $\frac{1}{3}$

じぶんでところ3

(1) 0.4 (2) 0.45 (3) 0.1212... を分数にしましょう。

例題4 有理数と無理数に分ける

次の数を、有理数と無理数に分けましょう。 0.5 、 $\frac{2}{3}$ 、 $\sqrt{9}$ 、 $\sqrt{5}$ 、 π 、 -4 、 $0.444\ldots$

考え方 分子も分母も整数の分数で書けるかどうかを考えます。 $\sqrt{\quad}$ は、中の数を計算してから判断します。

しき $0.5 = \frac{1}{2}$ 、 $\sqrt{9} = 3 = \frac{3}{1}$ 、 $-4 = \frac{-4}{1}$ 、 $0.444\ldots = \frac{4}{9}$

5 は整数を2乗した数ではないので、 $\sqrt{5}$ は分数で書けない ($\sqrt{2}$ と同じ理由。188 ページ)

π は無理数 (189 ページ)

有理数 (分数で書ける)

0.5 $\frac{2}{3}$ $\sqrt{9}$ -4 $0.44\ldots$

無理数 (書けない)

$\sqrt{5}$ π

こたえ 有理数: 0.5 、 $\frac{2}{3}$ 、 $\sqrt{9}$ 、 -4 、 $0.444\ldots$ 無理数: $\sqrt{5}$ 、 π

じぶんでところ4

次の数を、有理数と無理数に分けましょう。 1.25 、 $\sqrt{16}$ 、 $\sqrt{3}$ 、 $\frac{1}{6}$ 、 $0.777\ldots$

例題5 円周と直径


π を 3.14 として、(1) 直径 10 cm の円の円周、(2) 半径 4 cm の円の円周、
(3) 円周 62.8 cm の円の直径を求めましょう。

考え方 円周 = 直径 $\times \pi$ 。半径がわかっているときは、まず 2 倍して直径にします。直径は、円周を π でわれば求められます (直径 $\times 3.14 = 62.8$ の直径は、 $62.8 \div 3.14$)。

しき (1) $10 \times 3.14 = 31.4$

(2) 直径は $4 \times 2 = 8$ (cm)。 $8 \times 3.14 = 25.12$

(3) $62.8 \div 3.14 = 20$



直径は半径の 2 倍

$$4 \times 2 = 8 \text{ (cm)}$$

$$\text{円周} = 8 \times 3.14$$

こたえ (1) 31.4 cm (2) 25.12 cm (3) 20 cm

じぶんでこう5

π を 3.14 として、(1) 半径 33 cm のタイヤの円周と、(2) まわりの長さが 157 cm の木の直径を求めましょう。

コラム π に近い分数

π は分数で書けませんが、近い分数ならあります。電卓で確かめてみよう。

分数	小数にすると	$\pi = 3.14159265 \dots$ とくらべると
$\frac{22}{7}$	3.142857 142857 ...	小数第2位まで同じ
$\frac{355}{113}$	3.14159292 ...	小数第6位まで同じ

$\frac{355}{113}$ は、1500年ほど前に中国の祖冲之が見つけた分数です。どちらも分数なので有理数。 π そのものではありません。

例題6 タイヤが何回も回ると、何 m 進む？

直径 50 cm の車輪が 500 回転すると、何 m 進みますか (π は 3.14)。

考え方 1 回転で円周の長さだけ進みます (199 ページ)。500 回転なら、その 500 倍。答えは m で聞かれているので、さいごに cm を m になおします。1 m は 100 cm なので、cm の数を 100 でわります。

- しき** ① 1 回転 : $50 \times 3.14 = 157$ (cm)
 ② 500 回転 : $157 \times 500 = 78500$ (cm)
 ③ $78500 \div 100 = 785$ (m)

こたえ 785 m

じぶんでとこう 6

直径 60 cm の車輪が 1000 回転すると、何 m 進みますか。それは何 km ですか (π は 3.14)。

⚠ まちがえやすいところをチェック

⚠ まちがえやすいところ

π を 3.14 ぴったりと思う

✗ $\pi = 3.14$

○ $\pi = 3.14159\dots$ 。3.14 は、計算に使う近い数

π は無理数なので、小数はどこまでも終わりません。

⚠ まちがえやすいところ

$0.333\dots$ を $\frac{3}{10}$ にしてしまう

✗ $0.333\dots = \frac{3}{10}$

○ $0.333\dots = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$

$\frac{3}{10} = 0.3$ で終わる小数です。3 がずっとつづく小数は、0.3 より少し大きく、 $\frac{1}{9}$ の3つ分です。

⚠ まちがえやすいところ

あまりが 0 のときの第○位をまちがえる

$\frac{5}{11} = 0.4545\dots$ の小数第 10 位は…… (10 ÷ 2 = 5 あまり 0)

✗ あまり 0 なので、「45」の 1 けための 4

○ あまり 0 は、5 組めがちょうど終わったところ。組の最後のけたの 5
あまりが 1 なら次の組の 1 けため、あまりが 0 なら組の最後のけたです。

⚠ まちがえやすいところ

半径に π をかけてしまう

✕ $\text{円周} = \text{半径} \times \pi$

○ $\text{円周} = \text{直径} \times \pi = \text{半径} \times 2 \times \pi$

半径のときは、まず2倍して直径にします。

⚠ まちがえやすいところ

円周から直径を求めるのに、 π をかけてしまう

円周が 31.4 cm の円の直径は……

✕ $31.4 \times 3.14 = 98.596 \text{ (cm)}$

○ $31.4 \div 3.14 = 10 \text{ (cm)}$

直径 $\times 3.14 = 31.4$ なので、直径は 31.4 を 3.14 でわって求めます。直径は円周より短いはずなので、98.596 はおかしいと気づけます。

⚠ まちがえやすいところ

√ がついていれば無理数だと思

✕ $\sqrt{4}$ は無理数


○ $\sqrt{4} = 2$ なので有理数

√ の中が 4、9、16 のような数なら、整数になります。

ぶつり こうがく つか
物理・工学ではこう使う

タイヤ 1 回転で進む距離

タイヤが 1 回転すると、円周の長さだけ進みます。直径 66 cm なら $66 \times 3.14 = 207.24$ で 207.24 cm、100 でわって約 2.07 m です。自転車のスピードメーターは、車輪の磁石がセンサーの前を通る回数を数え、回数 $\times$ 円周で進んだ距離を計算しています。



ロボットの車輪

車輪で走るロボットは、モーターが何回転したかを数えるセンサーで、走った距離を計算します。直径 5.6 cm の車輪なら、1 回転で $5.6 \times 3.14 = 17.584$ で約 17.6 cm。1 m (100 cm) 進ませたいときは、 $100 \div 17.584 = 5.68 \dots$ で、約 5.7 回転させるようにプログラムします。

コンピュータの π

無理数の小数は終わらないので、コンピュータは有限のけたで近い値を使います。ふつうは $\pi = 3.141592653589793$ (16 けたほど)。けたを切るときに生まれる小さなずれは、2-19 で学びます。



しょうまつもんだい
章末問題

2-9 のまとめ

きほん
基本



1 次の分数を小数にしましょう。終わるか、くり返すかも答えましょう。

(1) $\frac{5}{8}$ (2) $\frac{4}{9}$ (3) $\frac{3}{11}$

2 次の小数を分数にしましょう。 (1) 0.8 (2) 0.36 (3) 0.777...

3 次の数を、有理数と無理数に分けましょう。 $\sqrt{2}$ 、 $\frac{3}{7}$ 、 $\sqrt{25}$ 、0.6、 π 、 $\sqrt{10}$

4 π を 3.14 として、円周を求めましょう。

(1) 直径 8 cm の円 (2) 半径 5 cm の円

5 円周が 94.2 cm の円の直径を求めましょう (π は 3.14)。

6 次の数のうち、有理数をえらんで整数で表しましょう。

$\sqrt{36}$ 、 $\sqrt{40}$ 、 $\sqrt{49}$ 、 $\sqrt{50}$

チャレンジ



7 $\frac{1}{7} = 0.142857\ 142857\ldots$ の、小数第 20 位の数字は何ですか。

8 直径 66 cm のタイヤが 1000 回転すると、約何 km 進みますか (π は 3.14)。

9 $\frac{4}{7} = 0.571428\ 571428\ldots$ の、小数第 18 位の数字は何ですか。

10 π の代わりに $\frac{22}{7}$ を使うことがあります。 $\frac{22}{7}$ を小数にして $\pi = 3.14159\ldots$ とくらべましょう。 $\frac{22}{7}$ は有理数ですか、無理数ですか。

コラム π は、どこまで求められた？

いつ	だれが	どこまで
やく 約 2200 年前	アルキメデス（ギリシャ）	3.14（正 96 角形で）
やく 約 340 年前	せきたかかず 関孝和（江戸時代）	しょうすうだい 小数 第 10 位まで
2022 年	コンピュータ	100 兆けた（その後ものびている）

どこまで計算しても、くり返しは出てきません。 π が無理数だからです。

✓ ふりかえり できるようになったかな？

- ☐ 分数を小数にすると、終わるかくり返すわけがわかる。 → 186 ページ
- ☐ 分数で書けない数（無理数）があることがわかる。 → 188 ページ
- ☐ 円周 = 直径 $\times \pi$ で、円周や直径を求められる。 → 189 ページ



デルタ

数直線には、分数で書けない数もぎっしりならんでいるんだ。次の 2-10 では、はかった量の「単位」の世界ルールを学ぼう。

2-10

単位の世界ルール：SI 単位

この章の先に 2-1 2-3 2-4 2-7 この章の先に 2-13 2-15 5-1 5-5

この章でできるようになること

- ★ $k \cdot m \cdot \mu$ などの記号を読んで、単位を書きかえられる。
- ★★ 60 s/min のような「単位付きの1」をかけて、時間や速さの単位を書きかえられる。
- ★★ 単位を計算して、式が正しいかを確認められる。

? はてな?

車のスピードメーターは、時速 72 km を
さしています。1 時間に 72 km 進む速さ
です。

50 m 走の速さは、ふつう「1 秒に何 m 」
で考えますね。この車は、1 秒に何 m 進
むのかな? $72 \div 60$? それとも 何
か別の計算?



秒速何 m ?

単位には、世界中で使う共通のルールがあります。ルールを知ると、単位の書きかえも、答えの確かめも、すっきりできます。この章のいちばん大事な道具は、「単位付きの1」です。

△ やってみよう 身のまわりの単位をさがそう

- 1 家や学校で、数と単位が書いてある物を 5 つ以上さがそう。
- 2 「物」「数と単位」「何の量か」を、ノートの表に書こう。
- 3 $m \cdot g \cdot L \cdot W$ などの前についている k や m に丸をつけよう。同じ記号は、どんな意味かな？

ペットボトル
500 mL

お米のふくろ
5 kg

電子レンジ
600 W

かぜ薬 (1 回分)
300 mg

マラソン
42.195 km

かん電池
1.5 V

図 1 見つけた単位の例。赤い字が、単位の前につけた記号。

🕒 思い出そう この章で使う、前に学んだこと

2-1 量 = 数値 × 単位。5 m は 1 m の 5 つ分。単位を変えると数値が変わる：
5 m = 500 cm

2-3 単位も計算できる： $m \div s = m/s$ 。「/」は÷のしるしで、「1 秒あたり」と読める。

2-4 同じ数どうしのわり算は 1 ($5 \div 5 = 1$)。分母と分子を同じ数でわる (約分)。わるのは逆数をかけるのと同じ。

2-7 $1000 = 10^3$ 、 $\frac{1}{1000} = 10^{-3}$ 。1 L = 1000 cm³



デルタ

k は「1000 倍」、 m は「1000 分の 1」。記号の意味がわかると、書きかえは計算 1 つでできるよ。

数学の道具

1 世界共通の7つの基本単位

むかしは、国ごとに長さの単位がちがいました。日本の1尺は約30.3 cm、イギリスの1フィートは30.48 cm。にているのに、同じではありません。これでは、部品を外国に注文するとこまります。30 cmの板がほしいのに、少しだけ長さのちがう板がとどくかもしれないからです。

そこで今は、世界中で同じ単位を使うきまりがあります。これをSI（国際単位系）といいます。もともになるのは、次の7つの基本単位です。ほかの量の単位は、この7つを組み合わせて作れます。

はかる量	記号	読み方	身のまわりの例
長さ	m	メートル	身長約1.4 m
質量（ふだん「重さ」とよんでいる量）	kg	キログラム	お米のふくろ 5 kg
時間	s	秒	50 m 走約 9 s
電流	A	アンペア	家のブレーカー 30 A
温度	K	ケルビン	0℃は約 273 K (2-2)
物質の量	mol	モル	理科で学ぶ
光の強さ	cd	カンデラ	ろうそく 1 本で約 1 cd

表1 SIの7つの基本単位

時間の記号 s は、英語の second（セカンド＝秒）の頭文字です。記号は、小文字と大文字を区別します。A（アンペア）や K（ケルビン）のように、人の名前からつけた単位は大文字で書きます。

② かけたりわったりして、単位を組み立てる

面積や速さの単位は、基本単位をかけたりわったりして作ります (2-3)。このような単位を組み立てた単位といいます。




図2 長さ×長さで面積の単位、長さ÷時間で速さの単位ができる。

面積 $m \times m = m^2$ 体積 $m \times m \times m = m^3$ 速さ $m \div s = m/s$

力の単位 N (ニュートン) も、 $kg \cdot m \cdot s$ を組み合わせた単位に名前をつけたものです (2-15 で使います)。物理では、「重さ」は物が地球に引られる力のことで、単位は N です。kg ではかるのは質量 (物そのものの量) で、月に持っていても変わりません。

③ 大きさを表す記号：k・m・μ

km の k は「1000 倍」、mm の前の m は「1000 分の 1」を表します。単位の前につけて大きさを表す記号を、接頭語といいます。どの単位にも同じ意味でつきます (kg、km の k、mg、mL、mm の m)。キロはギリシャ語の「1000」、ミリはラテン語の「1000」、センチはラテン語の「100」から来たことばです。

右の図のように、k のついた単位から、何もつかない単位、m のついた単位へと、1 段下りるたびに数は 1000 倍になります。小さい単位で数えると、同じ量でも、たくさん数えることになるからです。




図3 小さい単位へは× 1000、大きい単位へは÷ 1000。

記号	読み方	大きさ (2-7)	例
G	ギガ	10^9 (10 億倍)	大きな発電所 1GW
M	メガ	10^6 (100 万倍)	風車 1 つの発電約 2MW
k	キロ	10^3 (1000 倍)	1 km = 1000 m
c	センチ	10^{-2} (100 分の 1)	1 cm = 0.01 m
m	ミリ	10^{-3} (1000 分の 1)	1 mg = 0.001 g
μ	マイクロ	10^{-6} (100 万分の 1)	かみの毛の太さ約 70 μ m
n	ナノ	10^{-9} (10 億分の 1)	ウイルスの大きさ約 100 nm

表2 よく使う接頭語

記号カード 初めて出た章 2-10

μ

読み方 マイクロ
意味 100 万分の 1
(10^{-6}) を表す接頭語。
1 μ m = 0.001 mm
英語 micro

記号カード 初めて出た章 2-10

m/s^2

読み方 メートル毎秒 毎秒
意味 1 秒ごとに速さが何
m/s ふえるか
英語 meters per second
squared

4 換算に使う数も、単位つきの量

1 分は 60 秒です。これを、下の図のように帯で表してみましょう。1 分の帯の中に、1 秒の目もりが 60 こならびます。




図4 1 分の帯の中に、1 秒の目もりが 60 こならび。

時間の単位にも記号があります。秒は s (second)、分は min (minute：ミニット)、時間は h (hour：アワー)、日は d (day：デイ) です。年は、この本では記号を使わずに「年」と書きます。

「1 分あたり 60 秒」は、2-3 の速さ「1 秒あたり 5 m」(5 m/s) と同じ形の量です。だから、速さと同じように、単位をつけて書けます。

60 s/min (1 分あたり 60 秒。「60 秒 毎分」と読む)

「/」は÷のしるしなので、60 s/min は $\frac{60 \text{ s}}{1 \text{ min}}$ とも書けます。上の図で、1 分の帯と、60 秒分の目もりは、同じ長さでした。同じ大きさどうしのわり算は 1 です (5 ÷ 5 = 1 と同じ。2-4)。だから、

$$\frac{60 \text{ s}}{1 \text{ min}} = 1 \quad \frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}} = 1$$

右の式のように、上と下を入れかえても 1 です。数だけを見ると 60 ÷ 1 = 60 なのに「1」になるのは、単位もいっしょに見ているからです。60 秒と 1 分は、同じ長さの時間を、ちがう単位で言っているだけです。このように、上と下が同じ大きさの量になっている分数を、この本では単位つきの 1 とよびます。

長さでも同じです。1 km は 1000 m なので、「1 km あたり 1000 m」の 1000 m/km も単位つきの 1 です。

5 換算は「1 をかける」：単位が約分されて消える

どんな数に 1 をかけても、大きさは変わりません (7 × 1 = 7)。だから、量に「単位つきの 1」をかけても、量は変わりません。変わるのは単位だけです。このように、量を変えずに単位だけを取りかえることを換算といいます。

2 分を秒に換算してみましょう。2 min に 60 s/min をかけます。

$$2 \text{ min} \times 60 \text{ s/min} = 2 \cancel{\text{min}} \times \frac{60 \text{ s}}{1 \cancel{\text{min}}} = 2 \times 60 \text{ s} = 120 \text{ s}$$

分子にも分母にも min があるので、min どうしが約分されて消え、s だけが残りました。数の約分 (2-4) と同じしくみです。

かず やくぶん 数の約分 (2-4)	たん い やくぶん 単位の約分
$\frac{3 \times \cancel{5}}{\cancel{5}} = 3$	$2 \cancel{\text{min}} \times \frac{60 \text{ s}}{1 \cancel{\text{min}}} = 120 \text{ s}$
$5 \div 5 = 1$ なので消してよい	$\text{min} \div \text{min} = 1$ なので消してよい

表3 数も単位も、同じもののどうしは約分できる

前のページの帯の図でも、2分は「60秒のまとまりが2つ」で120秒でした。単位の計算と、図で数えた答えが合っています。

どちらの1をかける？ 単位つきの1には、 $\frac{60 \text{ s}}{1 \text{ min}}$ と、上下を入れかえた $\frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}}$ の2つがあります。消したい単位が分母にくるほうを選びます。もし反対のほうをかけると、

$$2 \text{ min} \times \frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}} = \frac{2}{60} \frac{\text{min} \times \text{min}}{\text{s}}$$

となり、minが消えずに2つにふえてしまいます。時間の単位(sだけ)にならないので、まちがいに気づけます。単位をつけて計算すると、単位がまちがいを教えてくれるのです。

反対に、秒を分に直すときは、sを消したいので、sが分母にくる $\frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}}$ をかけます。これは「60 s/minでわる」のと同じです(わるのは逆数かけるのと同じ。2-4)。

$$180 \text{ s} \div 60 \text{ s/min} = 180 \cancel{\text{s}} \times \frac{1 \text{ min}}{60 \cancel{\text{s}}} = \frac{180}{60} \text{ min} = 3 \text{ min}$$

長さも同じです。3 kmをmにするには、kmを消したいので、kmが分母にくる 1000 m/km をかけます。

$$3 \text{ km} \times 1000 \text{ m/km} = 3 \cancel{\text{km}} \times \frac{1000 \text{ m}}{1 \cancel{\text{km}}} = 3000 \text{ m}$$

かんさん てじゅん 換算の手順

- 1 今の単位と、ほしい単位をつなぐ「単位つきの 1」を見つける
(60 s/min など)。
- 2 消したい単位が分母にくる向きにして、かける。
- 3 単位を約分して、ほしい単位だけが残ったか確かめる。

6 秒・分・時間・日・年をつなぐ

時間の単位は、次の「単位つきの 1」でつながっています。大きい単位から小さい単位へは、右へ進むたびに掛けていきます。




図 5 右へ進むときは、赤い「単位つきの 1」をかける。左へもどるときは、わる。

たんい 単位つきの 1	いみ 意味	なぜその数？ なぜそのかず？
60 s/min	ぶん びょう 1 分あたり 60 秒	ぶん びょう き 1 分を 60 秒と決めた (60 は $2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6$ でわり切れて便利)
60 min/h	じ かん ぶん 1 時間あたり 60 分	じ かん ぶん き 1 時間を 60 分と決めた
24 h/d	にち じ かん 1 日あたり 24 時間	ちきゅう かい にち わ 地球が 1 回まわる 1 日を、24 に分 けると決めた
365 日/年 にち ねん	ねん にち 1 年あたり 365 日	ちきゅう たいよう しゅう 地球が太陽のまわりを 1 周するのに やく 365 日かかる (うるう年は 366 にち 日)
3600 s/h	じ かん びょう 1 時間あたり 3600 秒	した けいさん つく 下の計算で作れる (60×60)

ひょう 表 4 時間の換算に使う「単位つきの 1」

表の 3600 s/h は、覚えなくても作れます。1 時間を、まず分に、次に秒に換算します。1 をかけるたびに、1 つ前の単位が約分されて消えます。

$$1\cancel{\text{h}} \times \frac{60\cancel{\text{min}}}{1\cancel{\text{h}}} \times \frac{60\text{s}}{1\cancel{\text{min}}} = 1 \times 60 \times 60\text{s} = 3600\text{s}$$

だから 1 h = 3600 s で、「1 時間あたり 3600 秒」の 3600 s/h も単位つきの 1 です。

年のように日本語で書いた単位も、同じように約分できます。2 年は何日かな？

$$2\cancel{\text{年}} \times 365\cancel{\text{日/年}} = 2 \times 365\text{日} = 730\text{日} \quad (\text{うるう年がないとき})$$

7 時速を秒速に直す

② はてな？ の時速 72 km は、72 km/h と書き、「72 キロメートル毎時」と読みます。1 時間あたり 72 km 進む速さです。1 秒あたり何 m 進むかを、2 つの方法で求めてみましょう。

方法 A：図で考える 1 時間は 3600 秒、72 km は 72000 m です (1000 m/km をかけた)。1 時間に進む 72000 m を、3600 秒分に等しく分けると、その 1 つ分が 1 秒に進む道のりです (2-3 の「1 あたりの量」)。




図 6 1 時間の道のりを 3600 に分けた 1 つ分が、1 秒の道のり。

方法 B：単位つきの 1 をかける km を m にしたいので 1000 m/km を、h を s にしたいので 3600 s/h を使います。72 km/h では、h は分母にあります。

分母の h を消すには、h が分子にくる $\frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}}$ をかけます（3600 s/h でわるのと同じ）。

$$\begin{aligned} 72 \text{ km/h} &= 72 \frac{\text{km}}{\text{h}} \times \frac{1000 \text{ m}}{1 \text{ km}} \times \frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}} \\ &= \frac{72 \times 1000 \text{ m}}{3600 \text{ s}} = \frac{72000}{3600} \text{ m/s} = 20 \text{ m/s} \end{aligned}$$

km も h も約分されて消え、m/s が残りました。A でも B でも秒速 20 m です。これが **②はてな?** の答えです。

72 ÷ 60 だと、どうなる？ 60 は「1 時間あたり 60 分」の 60 min/h です。単位もつけて計算すると、

$$72 \text{ km/h} \div 60 \text{ min/h} = 72 \frac{\text{km}}{\text{h}} \times \frac{1 \text{ h}}{60 \text{ min}} = 1.2 \text{ km/min}$$

これは「1 分あたり 1.2 km」で、まちがいではありませんが、ほしかった「1 秒あたり何 m」ではありません。単位を見れば、まだ km と分のままだとわかります。

近道： ÷ 3.6 方法 B では、いつも ×1000 ÷ 3600 をしています。ここで、3600 は 1000 の 3.6 倍です（3600 ÷ 1000 = 3.6）。だから、×1000 ÷ 3600 は「÷ 3.6」と同じです。だから、**時速を秒速にするには ÷ 3.6**、秒速を時速にするには × 3.6 です。下の表で確かめましょう。

km/h	36	72	108
m/s	10	20	30

上の段 ÷ 3.6 = 下の段 下の段 × 3.6 = 上の段


÷ 3.6 を忘れたときも、単位付きの 1 をかければ、いつでも作り直せます。秒速の数は時速の数より小さくなるはずで、1 秒は 1 時間よりずっと短く、進む道のりも短いからです（ただし m で数えるので、3600 分の 1 ではなく 3.6 分の 1 になる）。

8 面積・体積の換算

1 m² は、1 辺 1 m の正方形の面積です。右の図のように、1 辺は 100 cm なので、

$$1 \text{ m}^2 = 100 \text{ cm} \times 100 \text{ cm} = 10000 \text{ cm}^2$$

長さが 100 倍になると、面積は 100 × 100 で 10000 倍です。図の 1 マス (10 cm × 10 cm = 100 cm²) が 100 こある、と数えても同じです。



単位つきの 1 で書くと、m² は m × m で m が 2 つあるので、100 cm/m を 2 回かけます。

$$1 \text{ m}^2 = 1 \text{ m} \times \text{m} \times \frac{100 \text{ cm}}{1 \text{ m}} \times \frac{100 \text{ cm}}{1 \text{ m}} = 10000 \text{ cm}^2$$

体積の m³ は m が 3 つなので、100 cm/m を 3 回かけて 1 m³ = 1000000 cm³。体積では、1 L = 1000 cm³、1 mL = 1 cm³ (2-7) もよく使います。1000 cm³/L や 1000 mL/L も、単位つきの 1 です。

9 単位も計算できる

自転車^{じてんしゃ}が、止まった状態^とからこぎ出して、4 秒^{びよう}で秒速^{びようそく} 6 m になりました。速さ^{はや}が同じ分^{おなぶん}ずつふえた^{ふえた}とすると、1 秒^{びよう}ごとに速さ^{はや}は何 m/s ずつふえたかな？

速さ^{はや}の変化量^{へんかりょう} (2-3) は、6 - 0 = 6 で 6 m/s。これを 4 秒^{びよう}に等しく分^{ひと}けると、1 秒^{びよう}あたりのふえ方^{かた}がわかります。数は数^{かず}どうし、単位^{たんい}は単位^{たんい}どうしで計算^{けいさん}します。




図7 1 秒ごとに 1.5 m/s ずつ速くなる。

$$\frac{6 \text{ m/s}}{4 \text{ s}} = \frac{6}{4} \times \frac{\text{m/s}}{\text{s}} = 1.5 \text{ m/s}^2$$

単位は $(\text{m/s}) \div \text{s}$ です。m/s は $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ なので、さらに s でわると分母に s が 2 つ ならびます。

$$(\text{m/s}) \div \text{s} = \frac{\text{m}}{\text{s} \times \text{s}} = \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = \text{m/s}^2$$

s × s を s² と書くのは、2-7 の累乗と同じです。m/s² は「メートル毎秒 毎秒」と読み、1 秒ごとに速さが何 m/s ふえるかを表します。上のぼうグラフでも、1 秒ごとに 1.5 ずつ高くなっています。落ちるボールは、1 秒ごとに約 10 m/s ずつ速くなりました (2-0)。これは約 10 m/s² です (もっとくわしくは 9.8 m/s²)。

10 単位のチェック

式の両側の単位は、いつも同じになります。左と右は同じ量を表しているの で、量の種類も同じはずだからです。「道のり=速さ×時間」で確かめましょう。

$$\frac{\text{m}}{\cancel{\text{s}}} \times \cancel{\text{s}} = \text{m}$$

右側の単位が m になり、左側の道のりの m と合いました。もし「道のり=速さ ÷ 時間」とまちがえて覚えていたら、右は $(\text{m/s}) \div \text{s} = \text{m/s}^2$ になり、左の m と合いません。単位が合わない式は、どこかがまちがっています。このように単位で式を確かめることを、**単位のチェック**といいます。単位が合っても、数がまちがっていることはあるので、単位のチェックは「まちがいをみつける道具」です。

たいせつ

1 km = 1000 m、1 h = 3600 s。時速を秒速にするには ÷ 3.6

1 分 = 60 秒、1 時間 = 3600 秒。単位をそろえてから計算する。

換算は「単位つきの 1」をかける：2 min × 60 s/min = 120 s (min が 約分されて消える)

単位も計算できる。(m/s) ÷ s = m/s²。式の両側の単位は同じ。

この章で出てきたことば

SI・基本単位 世界共通の単位のきまり。もともになる7つの単位。

組み立てた単位 基本単位をかけたたりわったりした単位 (m^2 、 m/s)。

接頭語 単位の前につけて、大きさを表す記号 (k、m、 μ)。

単位つきの1 上と下が同じ大きさの量の分数。60 s/min、1000 m/km など。

換算 単位つきの1をかけて、量を変えずに単位だけを取りかえること。

例題でたしかめよう

例題1 接頭語のついた単位を換算する

(1) 2.5 km は何 m? (2) 350 mg は何 g?

考え方 1000 m/km と 1000 mg/g (1g あたり 1000 mg) を、消したい単位が分母にくる向きでかけます。

しき (1) km を消す。 $2.5 \cancel{\text{km}} \times \frac{1000 \cancel{\text{m}}}{1 \cancel{\text{km}}} = 2.5 \times 1000 \text{ m} = 2500 \text{ m}$
 (2) mg を消す。 $350 \cancel{\text{mg}} \times \frac{1 \cancel{\text{g}}}{1000 \cancel{\text{mg}}} = 350 \div 1000 \text{ g} = 0.35 \text{ g}$

こたえ (1) 2500 m (2) 0.35 g

じぶんでところ1

単位つきの1をかけて換算しましょう。(1) 0.8 km は何 m? (2) 1.2 kg は何 g? (3) 2500 mg は何 g?

例題 2 時間の単位をつないで換算する

(1) 1 日は何秒ですか。(2) 1 年 (365 日) は何時間ですか。

考え方 209 ページの図の順に、単位つきの 1 を 1 つずつかけます。

しき (1) $1 \cancel{\text{d}} \times \frac{24 \cancel{\text{h}}}{1 \cancel{\text{d}}} \times \frac{60 \cancel{\text{min}}}{1 \cancel{\text{h}}} \times \frac{60 \text{ s}}{1 \cancel{\text{min}}}$
 $= 24 \times 60 \times 60 \text{ s} = 1440 \times 60 \text{ s} = 86400 \text{ s}$

(2) $1 \cancel{\text{年}} \times 365 \cancel{\text{日}} / \cancel{\text{年}} = 365 \text{ 日}$ 。365 日は 365 d と書ける。
 $365 \cancel{\text{d}} \times \frac{24 \text{ h}}{1 \cancel{\text{d}}} = 365 \times 24 \text{ h} = 8760 \text{ h}$

こたえ (1) 86400 秒 (2) 8760 時間

じぶんでとこう 2

(1) 2 時間は何秒ですか。(2) 1 週間 (7 日) は何分ですか。どちらも単位つきの 1 をかける式で書きましょう。

例題 3 時間の単位をそろえてから、速さを求める

自転車で、1 分 30 秒に 450 m 進みました。速さは何 m/s ですか。

考え方 m/s で答えるので、時間を先に秒にそろえます。1 分を秒に換算してから、30 秒をたします。

しき $1 \cancel{\text{min}} \times \frac{60 \text{ s}}{1 \cancel{\text{min}}} = 60 \text{ s}$ 。 $60 \text{ s} + 30 \text{ s} = 90 \text{ s}$

速さ = 道のり ÷ 時間 (2-3)。 $450 \text{ m} \div 90 \text{ s} = 5 \text{ m/s}$

こたえ 5 m/s

じぶんでところ3

はし 走って、2分^{ふん}で600m^{すす}進みました。速^{はや}さは何^{なん} m/s ですか。

例題4 時速と秒速を換算する

(1) 時速^{じそく} 54 km は秒速^{びょうそく} 何 m? (2) 秒速^{びょうそく} 25 m は時速^{じそく} 何 km?

考え方 km と m は 1000 m/km で、h と s は 3600 s/h でつながります。消^けしたい単位^{たんい}が約分^{やくぶん}される向き^{むき}にかけます。最後^{さいご}に ÷ 3.6 ・ × 3.6 で確^{たし}かめます。

しき (1) $54 \frac{\text{km}}{\text{h}} \times \frac{1000 \text{ m}}{1 \text{ km}} \times \frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}} = \frac{54000}{3600} \text{ m/s} = 15 \text{ m/s}$

(2) $25 \frac{\text{m}}{\text{s}} \times \frac{3600 \text{ s}}{1 \text{ h}} \times \frac{1 \text{ km}}{1000 \text{ m}} = \frac{90000}{1000} \text{ km/h} = 90 \text{ km/h}$

確^{たし}かめ: $54 \div 3.6 = 15$ 、 $25 \times 3.6 = 90$

こたえ (1) 15 m/s (2) 90 km/h

じぶんでところ4

(1) 時速^{じそく} 18 km は秒速^{びょうそく} 何 m? (2) 秒速^{びょうそく} 30 m は時速^{じそく} 何 km?

もっと知りたい ★★

早見表: よく使う「単位つきの1」

どれも「1 右^{みぎ}の単位^{たんい}あたり、左^{ひだり}の単位^{たんい}がいくつ^{いくつ}か」を表^{あらわ}します。上下^{じょうげ}を入^いれかえても1なので、消^けしたい単位^{たんい}が分母^{ぶんぼ}にくる向き^{むき}で使^{つか}います。

なが おも 長さ・重さ	い み 意味	じ かん たいせき 時間・体積	い み 意味
1000 m/km	1 km あたり 1000 m	60 s/min	1 分あたり 60 秒
100 cm/m	1 m あたり 100 cm	60 min/h	1 時間あたり 60 分
10 mm/cm	1 cm あたり 10 mm	3600 s/h	1 時間あたり 3600 秒
1000 g/kg	1 kg あたり 1000 g	24 h/d	1 日あたり 24 時間
1000 mg/g	1 g あたり 1000 mg	1000 mL/L	1 L あたり 1000 mL

例題 5 速さと時間の単位がちがうとき、道のりを求める

(1) 時速 54 km で 20 分走ると、何 km 進みますか。(2) 秒速 15 m で 1 時間走ると、何 km 進みますか。

考え方 道のり = 速さ × 時間 (2-3)。速さの分母の単位と、時間の単位がちがうので、単位つきの 1 をはさんで約分します。

しき (1) $54 \frac{\text{km}}{\text{h}} \times 20 \text{ min} \times \frac{1 \text{ h}}{60 \text{ min}} = \frac{54 \times 20}{60} \text{ km} = 18 \text{ km}$

(2) $15 \frac{\text{m}}{\text{s}} \times 1 \text{ h} \times \frac{3600 \text{ s}}{1 \text{ h}} = 54000 \text{ m}$

$54000 \text{ m} \times \frac{1 \text{ km}}{1000 \text{ m}} = 54 \text{ km}$

こたえ (1) 18 km (2) 54 km

じぶんでこう 5

(1) 時速 60 km で 45 分走ると、何 km 進みますか。(2) 秒速 5 m で 10 分走ると、何 km 進みますか。

 例題 6 単位をそろえて、何こ分・何倍かを求める

(1) 1.5 L のお茶を、250 mL ずつコップに分けます。何ばいに分けられますか。

(2) 時速 36 km で走る自転車は、秒速 5 m で走る人の何倍の速さですか。

考え方 単位をそろえてからわかります。同じ単位どうしでわると、単位はやくんされて消え、「何こ分」「何倍」を表す数だけが残ります。

しき (1) $1.5 \cancel{\text{L}} \times \frac{1000 \cancel{\text{mL}}}{1 \cancel{\text{L}}} = 1500 \text{ mL}。 \frac{1500 \cancel{\text{mL}}}{250 \cancel{\text{mL}}} = 6$

(2) $36 \div 3.6 = 10$ で $10 \text{ m/s}。 \frac{10 \cancel{\text{m/s}}}{5 \cancel{\text{m/s}}} = 2$

こたえ (1) 6 ばい (2) 2 倍

 じぶんでこう 6

(1) 3 L の水を、150 mL ずつ分けます。何ばいに分けられますか。 (2)

時速 54 km の車は、秒速 5 m の自転車の何倍の速さですか。

 じぶんでこう 7

(1) 2 L の牛乳を、400 mL ずつ分けます。何ばいに分けられますか。 (2)

秒速 25 m の電車は、時速 18 km の自転車の何倍の速さですか。

例題 7 単位を計算する

(1) 止まっていた電車が、20 秒で 15 m/s になりました。1 秒ごとに速さはいくつふえましたか（同じ分ずつふえたとする）。

(2) 「道のり＝速さ÷時間」は正しいですか。単位のチェックをしましょう。

考え方 (1) 速さの変化量÷時間。数と単位を別べつに計算します。(2) 右の単位が m になるか見ます。

しき (1) 変化量は $15 - 0 = 15$ で 15 m/s。 $15 \text{ m/s} \div 20 \text{ s} = 0.75 \text{ m/s}^2$

(2) $(\text{m/s}) \div \text{s} = \text{m/s}^2$ 。道のりの単位 m と合わない

こたえ (1) 0.75 m/s^2 (2) まちがい（正しくは速さ×時間）

じぶんでところ 8

(1) 止まった車が 5 秒で 10 m/s になりました。1 秒ごとに速さはいくつふえましたか。(2) 「時間＝道のり÷速さ」の単位を調べましょう。

じぶんでところ 9

(1) 止まっていた自転車が、4 秒で 8 m/s になりました。1 秒ごとに速さはいくつふえましたか。(2) 「速さ＝道のり×時間」は正しいですか。単位のチェックをしましょう。

例題8 面積・体積・ μm の換算

- (1) 2 m^2 は何 cm^2 ? (2) 2.5 L は何 cm^3 ? (3) $70\text{ }\mu\text{m}$ は何 mm ?
 (4) 0.3 mm は何 μm ?

考え方 100 cm/m (m^2 では2回)、 $1000\text{ cm}^3/\text{L}$ 、 $1000\text{ }\mu\text{m/mm}$ を使います。

しき (1) $2\text{ m}^2 \times \frac{100\text{ cm}}{1\text{ m}} \times \frac{100\text{ cm}}{1\text{ m}} = 2 \times 10000\text{ cm}^2 = 20000\text{ cm}^2$
 (2) $2.5\text{ L} \times \frac{1000\text{ cm}^3}{1\text{ L}} = 2500\text{ cm}^3$
 (3) $70\text{ }\mu\text{m} \times \frac{1\text{ mm}}{1000\text{ }\mu\text{m}} = 0.07\text{ mm}$
 (4) $0.3\text{ mm} \times \frac{1000\text{ }\mu\text{m}}{1\text{ mm}} = 300\text{ }\mu\text{m}$

こたえ (1) 20000 cm^2 (2) 2500 cm^3 (3) 0.07 mm (4) $300\text{ }\mu\text{m}$

じぶんでところ10

- (1) 3 m^2 は何 cm^2 ? (2) 0.3 L は何 cm^3 ? (3) $500\text{ }\mu\text{m}$ は何 mm ?
 (4) 0.04 mm は何 μm ?

じぶんでところ11

- (1) 0.5 m^2 は何 cm^2 ? (2) 1.2 L は何 cm^3 ? (3) 2 mm は何 μm ?
 (4) $250\text{ }\mu\text{m}$ は何 mm ?

⚠ まちがえやすいところをチェック

⚠ まちがえやすいところ

時速 72 km を秒速にすると、3.6 をかけてしまう

✗ $72 \times 3.6 = 259.2$ で 259.2 m/s

○ $72 \div 3.6 = 20$ で 20 m/s

1 秒は 1 時間よりずっと短いので、秒速の数は時速より小さくなるはずで
す。259.2 m/s は、飛行機くらいの速さです。

⚠ まちがえやすいところ

単位つきの 1 を、上下さかさまにかけてしまう

✗ $3 \text{ min} \times \frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}} = \frac{3}{60} \frac{\text{min} \times \text{min}}{\text{s}}$

○ $3 \text{ min} \times \frac{60 \text{ s}}{1 \text{ min}} = 180 \text{ s}$

消したい min が分母にくる向きでかけます。さかさまだと、min が消え
ずに単位が $\frac{\text{min} \times \text{min}}{\text{s}}$ になり、時間の単位になりません。

⚠ まちがえやすいところ

面積の換算で 100 倍にする

✗ $1 \text{ m}^2 = 100 \text{ cm}^2$ (1 m = 100 cm だから?)

○ $1 \text{ m}^2 = 100 \text{ cm} \times 100 \text{ cm} = 10000 \text{ cm}^2$

面積は長さを 2 回かけた量なので、100 cm/m も 2 回かけます。

⚠ まちがえやすいところ

秒速^{びようそく} 5m で 2分^{ふん たん い}。単位をそろえずに計算^{けいさん}する

✗ $5 \times 2 = 10$ で 10m

○ $2 \text{ min} \times 60 \text{ s/min} = 120 \text{ s}$ 。 $5 \times 120 = 600$ で 600m

m/s $\times$ min では、s と min が約分^{やくぶん}できず、m が残り^{のこ}ません。単位をそろえてから計算^{けいさん}します。

⚠ まちがえやすいところ

1時間^{じ かん}を 100分^{ぶん}、1分^{ぶん}を 100秒^{びよう かんが}と考えてしまう

✗ 1時間^{じ かん} 30分^{ぶん} = 1.3時間^{じ かん}

○ $30 \text{ min} \div 60 \text{ min/h} = 0.5 \text{ h}$ 。だから 1時間^{じ かん} 30分^{ぶん} = 1.5時間^{じ かん}

長さ^{なが}や重さ^{おも}は $10 \cdot 100 \cdot 1000$ ずつ単位^{たん い}が変わりますが、時間^{じ かん}は 60 ずつです。時間^{じ かん}は、小数^{しょうすう}の位^{くらい}をそのまま使^{つか}えません。

🔍 コラム なぜ 1分^{ぶん}は 60秒^{びよう}なの？


長さ^{なが}や重さ^{おも}は 10 倍^{ばい}・1000 倍^{ばい}で単位^{たん い}が変わるのに、時間^{じ かん}は 60 ずつです。これは、4000 年以上^{ねんいじょうまえ}前の古代^{こ だい}メソポタミア（今のイラク^{いま}のあたり）で、60 ごとに位^{くらい}が上がる数え方^{あ かぞ かた}が使^{つか}われていたなごりだといわれています。60 は $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 10 \cdot 12 \cdot 15 \cdot 20 \cdot 30 \cdot 60$ でわり切れるので、半分^{はんぶん}（30分^{ぶん}）、3分の1（20分^{ぶん}）、4分の1（15分^{ぶん}）がどれも整数^{せいすう}になり、分けやすい^わのです。角度^{かくど}の 1 周^{しゅう} 360° も、60 のなかまです。

ぶつり こうがく つか
物理・工学ではこう使う

単位のとりちがえで、火星探査機が消えた

1999 年、アメリカの火星探査機「マーズ・クライメイト・オービター」が、火星に着いたところで消えてしまいました。エンジンをふかす強さを、あるチームはポンドという単位で、別のチームは N（ニュートン）で計算していたのです。1 ポンドの力は約 4.45 N。

計算がずれて、探査機は予定（高さ約 150 km）よりずっと低い、約 57 km まで火星に近づき、こわれてしまいました。単位をそろえて、単位のチェックをしていれば防げた事故です。



● 薬の mg と μg

1 mg は 1000 μg です。薬の量の単位を読みまちがえると、1000 倍や 1000 分の 1 の量になってしまいます。薬をあつかう人は、数といっしょに単位を必ず確かめます。

● タイヤの空気と kPa

車のタイヤの空気がおす強さは、240 kPa（キロパスカル）くらいです。Pa（パスカル）も、N と同じく組み立てた単位。k は 1000 倍なので 240000 Pa です。

🔍 コラム 1m はどうやって決めた？

1790 年ごろ、フランスで「北極から赤道までの長さの 1000 万分の 1」を
1m と決めました（2-8 のコラムも見てみよう）。今は、光が真空の中を
299792458 分の 1 秒に進む長さが 1m です。光の速さは、いつも同じだ
からです。1kg も、2019 年から自然のきまりで決めるようになりました。


しょうまつもんだい
章末問題

2-10 のまとめ

基本



- 1 次の量を、() の単位で表しましょう。
- (1) 4.2 km (m) (2) 750 mg (g) (3) 0.5 L (mL)
 (4) 1.5 m² (cm²) (5) 0.2 mm (μm) (6) 40 μm (mm)
- 2 2 日は何分ですか。単位つきの 1 をかける式で書きましょう。
- 3 1 年 (365 日) は何秒ですか。365 日を 365 d として、単位つきの 1 を 3 つかける式を書いて、電卓で計算しましょう。
- 4 3 分 20 秒で 800 m 走りました。速さは何 m/s ですか。
- 5 (1) 時速 90 km は秒速 何 m ですか。(2) 秒速 15 m は時速 何 km ですか。
- 6 止まっていた自転車^{じてんしゃ}が、3 秒^{びよう}で 6 m/s になりました。1 秒ごとに、速さは何 m/s ずつふえましたか (同じ分ずつふえたとする)。単位もつけて答えましょう。
- 7 次の式のうち、単位が合わないものはどれですか。
- ア 速さ = 道のり ÷ 時間 イ 道のり = 速さ ÷ 時間
 ウ 時間 = 道のり ÷ 速さ
- 8 2.4 L のジュースを、200 mL ずつコップに分けます。単位をそろえて、何ばいに分けられるか求めましょう。




チャレンジ ★★

- 9 新幹線の速さは時速 288 km、陸上 100 m の選手の速さは秒速 10 m です。
新幹線は選手の何倍の速さですか。単位をそろえてくらべましょう。



- 10 かみの毛の太さを $80\mu\text{m}$ とします。(1) これは何 mm ですか。(2) 1 mm のはばに、かみの毛はすき間なく何本分並びますか。



✓ ふりかえり できるようになったかな？

- ☐ $\text{k} \cdot \text{m} \cdot \mu$ を読んで、単位を書きかえられる。 → 205 ページ
- ☐ 「単位つきの 1」で、時間や速さを換算できる。 → 207 ページ
- ☐ 単位を計算して、式が正しいかを確認められる。 → 212 ページ



ソラ


答えに単位をつけると、まちがいに自分で気づけるんだね。次の部では、文字を使った式を学ぼう。

メモ

も じ しき 文字と式

3

- ? どんな^{はや}速さでも^{つか}使える^{しき}式を、1行^{ぎょう}で^か書ける?
- ? 1つの^{こうしき}公式から、3つの^{こうしき}公式が^{つく}作れる?
- ? さき^で先に出た^{おとうと}弟に、^{あに}兄は^{なんびよう}何秒^おで追いつく?



かず^{かず}数のかわりに^{も じ}文字を使うと、どんな^{かず}数でも^{な た}成り立つ^たきまりを
1行^{ぎょう}で^か書けるよ。式^{しき}を^{てん}天びんのように^{へんけい}変形して、^{りよう}ほしい量を^{りよう}と
^だり出す^{ほうほう}方法も^{まな}学ぶよ。

この部^ぶで学^{まな}ぶこと

2-11 なぜ文字^{もじ}を使^{つか}うの？

田★★★★ P.230

どんな速^{はや}さでも使^{つか}える式^{しき}を、1 行^{ぎょう}で

2-12 文字^{もじ}式^{しき}のやくそく

田★★★★ P.256

3 m と 2 秒^{びよう}は、たし算^{さん}できない

2-13 公式^{こうしき}に数^{かず}を入^いれてみよう：代入^{だいにゆう}

田★★★★ P.272

式^{しき}に数^{かず}を入^いれると、答^{こた}えがで^でてくる

2-14 式^{しき}を変^{へん}形^{けい}して、ほし^{りよう}い量^{りょう}をとり出^だそう

田★★★★ P.294

1 つの公^{こう}式^{しき}から、3 つの公^{こう}式^{しき}が作^{つく}れる

2-15 比^ひ例^{れい}と反^{はん}比^{ひれい}例

△★★★☆☆ P.314

ばねを 2 倍^{ばい}のばすには、2 倍^{ばい}の力^{ちから}

2-16 なんびようご お 何秒^{なんびようご}後に追^おいつく？ 1 次^じ方^{ほう}程^{てい}式^{しき}

△★★★★ P.334

先^{さき}に出^でた弟^{おとうと}に、兄^{あに}は何秒^{なんびようご}で追^おいつく？

この部^ぶを読^よむと…

$x = vt$ のような公^{こう}式^{しき}を読^よみ、数^{かず}を入^いれ、ほし^{りよう}い量^{りょう}につい^とて解^とけるようになりま^ぶす。この部^ぶの「式^{しき}を^{へん}形^{けい}する力^{ちから}」は、このあとのすべ^{かん}ての巻^{まい}で毎^つペー^かジ使^{つか}いま^ぶす。

2-11 なぜ文字を使うの？

この章の先に 1-12 1-13 2-2 2-3 この章の先に 2-12 2-13 2-16 3-3

この章でできるようになること

- ★★ ことばの^{しき}式を、□や文字^{もじ}を使った式^{しき}で表^{あらわ}せる。
- ★ 計算^{けいさん}の順番^{じゅんばん}のきまりと、そのわけがわかり、1行^{ぎょう}の式^{しき}を正^{ただ}しく計^{けい}算^{さん}できる。
- ★★ どんな数^{かず}でも成^なり立^たつきまりを、文字^{もじ}を使^{つか}って1行^{ぎょう}で書^かける。

? はてな？

あるひと・自転車・自動車が、それぞれ一定^{いってい}の速^{はや}さで進^{すす}んでいます。進んだ道^{みち}のりを表^{ひょう}にすると、次のようになります。

	1秒 ^{びよう}	2秒 ^{びよう}	3秒 ^{びよう}	4秒 ^{びよう}	...
 あるひと 歩く人 (1 m/s)	1 m	2 m	3 m	4 m	...
 自転車 (5 m/s)	5 m	10 m	15 m	20 m	...
 自動車 (15 m/s)	15 m	30 m	45 m	60 m	...

速^{はや}さも時間^{じかん}も、ほかにいくらでもあるので、表^{ひょう}はどこまでも大きくなりま^{おお}す。この表^{ひょう}に入る道^{みち}のりを全^{ぜん}部^ぶ、たっ^{ぎよう}た1行^{しき}の式^かで書^かけるかな？

文字^{もじ}を使^{つか}うと、それができま^{けいさん}す。計算^{じゅんばん}の順番^{きまり}のきまりと、そのわけも学^{まな}びま^すす。

△ やってみよう つまようじで正方形をつなげよう



1 こ



2 こ



3 こ

...

- 1 つまようじで、正方形を横に 1 こ、2 こ、3 こ…とつなげてならべよう。
- 2 正方形の数と、使ったつまようじの本数を、ノートの上に書きこもう。
- 3 正方形を 1 こふやすと、つまようじは何本ふえるかな？
- 4 正方形を 100 こつなげるには、つまようじが何本いるかな？ ならべずに、計算で考えよう。

正方形の数 (こ)	1	2	3	4	5	100
つまようじの本数 (本)						

🕒 思い出そう この章で使う、前に学んだこと

- 1-12** かけ算は「1 つ分の数 × いくつ分」。3 × 4 は「3 が 4 つ分」の、同じ数のまとまり。
- 1-13** $3 \times \square = 12$ の $\square$ に入る数は、九九の表でさがせる ($\square$ は 4)。
- 2-3** 道のり = 速さ × 時間。5 m/s で 4 秒進むと、 $5 \text{ m/s} \times 4 \text{ s} = 20 \text{ m}$ 。
- 2-2** マイナスの数のかけ算： $(-2) \times 3 = -6$ 、 $(-2) \times (-3) = 6$ 。ひき算は、マイナスの数をたすのと同じ： $10 - 3 = 10 + (-3)$



ミナ

100 こなんて、ならべるのは大変！ 表をながめっていると、きまりが見えてこないかな？

数学の道具

① ことばの式を、□で短く書く

② はてな？ の表の数値は、どれも同じ計算で出せます。自転車の3秒は $5 \times 3 = 15$ 、自動車の4秒は $15 \times 4 = 60$ 。ことばで書くと、

$$\text{道のり} = \text{速さ} \times \text{時間}$$

です(2-3)。このように、ことばで書いた式を**ことばの式**といいます。意味はよくわかりますが、書くのに時間がかかります。そこで、ことばのかわりに□・○・△を使ってみましょう。

$$\bigcirc = \square \times \triangle$$

(○は道のり、□は速さ、△は時間)

□は「数を入れる箱」です。□に5、△に4を入れると、 $\bigcirc = 5 \times 4 = 20$ 。自転車の4秒と同じです。




図1 □には、どんな速さでも入る。

第1巻の「つぎのステージへ」のカードにあった $\square + 3 = 8$ の□も、数を入れる箱です。□に5を入れると $5 + 3 = 8$ でぴったり合うので、□は5です。

② □のかわりに、文字を使う

□・○・△がたくさん出てくると、どれが何の箱だったか、わからなくなります。そこで、数学や物理では、□のかわりにアルファベットの文字を使います。物理では、量を表す英語の頭文字をよく使います。2-3で量の名前として使った x 、 t を、ここからは数の代わりの文字として計算に使います。

文字	t	v	x	m	F
あらわす量	時間	速さ	位置・道のり	質量	力 (2-15)
もとの英語	time	velocity	(座標の文字)	mass	Force

表1 物理でよく使う文字

単位の m (メートル) はまっすぐな字、量の m (質量) はななめの字で書いて、区別します。この文字を使うと、ことばの式は、次のように短く書けます。

ことばの式 道のり	=	はや 速さ	×	じ かん 時間
記号の式 ○	=	□	×	△
も じ しき 文字の式 x	=	v	×	t

図2 同じことを、3つの書き方で書いた。下へいくほど短い。

②はてな？ の答えは、この1行 $x = v \times t$ です。 v に1を入れれば歩く人の行、15を入れれば自動車の行。表の全部が、この1行に入っています。

文字は、どんな数でも入る箱です。このように、文字を使って書いた式を文字式といいます。

3 計算の順番：きまりがないと、答えが2つになる

④やってみよう のつまようじも、文字で表してみましょう。正方形の数を n (number の頭文字) とします。下の図のAのように、左はしの1本に、正方形1こにつき3本ずつがつながるので、

$$\text{本数} = 1 + 3 \times n \quad (n = 1 \text{ で } 4, n = 2 \text{ で } 7, n = 3 \text{ で } 10)$$

$n = 100$ なら $1 + 3 \times 100$ です。これを左から順に計算すると、 $1 + 3 = 4$ 、 $4 \times 100 = 400$ で400本。ところが、図で数えると、左はしの1本と、3本ずつが100こで300本、合わせて301本です。どちらが正しいかな？

A つながった正方形



$$1 + 3 \times n \quad (n = 100 \text{ で } 301 \text{ 本})$$

B はなれた正方形



$$(1 + 3) \times n \quad (n = 100 \text{ で } 400 \text{ 本})$$


図3 Aは $3 \times n$ を先に計算する。Bは $1 + 3$ を先に計算する。

正しいのは301本。3 × 100 を先に計算しなければいけません。400本になるのは、Bのように、4本ずつの正方形をはなしてならべたときです。「1 + 3」をひとまとまりにして先に計算したいときは、**かっこ** () でかこんで $(1 + 3) \times n$ と書きます。

もう1つ見てみましょう。2 + 3 × 5 を、2人の子が計算しました。

ソラ (左から順に)	$2 + 3 = 5, 5 \times 5 = 25$
ミナ (×を先に)	$3 \times 5 = 15, 2 + 15 = 17$

同じ式なのに、答えが2つ出てしまいました。これでは、式を書いた人が何を伝えたかったのか、わかりません。お店のレジや、橋の設計図の計算で、人によって答えがちがったら大変です。そこで、世界中で同じ順番で計算するやくそくを決めました。



2-7の累乗 (3^2 など) がある式では、累乗を①のかっこの次、②の×÷より先に計算します ($2 \times 3^2 = 2 \times 9 = 18$ 。章末のコラムも見よう)。つまり、かっこ → 累乗 → ×÷ → +- の順です。


このやくそくでは、 $2 + 3 \times 5 = 2 + 15 = 17$ で、ミナが正しいことになりました。でも、なぜ「×が先」なのでしょう。くじ引きで決めたものではありません。次のページから、わけを見ていきます。

④ ×と÷が先のわけ：かけ算は1つのまとまり

かけ算は「1つ分の数 × いくつ分」でした (1-12)。100 × 3 は「100 が3つ分」で、同じ数を集めた**1つのまとまり**を表しています。3つの場面で確かめましょう。

場面1 買い物 1こ100円のりんごを3こと、1こ50円のみかんを1こ買いました。代金はいくらかな？

$100 \times 3 = 300$ りんご全部の代金 (1 つのまとまり)



$$100 \times 3 + 50 \\ = 300 + 50 = 350$$

図 4 100×3 は「りんご全部の代金」という 1 つの量。それにみかんの代金をたす。

100×3 は「りんご全部の代金」という 1 つの量です。だから先に 300 という 1 つの数にまとめて、そこにみかんの 50 円をたします。みかんを先に書いて $50 + 100 \times 3$ としても、代金は同じ 350 円のはずです。もし左から計算すると $50 + 100 = 150$ 、 $150 \times 3 = 450$ になります。450 円は「みかんとりんごを 1 こずつ組にして、3 組買った」ときの代金で、買った物とちがってしまいます。

場面 2 L 字の部屋の面積 下の図の部屋の面積は何 m^2 かな？ 2 つの長方形に分けて考えます。




図 5 1 マスは 1m^2 。

下の長方形は 4×3 、上の正方形は 2×2 。

どちらも、それだけで 1 つの面積です。

$$4 \times 3 + 2 \times 2 = 12 + 4 = 16$$

マスを手数えても 16 こなので、 16m^2 。

左から順に計算すると、 $4 \times 3 = 12$ 、 $12 + 2 = 14$ 、 $14 \times 2 = 28$ で 28m^2 。部屋がすっぽり入る横 4m、たて 5m の長方形 (20m^2) より広くなり、おかしいとわかります。

場面 3 速さと時間 自転車で 5m/s で 60 秒走り、そのあと自転車をおりて 1m/s で 100 秒歩きました。全部で何 m 進んだかな？




図 6 自転車で進んだ道のりと、歩いた道のりを、それぞれ先に求めてから合わせる。

道のり = 速さ × 時間 (2-3) なので、自転車の道のりと歩いた道のりを、それぞれ1つの量として先に計算します。

$$5 \times 60 + 1 \times 100 = 300 + 100 = 400 \quad (400 \text{ m})$$

左から順に計算すると、 $5 \times 60 = 300$ 、 $300 + 1 = 301$ 、 $301 \times 100 = 30100$ で 30100 m (約 30 km)。160 秒 (3 分たらず) で 30 km も進むはずがありません。

わり算も同じ 600 円でパンを 3 こ買いました。1 こ分の値段は、600 円を 3 つに分けた 1 つ分で、「1 こあたりの値段」という 1 つの量です (2-3)。だから、パン 1 こと 120 円のジュースの代金は、先に ÷ を計算します。

$$600 \div 3 + 120 = 200 + 120 = 320 \quad (320 \text{ 円})$$

× と ÷ が先のわけ


× や ÷ でできた部分 (100×3 、 4×3 、 5×60 、 $600 \div 3$) は、それぞれ「りんご全部の代金」「長方形 1 つの面積」のような 1 つの量を表す。+ と - は、その量どうしを合わせたり、ひいたりする。だから、まとまりを先に 1 つの数にしてから、+ と - をする。

5 カッコの中が先のわけ：カッコは「ひとまとまり」の印

今度は、+ でできた部分を、ひとまとまりとしてかけたいときを考えます。おはじきを、たてに 5 こ、横に 5 れつならべました。 $5 \times 5 = 25$ (こ) です。たての 5 こを、青 2 こと赤 3 こに分けて見ると、1 れつは $2 + 3$ こです。

○ ^{ただ}正しい

$$(2 + 3) \times 5 = 5 \times 5 = 25$$



1 れつ (1 つ分) が 2 + 3 こで、5 れつ

× 25 にならない

$$2 + 3 \times 5 = 2 + 15 = 17$$



あお 2 こと、あか 3 こが 5 れつ


図 7 $2 + 3$ をひとまとまりにしてかけたいときは、かっこが要る。

1 れつ分の $2 + 3$ は、5 という 1 つの数のかわりです。だから 5×5 は $(2 + 3) \times 5$ と書け、かっこの中を先に計算して $5 \times 5 = 25$ になります。かっこをつけずに $2 + 3 \times 5$ と書くと、②のきまりで 3×5 が先になり、17 になります。25 と 17。同じおはじきの数のはずなのに、答えが合いません。 $2 + 3 \times 5$ は、図 7 の右がわのように「青 2 こと、赤 3 こずつ 5 れつ」という別のならべ方を表しているからです。

かっこは「ここをひとまとまりにして、先に考えてね」という印です。かっこの中は、1 つの数のかわりなので、いちばん先に計算して 1 つの数にします。

ケーキとジュースの代金 1 人分は、300 円のケーキと 100 円のジュースです。2 人分の代金はいくらかな？

$$(300 + 100) \times 2 = 400 \times 2 = 800$$



300 + 100

300 + 100

$$300 + 100 \times 2 = 500$$



ケーキ 1 こと、ジュース 2 本

図 8 左：1 人分をひとまとまりにして 2 つ分。右：かっこを忘れた式。

「1 人分」の $300 + 100$ が、2 つ分です。1 人分をひとまとまりにするので、かっこをつけて $(300 + 100) \times 2 = 400 \times 2 = 800$ (円)。かっこを忘れて $300 + 100 \times 2$ と書くと 500 円になり、「ケーキ 1 こと、ジュース 2 本」の代金になってしまいます。

かっこが要るかどうかの見分け方

「1人分」「1れつ」「全部で」のように、+や- でできた部分をひとまとまりとして、かけたり、わったり、ひいたりしたいときは、かっこでかこむ。

6 同じなかまは、左から順に

＋と－ だけのとき 10円持っていて、3円使い、そのあと2円もらいました。今いくら？




図9 10から3もどって7、そこから2進んで9。

お金は、起きた順にふえたりへったりするので、 $10 - 3 + 2$ は左から $10 - 3 = 7$ 、 $7 + 2 = 9$ で9円。もし $3 + 2$ を先にすると $10 - 5 = 5$ になり、「5円使った」ことになってしまいます。「- 3」の- は、すぐ後の3だけについた印です。2-2のように $10 + (-3) + 2$ と考えれば、どこから計算しても9になります。

×と÷だけのとき $24 \div 4 \times 2$ は「24を4つに等しく分けた1つ分(6)の、2つ分」で、左から $24 \div 4 = 6$ 、 $6 \times 2 = 12$ 。もし×を先にすると $24 \div 8 = 3$ で、「8つに分けた1つ分」という別の意味になります。8つに分けたいときは、かっこを使って $24 \div (4 \times 2)$ と書きます。

$$20 - 4 \times 3 = 20 - 12 = 8 \quad \text{②} \times \text{を先に (下線の所が先)}$$

$$(20 - 4) \times 3 = 16 \times 3 = 48 \quad \text{①} \text{かっこの中を先に}$$


$$12 \div 4 \times 5 = 3 \times 5 = 15 \quad \text{③} \times \text{と} \div \text{だけなので、左から}$$

$$15 - 6 + 4 = 9 + 4 = 13 \quad \text{③} + \text{と} - \text{だけなので、左から}$$

7 文字で、いつでも成り立つきまりを書く

2 + 3 と 3 + 2 は、どちらも 5 です。4 × 5 と 5 × 4 も、どちらも 20 です (1-13)。ほかのどんな数でもそうなので、文字を使って $a + b = b + a$ 、 $a \times b = b \times a$ と 1 行で書けます。これを交換法則といいます。文字は「どんな数でも」という意味で使えるのです。ただし、ひき算とわり算では入れかえられません (5 - 2 = 3 ですが、2 - 5 = -3)。

もう 1 つ、長方形の面積で考えましょう。図の長方形全体の面積は、何 cm^2 かな？



考え方 A 横の長さを先にたす (かっこのなかさが先)。

$$(2 + 3) \times 4 = 5 \times 4 = 20$$

考え方 B 2 つの長方形に分ける (×が先)。

$$2 \times 4 + 3 \times 4 = 8 + 12 = 20$$

どちらも 20 cm^2 になりました。

ほかの数でも確かめましょう。横が 5 と 1、たてが 3 なら、 $(5 + 1) \times 3 = 18$ 、 $5 \times 3 + 1 \times 3 = 15 + 3 = 18$ 。横が 1.5 と 2.5、たてが 2 なら、 $(1.5 + 2.5) \times 2 = 8$ 、 $1.5 \times 2 + 2.5 \times 2 = 3 + 5 = 8$ 。いつでも同じになります。だから、文字を使って 1 行で書けます。

$$(a + b) \times c = a \times c + b \times c$$

これを分配法則といいます。かっこの外の c を、中の a にも b にも「分けて配る」から、この名前がついています。ひき算でも、 $(a - b) \times c = a \times c - b \times c$ が成り立ちます。

前のケーキとジュースも、分配法則で確かめられます。

$$(300 + 100) \times 2 = 300 \times 2 + 100 \times 2 = 600 + 200 = 800$$

「ケーキ2こ分とジュース2本分」と考えても同じ800円です。かっこをつけた式と、つけずに×を2回書いた式は、同じ答えになります。2-12では、このきまりで文字式のかっこをはずします。

🔍 もっと知りたい ★★

x は、どこから来たの？

400年ほど前、フランスのデカルトは、わかっている数を a 、 b 、 c 、わからない数を x 、 y 、 z で表しました。この書き方が広まって、今でも、わからない数には x がよく使われます。

たいせつ

文字は、どんな数でも入る箱。いつでも使える式が1行で書ける。

計算の順番 ①かっこの中 → ②×÷ → ③+- (同じなかまは左から)。

累乗は、かっこの次、×÷より先。

×÷でできた部分は1つの量なので先に。+- でできた部分をひとまとまりにしたいときは、かっこでかこむ。

📖 この章で出てきたことば

文字式 文字を使って書いた式。 $x = v \times t$ など。

交換法則 $a + b = b + a$ 、 $a \times b = b \times a$ 。順番を入れかえても答えは同じ。

分配法則 $(a + b) \times c = a \times c + b \times c$ 。かっこの外の数、中のどちらにもかける。

📇 記号カード

はじめて出た章 2-11

x

読み方 エックス
意味 数のかわりに使う文字。
どんな数でも入る箱。
英語 x

📇 記号カード

はじめて出た章 2-11

()

読み方 かっこ
意味 ひとまとまりにする印。
かっこの中を先に計算する。
英語 parentheses

コラム 電卓で、計算の順番を確かめよう

電卓で、 $1 + 3 \times 100 =$ と、ボタンを順におしてみましよう。301 と出る電卓は、計算の順番のきまりを知っています。400 と出る電卓は、おした順に計算しています。どちらの電卓でも、先に $3 \times 100 =$ で 300 を出してから 1 をたせば、きまりどおりの答えになります。2-18 で学ぶ表計算や、2-19 のプログラムは、きまりどおりに計算します。

例題でたしかめよう

例題1 きまりを見つけて、文字の式を作る

自転車^{じてんしゃ}が、スタートの10 m^{さき}先から4 m/s^{すす}で進みます。 t 秒^{びょうご}後の位置^{い ち} x m を t の式^{しき}で表し、 $t = 5$ のとき^{しき あらわ}の位置^{い ち}を求め^{もと}ましょう。

考え方 $t = 0$ で10、 $t = 1$ で14、 $t = 2$ で18。10 に、1 秒^{びょうご}ごとに4 ずつ^{ぶん}ふえる。 t 秒^{びょう}では、4 が t ぶん^{ぶん}ふえる。

しき 位置^{い ち} = $10 + 4 \times$ 時間^{じ かん} だから、 $x = 10 + 4 \times t$

$t = 5$ のとき、 $x = 10 + 4 \times 5 = 10 + 20 = 30$ (×を先^{さき}に)

こたえ $x = 10 + 4 \times t$ 、30 m

じぶんでところ1

20 L^{みず}の水^{はい}が入^{すい}った水^{ぶん}そうに、1 分^{ぶん}に3 L^{みず}ずつ水^いを入^{ふん}れます。 t 分^{ふん}後の水^{みず}の量^{りょう} y L を t の式^{しき}で表し、 $t = 8$ のとき^{もと}を求め^{もと}ましょう。

じぶんでところ2

120 ページ^{ほん}の本^{にち}を、1 日^よに8 ページ^{にち}ずつ読^よみます。 t 日^{にち}後^ごに残^{のこ}っているページ^{すう}数を y として、 y を t の式^{しき}で表^{あらわ}し、 $t = 5$ のとき^{もと}を求め^{もと}ましょう (読^よんだ分^{ぶん}だけへるので、ひき算^{ざん}になります)。



例題2 計算の順番

計算しましょう。(1) $18 - 12 \div 3 \times 2$ (2) $(8 - 2 \times 5) \times (-3)$
(3) $20 - 7 + 5$



①かっこのなか ②×と÷ ③+と- の順に計算します。同じな
かまは左から。先に計算する所に下線を引くと、まちがえにくくなります。

しき (1) ÷と×は左から。 $18 - \underline{12 \div 3} \times 2 = 18 - \underline{4} \times 2 = 18 - 8 = 10$

(2) かっこのなか ×が先。 $(8 - \underline{2 \times 5}) \times (-3) = (8 - 10) \times (-3)$
 $= (-2) \times (-3) = 6$

(3) - と+は左から。 $\underline{20 - 7} + 5 = 13 + 5 = 18$

こたえ (1) 10 (2) 6 (3) 18



じぶんでとこう3

計算しましょう。(1) $20 \div 4 \times 2 + 6$ (2) $(3 - 4 \times 2) \times (-2)$
(3) $15 - 9 + 4$

例題3 文章から1行の式を作る：かっこは要る？

- (1) 1こ120円のパンを3こと、150円の牛乳を1本買って、1000円出しました。おつりはいくらですか。
- (2) 4人が、それぞれ300円のケーキと100円のジュースを買いいます。代金は全部でいくらですか。
- (3) 国語が80点、算数が90点でした。2つの平均は何点ですか（平均は、たしてから個数でわる。2-6）。

考え方 ひとまとまりにしたい「代金の合計」「1人分」「点数の合計」を、かっこでかこみます。

しき (1) 代金の合計を1000円からひく。
 $1000 - (120 \times 3 + 150) = 1000 - (360 + 150)$
 $= 1000 - 510 = 490$

(2) 1人分が4つ分。 $(300 + 100) \times 4 = 400 \times 4 = 1600$

(3) 合計を2でわる。 $(80 + 90) \div 2 = 170 \div 2 = 85$

こたえ (1) 490円 (2) 1600円 (3) 85点

(1)でかっこを忘れて $1000 - 120 \times 3 + 150$ と書くと、 $1000 - 360 + 150 = 790$ になります。これは牛乳の150円を「はらう」のではなく「もらう」式です。

じぶんでこう4

- (1) 1本80円のえんぴつを5本と、120円のノートを1冊買って、1000円出しました。おつりは？ (2) 3人が、それぞれ250円のおにぎりとお茶を150円のお茶を買いいます。代金は全部で？ (3) 38kgと42kgの平均は？ どれも1行の式で書きましょう。

 例題 4 しき あらわ ば めん よ 式が表す場面を読む

りんごは1こ120^{えん}円、みかんは1こ50^{えん}円です。(1) $120 \times 2 + 50 \times 3$ 、
(2) $(120 + 50) \times 3$ は、それぞれ何をいくつ買ったときの代金^{だいきん}ですか。代金^{だいきん}も求めましょう。

考え方 かんが かつ $\times$ でできた部分は「1つ分^{ぶん} $\times$ いくつ分^{ぶん}」のまとまり。かっこは「ひとまとまり^{しるし}」の印です。

しき (1) 120×2 はりんご2こ、 50×3 はみかん3こ。 $240 + 150 = 390$

(2) $120 + 50$ は、りんご1ことみかん1この組^{くみ}。

それが3組^{くみ}なので、 $170 \times 3 = 510$


こたえ (1) りんご2ことみかん3こで390^{えん}円 (2) りんごとみかんを3こずつで510^{えん}円

 じぶんでこう 5

ノートは1冊150^{えん}円、えんぴつは1本60^{えん}円です。(1) $150 \times 4 + 60 \times 2$ 、
(2) $(150 + 60) \times 2$ は、それぞれ何をいくつ買ったときの代金^{だいきん}ですか。代金^{だいきん}も求めましょう。

例題5 図から、文字の式を作る

つまようじで、正三角形を右の図のようにつなげます。 n こつくとするときの本数を n の式で表し、 $n = 50$ のときを求めましょう。




考え方 左はしの1本（オレンジ）に、三角形1 こにつき2本ずつ（青）がつながる。

しき 本数 = $1 + 2 \times n$ 。 $n = 50$ のとき、 $1 + 2 \times 50 = 1 + 100 = 101$ （×を先に）

こたえ $1 + 2 \times n$ （本）、101 本

じぶんでとこう6

正六角形を右の図のようにつなげます。 n このときの本数を n の式で表し、 $n = 30$ のときを求めよう。



もっと知りたい ★★

きまりを見つけて式を作る3つの手順

つまようじの問題は、いつも同じ手順で式にできます。例題の正三角形で確かめましょう。

- ① $n = 1, 2, 3, \dots$ のときの本数を、表に書く。
- ② 1 こふえるたびに、何本ふえるか（ふえる数）を見る。
- ③ $n = 1$ の本数から、ふえる数を1 回ひいて、「はじめの数」を見つける。

さんかくけい かず 三角形の数 n	1	2	3	4	5
ほんすう 本数	3	5	7	9	11

ひょう みぎ すす ほん かず
表を右へ1つ進むたびに2本ふえるので、ふえる数は2。はじめの数は
3 - 2 = 1。だからしき「はじめの数 + ふえる数 $\times n$ 」で、 $1 + 2 \times n$ です。
 $n = 5$ を入ると $1 + 10 = 11$ で、表と合います。例題1の $x = 10 + 4 \times t$
も、はじめの数10に、ふえる数4が t ぶんこ分たされた、同じ形の式です。

例題6 かっこをつける場所で、答えが変わる

6 + 4 $\times$ 3 - 2 に、かっこを1組だけつけます。答えがいちばん大きくなるのは、どこにつけたときですか。

考え方 かっこをつけられる場所を全部ためして、くらべます。かっこがないときも計算しておきます。

しき かっこなし : $6 + 12 - 2 = 16$

$$(6 + 4) \times 3 - 2 = 10 \times 3 - 2 = 30 - 2 = 28$$

$$6 + 4 \times (3 - 2) = 6 + 4 \times 1 = 10$$

$$(6 + 4 \times 3) - 2 = 18 - 2 = 16, 6 + (4 \times 3 - 2) = 6 + 10 = 16$$

こたえ $(6 + 4) \times 3 - 2 = 28$

じぶんでこう7

$1 + 2 \times 5 - 3$ に、かっこを1組だけつけて、答えをできるだけ大きくしましょう。そのときの答えも書きましょう。

例題7 分配法則で、くふうして計算する

くふうして計算しましょう。(1) 102×6 (2) 99×8

考え方 102 を $100 + 2$ 、99 を $100 - 1$ と分けて、分配法則を使います。

100 のかけ算は、暗算でかんたんにできるからです。

しき (1) $102 \times 6 = (100 + 2) \times 6 = 100 \times 6 + 2 \times 6 = 600 + 12 = 612$

(2) $99 \times 8 = (100 - 1) \times 8 = 100 \times 8 - 1 \times 8 = 800 - 8 = 792$

こたえ (1) 612 (2) 792

じぶんでとこう8

くふうして計算しましょう。(1) 103×7 (2) 98×5

⚠ まちがえやすいところをチェック

⚠ まちがえやすいところ

ひだり じゅん けいさん
左から順に計算してしまう

✗ $6 + 4 \times 2 = 10 \times 2 = 20$

○ $6 + 4 \times 2 = 6 + 8 = 14$

× と ÷ が先。おした順に計算する電卓に注意 (241 ページ)。

⚠ まちがえやすいところ

×を、÷より先に計算してしまう

✕ $24 \div 4 \times 2 = 24 \div 8 = 3$

○ $24 \div 4 \times 2 = 6 \times 2 = 12$

×と÷は同じなかま。×と÷だけなら、左から順に計算します。

⚠ まちがえやすいところ

+を、- より先に計算してしまう

✕ $12 - 5 + 3 = 12 - 8 = 4$

○ $12 - 5 + 3 = 7 + 3 = 10$

- 5 の- は、5 だけについた印。+と- だけなら、左から順に計算します。

⚠ まちがえやすいところ

9 秒と 10 秒の平均で、かっこを忘れる

✕ $9 + 10 \div 2 = 9 + 5 = 14$

○ $(9 + 10) \div 2 = 19 \div 2 = 9.5$

平均は、たしてからわる (2-6)。9 秒と 10 秒の平均が 14 秒になるのは、おかしいとわかります。

⚠ まちがえやすいところ

かっこの中より先に、かっこの外を計算してしまう

✕ $(2 + 3) \times 5 = 2 + 15 = 17$

○ $(2 + 3) \times 5 = 5 \times 5 = 25$

かっこの中は1つの数のかわり。いちばん先に計算します。

ぶつり こうがく つか
物理・工学ではこう使う

車が止まるまでの距離 運転手が危険に気づいてから、ブレーキをふむまでに、およそ 0.75 秒かかります。そのあいだも、車はそれまでの速さで進みます。この距離を空走距離といいます。速さを v (m/s)、ブレーキをふむまでの時間を t (s) とすると、空走距離 x (m) は $x = v \times t$ で計算できます。 $t = 0.75$ として、いろいろな速さを入れてみましょう。




図 10 制動距離は、ブレーキがきいてから止まるまでの距離。

速さ v	10 m/s (時速 36 km)	20 m/s (時速 72 km)	30 m/s (時速 108 km)
空走距離 $v \times 0.75$	7.5 m	15 m	22.5 m

時速は、2-10 の単位つきの 1 で換算しました。たとえば $10 \text{ m/s} \times 3600 \text{ s/h} \div 1000 \text{ m/km} = 36 \text{ km/h}$ (s と m が約分されて消える)。速さが 2 倍になると、空走距離も 2 倍。自動ブレーキのある車のコンピュータも、はかった距離や速さを文字の式に入れて、ぶつからないかを計算しつづけています。



しょうまつもんだい
章末問題

2-11 のまとめ

きほん
基本



1 次の計算をしましょう。

- (1) $8 + 6 \times 3$ (2) $(8 + 6) \times 3$ (3) $30 - 18 \div 6$ (4) $16 \div 4 \times 2$
 (5) $(15 - 3) \div (2 + 4)$ (6) $20 - 8 + 3$ (7) $2 + 3 \times 5$ と $(2 + 3) \times 5$


2 次の計算をしましょう。

- (1) $-5 + 2 \times (-3)$ (2) $(-4) \times (6 - 9)$ (3) $10 - (-2) \times (-4)$

3 500 円出して、1 こ 80 円のガムを 2 こと、60 円のあめを 1 こ買いました。おつりを 1 行の式で書いて求めましょう。

4 長さ 30 cm のろうそくが、火をつけると 1 分に 2 cm ずつ短くなります。t 分後のろうそくの長さを y cm として、y を t の式で表しましょう。また、t = 10 のときの長さを求めましょう。

5 つまようじで、正方形を右の図のように 2 段にして横につなげます。たてに 2 こならんだ正方形の組を n 組つくるときの本数を、n の式で表しましょう。また、n = 10 のときの本数を求めましょう。



6 分配法則を使って、くふうして計算しましょう。(1) 101×9 (2) 49×4

7 貸し自転車の料金は、200 円に、1 時間ごとに 100 円ずつたしていきます。t 時間使ったときの料金を y 円として、y を t の式で表しましょう。また、t = 3 のときの料金を求めましょう。

8 1こ60円のみかんを5こ買って、500円出しました。おつりを1行の式で書いて求めましょう。かっことは要りますか。

9 ジュースは1本120円、パンは1こ150円です。(1) $120 \times 3 + 150 \times 2$ 、(2) $(120 + 150) \times 2$ は、それぞれ何をいくつ買ったときの代金ですか。代金も求めましょう。

10 算数のテストが70点、80点、90点でした。平均を1行の式で書いて求めましょう。

チャレンジ ★★

11 車が止まるまでの空走距離は $x = v \times t$ で計算できます (251 ページ)。ブレーキをふむまでの時間を $t = 0.75$ (秒) として、速さが 12 m/s のときと 25 m/s のときの空走距離を求めましょう。

12 $2 + 3 \times 4 - 1$ に、かっこを1組だけつけて、答えをできるだけ大きくしましょう。そのときの答えも書きましょう。

13 3回はかった50m走のタイムは、9.4秒、9.8秒、9.6秒でした。平均を1行の式で書いて、計算しましょう。

9.4

1回目

9.8

2回目

9.6

3回目

14 1こ4kgの箱Aと、1こ2kgの箱Bがあります。(1) $4 \times 3 + 2 \times 5$ 、(2) $(4 + 2) \times 5$ は、それぞれ何をいくつ運んだときの重さですか。重さも求めましょう。

15 $8 - 2 \times 3 + 1$ に、かっこを1組だけつけて、答えをできるだけ小さくしましょう。そのときの答えも書きましょう。

コラム 累乗があるときは？ 世界の覚え方

2-7 の累乗がある式では、累乗をカッコの次、 $\times \div$ より先に計算します。 3^2 は「3 を 2 回かけた 1 つのまとまり」だからです。たとえば $2 \times 3^2 = 2 \times 9 = 18$ で、 $6^2 = 36$ ではありません。アメリカでは、この順番を、カッコ (Parentheses)・累乗 (Exponents)・ $\times \div$ (Multiplication, Division)・ $+-$ (Addition, Subtraction) の頭文字をとって「PEMDAS (ペムダス)」と覚えます。国がちがっても、計算の順番は同じです。

✓ ふりかえり できるようになったかな？

- ☐ ことばの式を、□や文字を使った式で表せる。 → 232 ページ
- ☐ 計算の順番のきまりと、そのわけがわかる。 → 233 ページ
- ☐ どんな数でも成り立つきまりを、文字で 1 行に書ける。 → 239 ページ



ソラ

計算の順番は、式の意味どおりに計算するためのやくそくなんだね。
次の 2-12 では、文字式をもっと短く書くやくそくを学ぶよ。

×毛

3

2-12 文字式のやくそく


追しるべ この章のまえに 2-2 2-7 2-11 この章の先に 2-13 2-14 3-8 5-2 5-4

この章でできるようになること

- ★★ $\times$ をはぶき、 $\div$ を分数にして、文字式を短く書ける。
- ★★ 同類項をまとめたり、かっこをはずしたりできる。
- ★★ 指数のきまりを、文字を使って書いて使える。

? はてな?

えんぴつ3本とえんぴつ2本を合わせると、えんぴつ5本。では、えんぴつ3本とけしゴム2こを合わせると、「えんぴつけしゴム5こ」かな?



長さでも同じです。 $3m + 2m = 5m$ 。では、 $3m + 2$ 秒は? 文字式の $3 \times x + 2 \times y$ は、 $5 \times x \times y$ にまとめてよいのでしょうか?

この章では、文字式を短く書くやくそくと、文字式をまとめたり、かっこをはずしたりするきまりを学びます。

△ やってみよう 電卓で、2つの計算をくらべよう

- 1 x に 2、3、1.5 を入れて、 $x^2 \times x^3$ と x^5 と x^6 を電卓で計算しよう。
- 2 A 、 B 、 h に表の数を入れて、 $(A+B) \div h$ と $A \div h + B \div h$ を計算しよう。
- 3 いつも同じになるのは、どれとどれかな？

x	$x^2 \times x^3$	x^5	x^6
2	$4 \times 8 = 32$	32	64
3			
1.5			

A	B	h	$(A+B) \div h$	$A \div h + B \div h$
6	4	2	$10 \div 2 = 5$	$3 + 2 = 5$
9	3	3		
5	7	4		

🕒 おもいだそう この章で使う、前に学んだこと

- 2-7** $10^2 \times 10^3 = 10^5$ (かける回数をたす)。 $10^0 = 1$ 、 $10^{-1} = \frac{1}{10}$
- 2-11** 分配法則 $(a+b) \times c = a \times c + b \times c$
- 2-3** たし算・ひき算ができるのは、同じ種類の量どうしだけ。
- 2-4** わり算は分数で書ける： $2 \div 3 = \frac{2}{3}$
- 2-2** $(-1) \times 3 = -3$ 、 $(-1) \times (-2) = 2$ 。 $\times (-1)$ で向きが反対になる。

すうがく どうぐ 数学の道具


① ×をはぶいて、^{みじか}短く^か書く

2-11では、 $x = v \times t$ のように×を書きました。文字式には×がたくさん出るので、^{すうがく}数学や^{ぶつり}物理では、^{つぎ}次のやくそくで^{みじか}短く^か書きます。

	やくそく	もとの式 ^{しき}	^{みじか} 短く ^か 書くと
1	文字のかけ算の×をはぶく	$v \times t, 3 \times x$	$vt, 3x$
2	数は文字の前に書く	$x \times 3$	$3x$
3	1は書かない	$1 \times x, (-1) \times x$	$x, -x$
4	同じ文字のかけ算は累乗で (2-7)	$x \times x, x \times x \times x$	x^2, x^3
5	÷は分数で書く	$x \div 3, a \div b$	$\frac{x}{3}, \frac{a}{b}$
6	文字はアルファベット順に	$y \times x \times 2$	$2xy$

ひょう 表1 ^{もじ しき}文字式のやくそく

$3x$ は $3 \times x$ で、「3が x こ分^{ぶん}」とも「 x が3分^{ぶん}」とも読めます(交換法則、2-11)。
長さ x のテープ3本分の長さです。数と数のあいだの×は、はぶきません。 3×4 を34と書くと、三十四とまちがえるからです。



ず 図1 $3x = x + x + x$

それぞれのやくそくの、わけ

- ① ×を書かなくても、文字は1字ずつなので、 vt が「 v と t のかけ算^{さん}」だとわかります。
- ② 数を前にそろえると、 $3x$ と $x3$ のように同じものが2通りに書かれず、くらべやすくなります。

- ③ 1 をかけても大きさは変わらないので ($1 \times 5 = 5$)、 $1x$ は x と同じです。
 $(-1) \times x$ は「 x の反対の向き」なので ($2-2$)、 $-x$ と書きます。
- ④ $x \times x$ は、1 辺が x の正方形の面積です (下の図)。2-7 で $3 \times 3 = 3^2$ と書いたのと同じです。
- ⑤ わり算は分数で書けました ($2-4: 2 \div 3 = \frac{2}{3}$)。÷ よりも、どこからどこまでをわるのかが、はっきりします。
- ⑥ 文字の順番も、だれが書いても同じ形になるようにそろえます ($2xy$ と $2yx$ は同じ)。




図2 $x \times x = x^2$ は、1 辺 x の正方形の面積。

短く書いても、意味は変わりません。たとえば $x = 3$ のとき、 $4x$ は $4 \times 3 = 12$ 、 x^2 は $3 \times 3 = 9$ 、 $\frac{x}{3}$ は $3 \div 3 = 1$ です。2-11 の $x = v \times t$ は、これからは $x = vt$ と書きます。

② 同じ種類どうしだけ、まとめられる

② はてな? を考えます。えんぴつ 1 本の長さを x cm、けしゴム 1 本の長さを y cm とします。

$$3x + 2x \quad \begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline x & x & x & x & x \\ \hline \end{array} = 5x$$

$$3x + 2y \quad \begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline x & x & x & y & y \\ \hline \end{array} \quad \text{まとめられない}$$

図3 x どうしはまとめられる。 x と y は、まとめられない。

$3x + 2x$ は、 x が 3 つと 2 つで 5 つなので、 $5x$ です。分配法則 (2-11) を使くと、 $3x + 2x = (3 + 2)x = 5x$ です。でも、 $3x + 2y$ は、 x と y の長さがちがうので、これ以上まとめられません。② はてな? の答えは「まとめられない」です。 3 m と 2 秒をたせないのと、同じです (2-3)。

$3x + 2y$ のように、+ でつながった1つ1つ ($3x$ と $2y$) を項といい、文字にかけてある数を係数といいます ($3x$ の係数は3)。文字の部分が同じ項を同類項といいます。まとめられるのは、同類項どうしだけです。ひき算は、マイナスの数をたすと考えます (2-2)。 $5a - 3a = 5a + (-3a)$ なので、項は $5a$ と $-3a$ です。

ひき算も、テープで考えるとわかります。

$5a - 3a$ は、 a のテープ5本から3本をとるので、2本が残ります。分配法則でも、 $5a - 3a = (5 - 3)a = 2a$ です。




図4 $5a - 3a = 2a$

とる数のほうが多いときは、係数がマイナスになります。

$$3x - 7x = (3 - 7)x = -4x$$

$3 - 7 = -4$ は、2-2の数直線で3から7左へ進んだ所です。

同類項が離れているときは、項を符号ごと並べかえてから、まとめます。たとえば、 $4x + 3 + x + 5 = 4x + x + 3 + 5 = 5x + 8$ (x の項どうし、数どうし)。 $x = 2$ を入れて確かめると、左は $8 + 3 + 2 + 5 = 18$ 、右は $10 + 8 = 18$ で同じです。

$x + x^2$ は、長さ (m) と面積 (m^2) のように種類がちがうので、まとめられません。 $x = 3$ なら $x + x^2 = 3 + 9 = 12$ ですが、 $2x^2 = 18$ や $2x = 6$ にはなりません。

③ かっこをはずす・まとめてわる

かっこをはずす 分配法則 (2-11) を、文字式で使います。

$$3(x + 2) = 3 \times x + 3 \times 2 = 3x + 6$$

右の図の長方形の面積を、2通りに表した式です。





図5 $3(x + 2) = 3x + 6$

かっこの前がマイナスのときは、 -1 をかけると考えます (2-2)。

$$-(x-2) = (-1) \times x + (-1) \times (-2) = -x + 2$$

$x=5$ で確かめます。左は $-(5-2) = -3$ 、右は $-5+2 = -3$ で、同じです。もし $-x-2$ とまちがえると $-5-2 = -7$ になり、合いません。

まとめてわる ㊦ やってみよう の②では、 $(A+B) \div h$ と $A \div h + B \div h$ が、いつも同じになりました。長方形で考えると、わけがわかります。



たての長さが h の長方形の横の長さは、面積 $\div h$ 。全体の横は $(A+B) \div h$ 、2つに分けると $A \div h$ と $B \div h$ です。どちらも同じ横の長さです。

まとめてわるときは、1つずつわってよい： $(A+B) \div h = A \div h + B \div h$

分数で書くと $\frac{A+B}{h} = \frac{A}{h} + \frac{B}{h}$ です。たとえば、 $\frac{6x+4}{2} = \frac{6x}{2} + \frac{4}{2} = 3x+2$ 。ただし、分母が和の $\frac{6}{2+1}$ は、分けられません。正しくは $\frac{6}{3} = 2$ ですが、分けて $\frac{6}{2} + \frac{6}{1} = 3+6=9$ とすると合いません。1つずつわってよいのは、わられる数 (分子) がたし算のときだけです。

㉣ 指数のきまりを、文字で書く

2-7では、 $10^2 \times 10^3 = 10^5$ のように、かける回数をたせばよいことを、数で学びました。㊦ やってみよう の①でも、 x がどんな数でも、 $x^2 \times x^3$ と x^5 は同じでした。わけは、かけている x の数を数えるとわかります。

$$x^2 \times x^3 = \boxed{x} \boxed{x} \times \boxed{x} \boxed{x} \boxed{x} = x^5 \quad (x \text{ が } 2+3=5 \text{ こ})$$

図6 x を2回かけて、さらに3回かけると、5回かけたことになる。

㊦ やってみよう ^{ひょう}の表のように、 $x = 2$ なら $2^2 \times 2^3 = 4 \times 8 = 32$ 、 $2^5 = 32$ で同じです。 x^6 (64) にはなりません。だから、かける回数^{かいすう}を表す 1、2、3、… のどんな数^{かず} m 、 n でも、

$$x^m \times x^n = x^{m+n}$$

ここで m 、 n は「指数^{しすう}に入る数^{はい}の箱^{かず}」です (2-11)。 x そのものは、 x を 1 回^{かい}だけ使うので $x = x^1$ と考えます。わり算^{わりざん}では、分母^{ぶんぼ}と分子^{ぶんし}で同じ x を消^けして、 $\frac{x^5}{x^2} = \frac{x \times x \times x \times x \times x}{x \times x} = x^3$ 。かける回数^{かいすう}をひきます。

次に、2-7 の表^{ひょう}のならびを文字^{もじ}で書^かきます。右へ 1 つ進む^{みぎすす}たびに、 x でわりま^すす。0 ではわれないので (1-14)、ここでは x は 0 でない数^{かず}とします。

	x^3	x^2	x^1	x^0	x^{-1}	x^{-2}
意味 ^{いみ}	$x \times x \times x$	$x \times x$	x	1	$\frac{1}{x}$	$\frac{1}{x^2}$
$x = 2$	8	4	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

表2 ^{ひょう}右へ 1 つ進む^{みぎすす}たびに x でわる

$x^1 \div x = x \div x = 1$ (同じ数^{おなかず}どうしのわり算^{ざん}) なので $x^0 = 1$ 。 x が 2 でも 10 でも、0 乗^{じょう}は 1 です。もう 1 回^{かい}わって $x^{-1} = \frac{1}{x}$ 、もう 1 回^{かい}わって $x^{-2} = \frac{1}{x^2}$ です。マイナスの指数^{しすう}でも、 $x^m \times x^n = x^{m+n}$ が使^{つか}えます。たとえば、 $x^3 \times x^{-1} = x^2$ 。これは、 $x^3 \div x = x^2$ と同じです。

🔍 もっと知りたい ★★

$x^0 = 1$ を、もう 1 つの方法^{ほうほう}で確^{たし}かめる

わり算^{わりざん}のきまり「かける回数^{かいすう}をひく」を、分母^{ぶんぼ}と分子^{ぶんし}が同じ $\frac{x^2}{x^2}$ に使^{つか}ってみます。

$$\frac{x^2}{x^2} = x^{2-2} = x^0$$

いっぽう、同じ数どうしのわり算なので、 $\frac{x^2}{x^2} = \frac{x \times x}{x \times x} = 1$ です。同じものを2通りに計算したので、 $x^0 = 1$ と決めれば、きまりがいつでも使えます。

同じように、 $\frac{x^2}{x^3} = x^{2-3} = x^{-1}$ で、約分すると $\frac{x \times x}{x \times x \times x} = \frac{1}{x}$ 。だから $x^{-1} = \frac{1}{x}$ です。表のならばで考えても、約分で考えても、同じ答えになります。

たいせつ

×をはぶく ($3 \times x = 3x$)、÷は分数 ($x \div 3 = \frac{x}{3}$)、 $x \times x = x^2$

同類項 (同じ種類) どうしだけ、まとめられる: $3x + 2x = 5x$

まとめてわるときは、1つずつわってよい: $(A + B) \div h = A \div h + B \div h$

$$x^m \times x^n = x^{m+n}, \frac{x^m}{x^n} = x^{m-n}$$

$$x^0 = 1, x^{-1} = \frac{1}{x}, x^{-2} = \frac{1}{x^2}$$

この章で出てきたことば

項 +でつながった1つ1つ。 $3x + 2y$ の項は $3x$ と $2y$ 。

係数 文字にかけてある数。 $3x$ の係数は3、 $-x$ の係数は-1。

同類項 文字の部分が同じ項。 $3x$ と $2x$ は同類項。 x と x^2 はちがう。

記号カード

初めて出た章 2-12

$$x^{-1}$$

読み方 エックスのマイナス1乗
意味 $\frac{1}{x}$ のこと。 x で1回わる。
英語 x to the minus one

記号カード

初めて出た章 2-12

$$x^0$$

読み方 エックスの0乗
意味 1 のこと (x は0でない)。
英語 x to the zero

例題でたしかめよう

例題1 やくそくで短く書く

短く書きましょう。(1) $a \times 5 \times b$ (2) $x \times x \times (-3)$ (3) $(x+1) \div 4$

考え方 258 ページの表のやくそくを、1 つずつあてはめます。

しき (1) 数を前に、 $\times$ をはぶく。 $a \times 5 \times b = 5ab$

(2) $x \times x = x^2$ 、数を前に。 $x \times x \times (-3) = -3x^2$

(3) $\div$ は分数。かつこの中がまとまって分子になる。 $\frac{x+1}{4}$

こたえ (1) $5ab$ (2) $-3x^2$ (3) $\frac{x+1}{4}$

じぶんでとこう1

短く書きましょう。(1) $y \times x \times 2$ (2) $a \times a \times a$ (3) $(a-b) \div 3$

例題2 同類項をまとめる

まとめましょう。(1) $4x + 3x$ (2) $5a + 2 - 3a + 4$ (3) $2x + 3x^2$
(4) $3x + 1 - 7x$

考え方 同類項どうし、数の項どうしをまとめます。

しき (1) $4x + 3x = (4+3)x = 7x$

(2) $5a + 2 - 3a + 4 = 5a - 3a + 2 + 4 = 2a + 6$

(3) x と x^2 は同類項ではないので、まとめられない

(4) 符号ごとと並べかえる。 $3x - 7x + 1 = (3-7)x + 1 = -4x + 1$

こたえ (1) $7x$ (2) $2a + 6$ (3) $2x + 3x^2$ のまま (4) $-4x + 1$

じぶんでとこう 2

まとめましょう。(1) $7y - 2y$ (2) $3x - 5 + x + 8$ (3) $a^2 + a$
(4) $2b + 6 - 5b$

例題 3 かっこをはずす・まとめてわる

計算しましょう。(1) $3(2x + 1)$ (2) $-(4a - 3)$ (3) $(8x + 6) \div 2$

考え方 かっこの外の数、中のどの項にもかけます。

しき (1) $3(2x + 1) = 3 \times 2x + 3 \times 1 = 6x + 3$

(2) $-(4a - 3) = (-1) \times 4a + (-1) \times (-3) = -4a + 3$

(3) $(8x + 6) \div 2 = \frac{8x}{2} + \frac{6}{2} = 4x + 3$

こたえ (1) $6x + 3$ (2) $-4a + 3$ (3) $4x + 3$

じぶんでとこう 3

計算しましょう。(1) $5(x - 2)$ (2) $-(2y + 5)$ (3) $(9a - 6) \div 3$

もっと知りたい ★★

答えが正しいか、数を入れて確かめよう

文字式の計算は、形を変えても値が変わらないように書きかえることです。

だから、文字にかんたんな数を入れて、もとの式と答えの式が同じ値になるかを見れば、まちがいに気づけます。

$x = 2$ を入れる	もとの式 $3(2x + 1)$	答え $6x + 3$
正しい答え	$3 \times 5 = 15$	$12 + 3 = 15$
まちがい $6x + 1$ のとき	$3 \times 5 = 15$	$12 + 1 = 13$

15 と 13 で合わないので、 $6x + 1$ はまちがいだとわかります。1 はかけても大きさが変わらない数、0 はかけると答えが 0 になる数なので、0 や 1 を入れると、まちがいを見のがすことがあります。2 や 3 を使うとよいでしょう。次の例題でも、この方法で確かめます。

例題 4 かっこをはずしてから、まとめる

$3(x + 2) - (x - 4)$ を計算しましょう。 $x = 1$ を入れて確かめましょう。

考え方 ① それぞれのかっこをはずす（前がマイナスのかっこは、どの項にも -1 をかける）。② 同類項をまとめる。

しき ① $3(x + 2) - (x - 4) = 3x + 6 - x + 4$

② $3x - x + 6 + 4 = (3 - 1)x + 10 = 2x + 10$

確かめ： $x = 1$ のとき、もとの式は $3 \times 3 - (-3) = 9 + 3 = 12$

$2x + 10$ は $2 + 10 = 12$ で、同じ

こたえ $2x + 10$

じぶんでこう 4

$2(a + 1) - (a - 5)$ を計算しましょう。 $a = 2$ を入れて確かめましょう。

例題5 指数のきまりを使う

計算しましょう。(1) $x^3 \times x^4$ (2) $\frac{x^5}{x^2}$ (3) $x^2 \times x^{-1}$ (4) $\frac{a^4}{a}$ (5) y^0
 (6) $\frac{10h + 5h^2}{h}$

考え方 かけるときは指数をたし、わるときはひきます(文字は0でない数)。a は a^1 と考えます。

しき (1) $x^{3+4} = x^7$ (2) $x^{5-2} = x^3$ (3) $x^{2+(-1)} = x^1 = x$
 (4) $\frac{a^4}{a^1} = a^{4-1} = a^3$ (5) 0 乗は 1。 $y^0 = 1$
 (6) 1 つずつわる。 $\frac{10h + 5h^2}{h} = \frac{10h}{h} + \frac{5h^2}{h} = 10 + 5h$

こたえ (1) x^7 (2) x^3 (3) x (4) a^3 (5) 1 (6) $10 + 5h$

じぶんでこう5

計算しましょう。(1) $a^2 \times a^5$ (2) $\frac{y^6}{y^4}$ (3) $t^3 \times t^{-2}$ (4) $\frac{b^5}{b}$ (5) t^0
 (6) $\frac{6t^2 + 4t}{2t}$

⚠ まちがえやすいところをチェック

⚠ まちがえやすいところ

文字の項と数の項をまとめてしまう

✕ $2x + 3 = 5x$

○ $2x + 3$ は、これ以上まとめられない

$2x$ と 3 は同類項ではありません。 2m と 3秒 をたせないのと同じ。

⚠ まちがえやすいところ

かっこをはずすとき、うしろの項^{こう}にかけわすれる

✕ $3(x+2) = 3x+2$

○ $3(x+2) = 3x+6$

かっこの外^{そと}の3は、中^{なか}の x にも2にもかけます。長方形^{ちやうほうけい}の図^ず (260 ページ) では、右^{みぎ}の部分^{ぶぶん}の面積^{めんせき}も $3 \times 2 = 6$ です。

⚠ まちがえやすいところ

マイナスのかっこで、うしろの符号^{ふごう}を変えわすれる

✕ $-(x-2) = -x-2$

○ $-(x-2) = -x+2$

-1 を、かっこの中^{なか}のどの項^{こう}にもかけます。 $(-1) \times (-2) = 2$ です。

⚠ まちがえやすいところ

指数^{しすう}をかけてしまう

✕ $x^2 \times x^3 = x^6$

○ $x^2 \times x^3 = x^5$

x を何回^{なんかい}かけたか^{かず}を数^かえると、 $2+3=5$ 回^{かい}です。指数^{しすう}はたします。



ぶつり こうがく つか
物理・工学ではこう使う

単位も、文字と同じように計算する m や s も、文字のように計算できます (2-10)。

文字式	単位	意味
$x \times x = x^2$	$m \times m = m^2$	なが × なが めんせき 長さ×長さで面積
$\frac{x}{t} \times t = x$	$\frac{m}{s} \times s = m$	はや × じ かん みち 速さ×時間で道のり
$\frac{1}{t} = t^{-1}$	$\frac{1}{s} = s^{-1}$	びょう かいすう 1 秒あたりの回数
$3x + 2x = 5x$	$3m + 2m = 5m$	おな たん い 同じ単位どうしはたせる

コンセントの電気は 50 Hz と 60 Hz

コンセントの電気は、向きが行ったり来たりする波を、東日本では 1 秒に 50 回、西日本では 1 秒に 60 回くり返します。この「1 秒あたりの回数」の単位が Hz (ヘルツ) で、 $\text{Hz} = \text{s}^{-1}$ です。Hz も、2-10 の N と同じように、組み立てた単位に名前をつけたものです。大学の本では、m/s を m s^{-1} 、 m/s^2 を m s^{-2} と書きます。 $x^{-1} = \frac{1}{x}$ のやくそくです。



コラム 物理の有名な式も、×をはぶいて書く

「力 = 質量 × 加速度」は $F = ma$ (加速度 a は、1 秒ごとに速さが何 m/s ふえるか。単位は 2-10 の m/s^2)、「電圧 = 抵抗 × 電流」は $V = RI$ (2-15) と書きます。アインシュタインの $E = mc^2$ は、「エネルギー = 質量 × (光の速さ) × (光の速さ)」のことです。 c^2 は $c \times c$ 、 mc^2 は $m \times c \times c$ 。この章のやくそくを知っていれば、物理の本の式が読めるようになります。



しょうまつもんだい
章末問題

2-12 のまとめ

きほん
基本



1 やくそくにしたがって^か書きましょう。

(1) $b \times a \times 4$ (2) $x \times y \times x$ (3) $m \div 2$ (4) $(-1) \times a$ (5) $(x-3) \div 5$

2 まとめましょう。まとめられないときは「まとめられない」と^{こた}答えましょう。

(1) $6x - x$ (2) $2a + 7 - 5a - 3$ (3) $3y + y^2$ (4) $x + 4 + 2x$

3 ^{けいさん}計算しましょう。 (1) $4(3x-2)$ (2) $-(5-2y)$ (3) $(12a+8) \div 4$

4 ^{けいさん}計算しましょう。 (1) $x^4 \times x^3$ (2) $\frac{a^6}{a}$ (3) $x^{-1} \times x^3$ (4) y^0

5 ^{つぎ}次のうち、^{ただ}正しいものをすべて^{えら}選びましょう。


ア $2x + 3x = 5x$

イ $2x + 3y = 5xy$

ウ $x^2 \times x^2 = x^4$


エ $-(a+1) = -a+1$

6 ^{みぎ}右の^{ちようほうけい}長方形の^{めんせき}面積を、^{つか}かっこを使った^{しき}式と、
^{しき}はずした^{とお}式の^{あらわ}2通りで表しましょう。



チャレンジ ★★

- 7 たての長さが h 、面積が $20h + 5h^2$ の長方形があります (右の図)。横の長さを、 h の式で表しましょう。(第5巻では、このような計算で、ボールの速さを求めます。)



- 8 $2(x + 3) - (x - 1)$ を計算しましょう。

- 9 $x^2 \times x^{-2}$ を、指数のきまりで計算しましょう。また、 $x^{-2} = \frac{1}{x^2}$ を使って計算し、2つの答えが同じになることを確かめましょう。

✓ ふりかえり できるようになったかな？

- ☐ ×をはぶき、÷を分数にして、文字式を短く書ける。 → 258 ページ
- ☐ 同類項をまとめたり、かっこをはずしたりできる。 → 259 ページ
- ☐ 指数のきまりを、文字を使って書いて使える。 → 261 ページ



ミナ

文字式を短く書くやくそくがわかったね。次の2-13では、文字に数を入れて、答えを出してみよう。

2-13

公式に数を入れてみよう：代入

この章の先に 2-2 2-10 2-12 この章の先に 2-14 2-16 3-3 5-2 5-3


この章でできるようになること

- ★ 公式の文字に数を代入して、式の値を求められる。
- ★★ 単位ごと代入し、単位をそろえて計算できる。
- ★★ マイナスの数・分数・式を、かっこと代入できる。

？ はてな？

友だちが急に手をはなしたもののさしを、すばやくつかみます。もののさしは、つかむまでに 20 cm 落ちていました。手をはなしてからつかむまでに、何秒かかったのかな？

物が落ちはじめから t 秒間に落ちる距離を x m とすると、 $x = 5t^2$ と表せます。2-0 の「1 秒ごとに約 10 m/s ずつ速くなる」から作れる式です。なぜ 5 なのかは、この章の「もっと知りたい」で確かめます。



公式の文字に数を入れると、答えが出てきます。この章では、公式に数を入れる計算と、そのときに気をつけることを学びます。気をつけることは4つあります。×をもどすこと、単位をそろえること、かっこをつけること、計算の順番を守ることです。

△ やってみよう ものさしキャッチで、反応時間をはかろう

- 1 30 cm のものさしを、0 の目もりを下にして、友だちに持ってもらおう。
- 2 0 の所に指をそえて待ち、友だちが合図なしで手をはなしたら、つかむ。
- 3 つかんだ所の目もり (cm) を読む。5 回やって、表に書こう。
- 4 何 cm なら何秒か、数学の道具①の表で調べよう。

	1 回目	2 回目	3 回目	4 回目	5 回目
つかんだ所 (cm)					
反応時間 (秒)					

ものさしが落ちるとき、まわりの人にあたらないように気をつけよう。

🕒 おもいだそう この章で使う、前に学んだこと

- 2-12 $5t^2$ は $5 \times t \times t$ 。×をはぶいて書いている。
- 2-11 計算の順番：かっこの中が先。×÷は+- より先。
- 2-2 $(-3)^2 = (-3) \times (-3) = 9$ 。マイナスの数を 2 回かけるとプラス。
- 2-10 換算は「1 をかける」。60 s/min は「1 分あたり 60 秒」。
- 2-11 文字は、どんな数でも入る箱。



ソラ

つかむのが速い人ほど、ものさしの小さい目もりの所でつかめるね。
何 cm なら何秒なのか、式で計算してみよう。

コラム 反応時間って、どれくらい？

目で「落ちた！」と見てから、指が動くまでには、少し時間がかかります。目からの知らせが、神経を通して脳にとどき、脳から指の筋肉に命令が行くからです。この時間を**反応時間**といいます。ふつうは、およそ0.15秒から0.3秒です。自動車の運転では、ブレーキをふむまでのこの時間にも車が進むので、車と車のあいだをあけて走ります。



数学の道具

1 文字に数を入れる：代入

②はてな？ のものさしは、何秒で20cm落ちるのでしょうか。まず、0.2秒で何cm落ちるかを計算してみます。 $x = 5t^2$ の t に、0.2 を入れればよいですね。

2-11で、文字は「どんな数でも入る箱」でした。2-12で、 $5t^2$ は $5 \times t \times t$ を短く書いたものでした。そこで、はぶいていた $\times$ をもとにもどして、 t の箱を2つならべます。それぞれの箱に、0.2を入れます。

$$\begin{array}{ccc}
 \boxed{0.2} & & \boxed{0.2} \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 x = 5 \times \boxed{t} \times \boxed{t} & \longrightarrow & x = 5 \times 0.2 \times 0.2
 \end{array}$$

同じ文字には、同じ数を入れる

図1 $\times$ をもどして、 t の箱に0.2を入れる。

同じ文字 t が2回出てくるときは、どちらにも同じ0.2を入れます。同じ式の中の同じ文字は、同じ量（ここでは同じ時間）を表しているからです。

次に、計算します。 0.2×0.2 は、 $2 \times 2 = 4$ で、小数点の下へのけたが合わせて2つなので0.04です ($\frac{2}{10} \times \frac{2}{10} = \frac{4}{100}$ と考えてもよい。2-4)。


$$x = 5 \times 0.2 \times 0.2 = 5 \times 0.04 = 0.2$$

答えの単位は m なので、0.2 m です。cm に直すには、「1 m あたり 100 cm」を表す 100 cm/m をかけます (2-10)。m どうしが約分されて消え、cm が残ります。

$$0.2 \text{ m} \times 100 \text{ cm/m} = 0.2 \cancel{\text{m}} \times \frac{100 \text{ cm}}{1 \cancel{\text{m}}} = 20 \text{ cm}$$

つまり、0.2 秒でちょうど 20 cm 落ちます。

このように、式の文字に数を入れることを代入といい、代入して計算した答えを式の値といいます。代入の手順をまとめると、次のようになります。



なぜ×をもどすの？ ×をもどさずに、 $5t^2$ の t のところにそのまま 0.2 を書くと、「 50.2^2 」になってしまいます。これでは、「50.2 の 2 乗」と読めてしまいますね。 $5t$ に $t = 3$ を入れて「53」と書くと、五十三になってしまいます。文字のときははぶいてよかった×も、数を入れたら必ずもどします。

なぜ2乗を先に計算するの？ 5×0.2^2 の「2」は、すぐ前の 0.2 だけについています。 $5t^2$ は $5 \times t \times t$ で、2 回かけるのは t だけだからです。だから、2 乗は「 $t \times t$ のひとまとまり」として、×÷より先に計算します。もし 5×0.2 を先にして $(5 \times 0.2)^2 = 1^2 = 1$ とすると、1 m、つまり 100 cm 落ちたことになります。30 cm のものさしでは、ありえませんね。

計算の順番：かっこの中 → 2 乗などの累乗 → ×÷ → +-

同じように、 t にいろいろな数を代入して、表を作りましょう。時間を 0.02 秒ずつふやしています。電卓を使ってもかまいません。

時間 t (秒)	0.10	0.12	0.14	0.16	0.18	0.20	0.22	0.24
$5t^2$ (m)	0.05	0.072	0.098	0.128	0.162	0.2	0.242	0.288
落ちた長さ (cm)	5	7.2	9.8	12.8	16.2	20	24.2	28.8

表1 $x = 5t^2$ に t を代入して作った表 (cm の行は、m の行に 100 cm/m をかけた)

？はてな？ の答えは、20 cm 落ちたから **0.2 秒** です。表を見ると、時間が 0.10 秒から 0.20 秒へ 2 倍になると、落ちた長さは 5 cm から 20 cm へ 4 倍になっています。2 乗があるので、 $2 \times 2 = 4$ 倍になるのです (2-15 でくわしく)。表の数をものさしに書きこむと、反応時間をすぐに読める「反応時間ものさし」ができます。




図2 反応時間ものさし。上の黒い数は cm、下の赤い数は秒。赤い線の間隔は、下 (0 の方) ほどせまい。

赤い線は、同じ 0.02 秒ずつなのに、右へ行くほど間隔が広がっています。落ちるものさしは、だんだん速くなるからです。

もっと知りたい ★★


なぜ $x = 5t^2$ なの？

落ちはじめの速さは0です。1秒ごとに約10 m/s ずつ速くなるので(2-0)、 t 秒後の速さは $10 \times t$ (m/s) です。速さは同じ割合でふえるので、0秒から t 秒までの平均の速さ(2-6)は、はじめの0とおわりの $10t$ の、ちょうどまんなかです。

$$(0 + 10t) \div 2 = 5t \text{ (m/s)}$$

道のり = 速さ $\times$ 時間 (2-3) なので、 $x = 5t \times t = 5t^2$ 。5は、10の半分だったのです。

右のグラフは $t = 2$ のときです。色の三角の面積が落ちた距離を表します(速さが変わるときもグラフの面積が道のりになることは、5-9で確かめます)。三角の面積は、高さを半分の10にした長方形(点線)と同じで、 $10 \times 2 = 20$ (m)。 $5 \times 2^2 = 20$ と合います。ほんとうは1秒ごとに9.8 m/s ずつ速くなるので、くわしい式はその半分の $4.9t^2$ です(5-5)。



2 単位ごと代入する

$x = vt$ (道のり = 速さ $\times$ 時間) に、 $v = 5 \text{ m/s}$ 、 $t = 4 \text{ s}$ を代入します。数だけでなく、単位もいっしょに代入してみましょう。

$$x = 5 \text{ m/s} \times 4 \text{ s} = (5 \times 4) \frac{\text{m}}{\cancel{\text{s}}} \times \cancel{\text{s}} = 20 \text{ m}$$

数は数どうし ($5 \times 4 = 20$)、単位は単位どうしで計算します (2-10)。m/s は $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ なので、s をかけると分母の s と約分されて消え、m が残ります。道のりの単位 m になったので、式の使い方が正しそうですとわかります。

単位がそろっていないとき 時間が「2 分」のときは、どうでしょう。数だけを入れて $5 \times 2 = 10$ とすると、まちがいです。単位をつけて入れると、 $5 \text{ m/s} \times 2 \text{ min}$ となり、秒 (s) と分 (min) で単位がそろっていないことに気づけます。s と min は約分できないので、m だけが残りません。

そこで、先に 2 分を秒に換算します。2-10

で学んだように、1 分の中には 60 秒があります。

「1 分あたり 60 秒」は単位つきの

量で、 60 s/min と書きます (min は

minute、s は second の頭文字)。60 s と

1 min は同じ長さなので、 $\frac{60 \text{ s}}{1 \text{ min}}$ は 1 と

同じです。1 をかけても、量は変わりま

せん。




図3 1 分の中に、60 秒がならぶ。

$$2 \text{ min} \times 60 \text{ s/min} = 2 \text{ min} \times \frac{60 \text{ s}}{1 \text{ min}} = 120 \text{ s}$$

min どうしが約分されて消え、s が残りました。これで単位がそろったので、代入します。

$$x = 5 \text{ m/s} \times 120 \text{ s} = 600 \text{ m}$$

反対に、秒を分に直すときは、 60 s/min でわります。120 s の中に、60 秒のまとまり (1 分) がいくつあるかを求めるのです。

$$120 \text{ s} \div 60 \text{ s/min} = 120 \text{ s} \times \frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}} = 2 \text{ min}$$

時間・分・秒の換算に使う量は、次の 3 つです (h は hour の頭文字)。どれも「1 あたり」の量です。

単位つきの量	意味	なぜその数？
60 s/min	1 分あたり 60 秒	1 分は 60 秒と決めた
60 min/h	1 時間あたり 60 分	1 時間は 60 分と決めた
3600 s/h	1 時間あたり 3600 秒	$60 \times 60 = 3600$

表2 時間の換算に使う量 (2-10)

長さなら、100 cm/m (1 m あたり 100 cm) や 1000 m/km (1 km あたり 1000 m) を使います。

式の中の数にも単位がある $x = 5t^2$ の 5 にも、じつは単位があります。 x は m、 t^2 は $s \times s = s^2$ なので、5 の単位が m/s² (2-10) なら、両側の単位が合います。単位ごと代入して確かめましょう。

$$5 \text{ m/s}^2 \times (0.2 \text{ s})^2 = 5 \text{ m/s}^2 \times 0.04 \text{ s}^2 = 0.2 \text{ m}$$

s² が約分されて消えて、m が残りました。

③ マイナスの数・分数は、かっこをつけて代入する

$2x^2$ に $x = -3$ を代入します。 $2x^2$ は $2 \times x \times x$ なので、 x の箱 2 つに -3 をまるごと入れます。 -3 は「マイナス」と「3」に分けられない 1 つの数なので、かっこでひとまとまりにして入れます。

$$2x^2 = 2 \times (-3)^2 = 2 \times (-3) \times (-3) = 2 \times 9 = 18$$

$(-3) \times (-3) = 9$ は、マイナスどうしのかけ算でプラスになるからです (2-2)。

かっこをつけないと？ かっこをつけずに 2×-3^2 と書くと、2 つおかしいことがおきます。1 つめは、 $\times$ と $-$ がならんで、ひき算なのかマイナスの数なのかかわからないことです。2 つめは、2 乗の「2」が、すぐ前の 3 だけにつくことです。数学では、 -3^2 は「 3^2 にマイナスをつけたもの」、つまり $-(3 \times 3) = -9$ と読むやくそくです。これで計算すると $2 \times (-9) = -18$ となり、正しい 18 とちがってしまいます。

か 書き方	い 意味	あたい 値
$(-3)^2$	$(-3) \times (-3)$	9
-3^2	$-(3 \times 3)$	-9

表3 ひょう 3 かつこがあるかないかで、あたい 値がちがう。

ぶんすう 分数を2乗するとき ぶんすう 分数も、かつこをつけて


だいにゆう 代入します。 $2x^2$ に $x = \frac{1}{2}$ をだいにゆう 代入すると、

$$2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 2 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = 2 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ は、みぎ ず たし 右の図で確かめられます。1 辺 1

のせいほうけい 正方形のたてとよこ 横をはんぶん 半分にすると、4 つに分けた1 つぶん 分になります (2-4)。かつこがないと、 $\frac{1^2}{2}$

とくべつ 区別がつきません。



おんど 温度の換算 かんさん アメリカでは、おんど 温度を°F (かし 華氏) であらわ 表します。にほん 日本でつか 使う°Cと°Fでは、め 目もりの0のい 位置も、め 目もりのおお 大きさもちがいます。した 下の図のように、みず 水がこおるおんど 温度は0°Cで32°F、みず 水がふっとうするおんど 温度は100°Cで212°Fです。




図4 ず 4 うえ 上が°C、した 下が°F。°Cが10ふえるごとに、°Fは18ふえる。

- 1 °Cの0から100までは、°Fでは32から212までです。°Fのめ 目もりのかず 数は、 $212 - 32 = 180$ です。°Cの100め 目もりが、°Fの180め 目もりにあたるのです。

- ② だから、℃の1目もりは、°Fの $180 \div 100 = 1.8$ 目もりにあたります。図でも、℃が10ふえると°Fは18ふえています。 C ℃なら、0℃のところから°Fの目もりが $1.8 \times C$ だけ進みます。
- ③ °Fの目もりは、0℃のところで、すでに32です。だから、最後に32をたします。

これで、℃の温度 C から°Fの温度 F を求める式、 $F = 1.8C + 32$ ができました。確かめると、 $C = 100$ なら $1.8 \times 100 + 32 = 212$ で、ふつとうする温度と合います。

この式に $C = -10$ を代入します。マイナスの数なので、かっこをつけます。計算の順番は「×が+より先」です。

$$F = 1.8 \times (-10) + 32 = -18 + 32 = 14$$

-10℃は14°Fです。図の目もりの左はしとも合っています。

④ 式を、かっこと入れる

文字には、数だけでなく、式も代入できます。たとえば、「1秒より、ほんの少しあと」の落ちた距離を考えます。その「少し」を h 秒とすると、時間は $1 + h$ 秒です。 h には、0.1や0.01など、いろいろな数が入ります。 $x = 5t^2$ の t に $1 + h$ を代入すれば、その距離が表せます。

$$x = 5 \times \boxed{(1 + h)}^2$$

↓

文字は「数を入れる箱」でした。 $1 + h$ は、2つの数をたしたひとまとまりの時間なので、かっこをつけて、まるごと箱に入れます。

$$x = 5(1 + h)^2$$

かっこと入れるのが代入です。

正しいことを、数で確かめる $h = 0.1$ として、2つのやり方で計算してみます。

かっこごとに入れた式	$5(1 + 0.1)^2 = 5 \times 1.1^2 = 5 \times 1.21 = 6.05$
はじめから $t = 1.1$	$5 \times 1.1^2 = 5 \times 1.21 = 6.05$ おなじ！
かっこをつけない	$5 \times 1 + 0.1^2 = 5 + 0.01 = 5.01$ ちがう！

表4 $h = 0.1$ のとき。かっこをつけないと、ちがう値になる。

かっこをつけずに $5 \times 1 + h^2$ とすると、2乗が h だけにかかり、5も1だけにかかってしまいます。別の式になってしまうのです。第5巻では、この $5(1 + h)^2$ を使って、1秒後のボールの速さを計算します。

5 代入をくり返して、はさんで調べる

ものさしを 15 cm の所でつかんだ人の反応時間は、何秒でしょう。表には 15 cm がありません。そこで、時間を少しずつ変えて代入し、15 cm (0.15 m) をはさむ2つの時間を探します (2-8で、 $\sqrt{2}$ をはさんだのと同じ考え方です)。

時間 t (秒)	0.16	0.17	0.18
$5t^2$ (m)	0.128	0.1445	0.162
0.15 m とくらべて	小さい	小さい	大きい

表5 0.17秒と0.18秒のあいだで、0.15 m をこえる。

0.17秒ではまだ0.15 m にとどかず、0.18秒ではこえています。だから、反応時間は0.17秒と0.18秒のあいだです。もっとくわしく知りたければ、0.171、0.172、…と代入を続けます。代入だけでも、ほしい量にいくらでも近づけるのです。ただ、何回も計算するのは大変ですね。1回の計算で直接求める方法は、2-14で学びます。

たいせつ

代入：文字に数を入れること。はぶいていた×をもどして計算する。

計算の順番は、かっこの中→累乗→ $\times \div \rightarrow + -$ 。

単位ごと代入する。そろっていないときは、60 s/min などをかけて（わつて）そろえてから。

マイナスの数・分数は、かっこをつけて代入する。

式も、かっことと入れる。かっことと入れるのが代入。

 この章で出てきたことば

代入 式の文字に、数や式を入れること。

式の値 代入して計算した答え。 $x = 3$ のとき、 $2x + 1$ の値は 7。

華氏 (°F) アメリカなどで使う温度の表し方。 $F = 1.8C + 32$

 記号カード

初めて出た章 2-13

°F

読み方 かしど
意味 温度の単位。水がこおる
温度が 32°F、ふつとうする
温度が 212°F。
英語 degree Fahrenheit

例題でたしかめよう

例題1 代入して、式の値を求める

$x = 4$ のときの式の値は？ (1) $3x + 5$ (2) $x^2 - 2x$ (3) $\frac{12}{x}$

考え方 はぶいていた×をもどして、 x に4を入れます。計算の順番は、
累乗 $\rightarrow \times \div \rightarrow + -$ です。

しき (1) $3 \times 4 + 5 = 12 + 5 = 17$ ×を先に

(2) $4^2 - 2 \times 4 = 16 - 8 = 8$ 2乗と×を先に

(3) $\frac{12}{4} = 12 \div 4 = 3$ 分数はわり算 (2-4)

こたえ (1) 17 (2) 8 (3) 3

例題2 時間の単位をそろえて代入する

自転車が 6 m/s で3分走りました。 $x = vt$ を使って、進んだ道のりを求めましょう。

考え方 速さは「1秒あたり」なので、時間も秒にそろえます。3分に 60 s/min をかけると、minが約分されてsになります。

しき $3 \text{ min} \times 60 \text{ s/min} = 180 \text{ s}$

$x = 6 \text{ m/s} \times 180 \text{ s} = 1080 \text{ m}$ sが約分されてm

こたえ 1080 m

じぶんでとこう 1

$a = 5$ のときの式の値は？

(1) $4a - 3$ (2) $a^2 + a$ (3) $\frac{30}{a}$

じぶんでとこう 2

電車が 20 m/s で 2 分走りまし
た。 $x = vt$ を使って、進んだ道
のりを求めましょう。

例題 3 長さの単位をそろえて代入する

長方形の花だんの面積は $S = ab$ (たて $\times$ 横) です。たてが $a = 80 \text{ cm}$ 、
横が $b = 2 \text{ m}$ のとき、面積を cm^2 で求めましょう。

考え方 面積を cm^2 で求めるので、長さを cm にそろえます。 2 m に
 100 cm/m をかけます。

しき $2 \text{ m} \times 100 \text{ cm/m} = 200 \text{ cm}$ m が約分されて cm

$$S = 80 \text{ cm} \times 200 \text{ cm} = 16000 \text{ cm}^2 \quad \text{cm} \times \text{cm} = \text{cm}^2$$

こたえ 16000 cm^2

例題 4 マイナスの数・分数を代入する

次の式の値を求めましょう。

(1) $x = -2$ のとき $3x^2$ (2) $x = \frac{1}{3}$ のとき $6x + 1$

(3) $a = -4$ のとき $5 - a$ と $-a^2$

(4) $F = 1.8C + 32$ で、 $C = -5$ のときの F

考え方 マイナスの数・分数には、かっこをつけて代入します。 $-a^2$ は「 a^2 にマイナスをつけたもの」です。

しき (1) $3 \times (-2)^2 = 3 \times 4 = 12$

(2) $6 \times \frac{1}{3} + 1 = 2 + 1 = 3$

(3) $5 - (-4) = 5 + 4 = 9$ (マイナスをひく＝プラスをたす。2-2)

$-(-4)^2 = -\{(-4) \times (-4)\} = -16$ (2乗が先)

(4) $F = 1.8 \times (-5) + 32 = -9 + 32 = 23$

こたえ (1) 12 (2) 3 (3) 9、-16 (4) 23

じぶんでこう 3

長方形の板の、たてが 30 cm、横が 1.2 m です。 $S = ab$ に単位をそろえて代入し、面積を cm^2 で求めましょう。

じぶんでこう 4

次の式の値を求めましょう。

(1) $x = -3$ のとき $x^2 + 2x$

(2) $x = \frac{1}{2}$ のとき $4x^2$

(3) $a = -3$ のとき $2 - a$ と $-a^2$

(4) $F = 1.8C + 32$ で、 $C = -15$ のときの F

例題5 式をカッコごと代入する

- (1) $y = 3x + 2$ の x に $a + 1$ を代入して、式を簡単にしましょう。
 (2) $x = 5t^2$ の t に $2 + h$ を代入した式を書き、 $h = 0.1$ のときの値を求めましょう。

考え方 式はひとまとまりにして、カッコごと代入します。

- しき** (1) $y = 3(a + 1) + 2$ x の所に $(a + 1)$ を書く
 $= 3a + 3 + 2$ 分配法則でかっこをはずす (2-12)
 $= 3a + 5$ 数どうしをまとめる
 (2) $x = 5(2 + h)^2$ t の所に $(2 + h)$ を書く
 $h = 0.1$ のとき、 $5 \times (2 + 0.1)^2 = 5 \times 2.1^2 = 5 \times 4.41 = 22.05$

こたえ (1) $y = 3a + 5$ (2) $x = 5(2 + h)^2$ 、22.05

例題6 代入をくり返して、はさんで調べる

アメリカの天気予報で「気温は 80°F 」と言っていました。 $F = 1.8C + 32$ の C に 26 と 27 を代入して、 80°F が何 $^\circ\text{C}$ と何 $^\circ\text{C}$ のあいだか調べましょう。

考え方 代入して出た $^\circ\text{F}$ を、80 とくらべます。80 より小さい値と大きい値が出たら、そのあいだです。

しき $C = 26$ のとき $F = 1.8 \times 26 + 32 = 46.8 + 32 = 78.8$
 $\rightarrow$ 80 より小さい

$C = 27$ のとき $F = 1.8 \times 27 + 32 = 48.6 + 32 = 80.6$
 $\rightarrow$ 80 より大きい

こたえ 26°C と 27°C のあいだ

じぶんでとこう5

(1) $y = 2x - 1$ の x に $b + 3$ を代入して、式を簡単にしましょう。

(2) $x = 5t^2$ の t に $3 + h$ を代入した式を書き、 $h = 0.1$ のときの値を求めましょう。

じぶんでとこう6

「気温は 60°F 」でした。
 $F = 1.8C + 32$ の C に
 15 と 16 を代入して、 60°F が
 何 $^{\circ}\text{C}$ と何 $^{\circ}\text{C}$ のあいだか調べま
 しょう。

例題7 いろいろな公式に、単位ごと代入する

(1) 円周 = 直径 $\times$ 円周率 (2-9) を、円周を ℓ (エル)、直径を d として $\ell = \pi d$ と書きます。直径 50 cm のタイヤの円周を求めましょう ($\pi = 3.14$)。

(2) 正方形の面積は $S = a^2$ (1 辺 $\times$ 1 辺) です。1 辺が 1.5 m の正方形の面積を求めましょう。

考え方 π はただの数 (3.14) で、単位はありません。 a^2 は $a \times a$ なので、単位も 2 回かけます。

しき (1) $\ell = 3.14 \times 50 \text{ cm} = 157 \text{ cm}$ 単位は cm のまま

(2) $S = (1.5 \text{ m})^2 = 1.5 \text{ m} \times 1.5 \text{ m} = 2.25 \text{ m}^2$ $\text{m} \times \text{m} = \text{m}^2$

こたえ (1) 157 cm (2) 2.25 m^2

じぶんでとこう7

(1) 直径 20 cm のお皿のふちの長さ (円周) を、 $\ell = \pi d$ で求めましょう ($\pi = 3.14$)。 (2) 1 辺が 0.4 m の正方形のタイルの面積を、 $S = a^2$ で求めましょう。

⚠ まちがえやすいところをチェック

⚠ まちがえやすいところ

×をもどしわすれる

✗ $v = 5$ 、 $t = 4$ のとき、 $vt = 54$

○ $v = 5$ 、 $t = 4$ のとき、 $vt = 5 \times 4 = 20$

vt は $v \times t$ のこと。数を入れたら、×をもどします。54 は「五十四」になってしまいます。

⚠ まちがえやすいところ

2 乗より先に、かけ算をする

✗ $t = 3$ のとき、 $5t^2 = (5 \times 3)^2 = 15^2 = 225$

○ $t = 3$ のとき、 $5t^2 = 5 \times 3^2 = 5 \times 9 = 45$

2 乗がかかっているのは t だけ。2 乗を先に計算します。

⚠ まちがえやすいところ

マイナスの数に、かっこをつけない

✗ $x = -3$ のとき、 $x^2 = -3^2 = -9$

○ $x = -3$ のとき、 $x^2 = (-3)^2 = (-3) \times (-3) = 9$

-3^2 は $-(3 \times 3)$ のこと。 -3 を2回かけるには、かっこがいます。

⚠ まちがえやすいところ

$-a^2$ と $(-a)^2$ をまちがえる

✗ $a = 2$ のとき、 $-a^2 = (-2)^2 = 4$

○ $a = 2$ のとき、 $-a^2 = -(2 \times 2) = -4$

$-a^2$ の2乗は a だけにかかります。 a に2を入れて $-(2^2)$ です。

⚠ まちがえやすいところ

単位をそろえずに代入する

✗ 5 m/s で2分進むと、 $5 \times 2 = 10 \text{ m}$

○ $2 \text{ min} \times 60 \text{ s/min} = 120 \text{ s}$ にして、 $5 \text{ m/s} \times 120 \text{ s} = 600 \text{ m}$

単位ごと書けば、 m/s と min で s が消えないことに気づけます。

⚠ まちがえやすいところ

しき
式に、かっこをつけない

✕ $5t^2$ の t に $1+h$ を代入して、 $5 \times 1 + h^2$

○ $5t^2$ の t に $1+h$ を代入して、 $5(1+h)^2$

かっこがないと、 $1+h$ の一部にしか 2 乗がかかりません。 $h = 0.1$ で確かめると、5.01 と 6.05 でちがいます。

🔗 物理・工学ではこう使う

くるま なん はし
車の「あと何 km 走れる」

くるま
車のメーターには、「あと何 km 走れるか」が
ひょうじ
表示されます。車のコンピュータは、タンクに
のこ
残っているガソリンの量 a (L) と、1 L で走れ
る距離 f (km/L) をはかり、

$$d = af$$

だいにゆう
に代入して、走れる距離 d (distance) を計算
しています。単位ごと代入すると、

$$d = 20 \text{ L} \times 15 \text{ km/L} = 300 \text{ km}$$

L が約分されて消え、km が残ります。

ガソリンがへると a が変わり、走り方で f も変わります。コンピュータは、新しい数を何度も代入しなめて、表示を変えています。天気予報のコンピュータも、空気の温度や風の速さを、たくさんの式に次々に代入して、明日の天気を計算しています。式は、数を入れかえれば何度でも使える「計算の道具」なのです。

あと走れる距離

300 km

ガソリンの量

コラム °Fの目もりは、どう決めた？

300年ほど前、科学者のファーレンハイトは、氷と塩をまぜて作った、とても冷たい温度を0とし、人の体温をおよそ96とする目もりを作りました。これが°F(華氏)のもとです。のちに、水がこおる温度を32°F、ふつとうする温度を212°Fと決め直しました。体温に近い37°Cを $F = 1.8C + 32$ に代入すると、 $1.8 \times 37 + 32 = 98.6$ で、およそ99°Fです。日本の°Cは、スウェーデンの科学者セルシウスが考えた目もりがもとで、水がこおる温度とふつとうする温度のあいだを100に分けています。



しょうまつもんだい 章末問題

2-13 のまとめ

基本



1 $x = 3$ のときの、式の値を求めましょう。

(1) $4x - 7$ (2) $x^2 + 1$ (3) $\frac{18}{x}$ (4) $2x^2$

2 式の値を求めましょう。

(1) $a = -2$ のとき ア $5a$ イ a^2 ウ $3 - a$ エ $-a^2$

(2) $a = \frac{1}{4}$ のとき ア $8a$ イ $16a^2$

3 あるひとが1.5 m/sで4分歩きました。 $x = vt$ に単位ごと代入して、歩いた道のりを求めましょう。

4 $F = 1.8C + 32$ を使って、次の温度を°Fで表しましょう。

(1) 25°C (2) -20°C

5 $y = 3x - 4$ の x に $t - 2$ を代入して、式を簡単にしましょう。


6 長方形の面積は $S = ab$ です。たてが $a = 4 \text{ cm}$ 、横が $b = 0.5 \text{ m}$ のとき、単位をそろえてから代入して、面積を cm^2 で求めましょう。

チャレンジ ★★

7 ものさしキャッチ ($x = 5t^2$) で、反応時間が 0.15 秒の人は、ものさしの何 cm の所でつかめますか。

8 $x = 5t^2$ の t に $1 + h$ を代入した式で、 $h = 0.01$ のときの値を求めましょう。また、 $h = 0.1$ のとき (6.05) とくらべて、5 に近づいたか遠ざかったかを答えましょう。

9 アメリカの天気予報で「今日の最高気温は 100°F 」と言っていました。 $F = 1.8C + 32$ の C に 37 と 38 を代入して、 100°F が何 $^\circ\text{C}$ と何 $^\circ\text{C}$ のあいだか調べましょう。右の温度計の、左は $^\circ\text{C}$ 、右は $^\circ\text{F}$ の目もりです。



✓ ふりかえり できるようになったかな？

- ☐ 公式の文字に数を入れて、式の値を求められる。 → 274 ページ
- ☐ 単位ごと代入し、単位をそろえて計算できる。 → 277 ページ
- ☐ マイナスの数・分数・式を、かっこごと代入できる。 → 279 ページ



デルタ

100 $^\circ\text{F}$ が何 $^\circ\text{C}$ かを、37 と 38 を代入して、はさんで調べたね。式を変形すれば、ほしい量を直接とり出せるよ。次の 2-14 で学ぼう。

2-14

式を変形して、 ほしい量を取り出そう

道しるべ この章の前に 2-3 2-11 2-12 2-13 この章の先に 2-15 2-16 3-6 5-0

この章でできるようになること

- ★★ 等式の両辺に同じ数をたす・ひく・かける・わっても、等式が成り立つことを、天びんで説明できる。
- ★★ $x = vt$ を、 $t = \frac{x}{v}$ や $v = \frac{x}{t}$ に変形できる。
- ★★ 移項を使い、1行ずつ使ったきまりを書きながら式を変形できる。

? はてな?

家から駅まで 1200 m あります。自転車で秒速 4 m (4 m/s) で走ると、何秒かかるかな? 何分かな?

2-11 で、「道のり=速さ×時間」を $x = vt$ と書きました。でも、この式は道のりを求める形です。時間を求める式と、速さを求める式は、べつべつに覚えなないといけなないのかな?

道のりを求める

$$x = vt$$

時間を求める

$$t = ?$$

速さを求める

$$v = ?$$

図1 公式は、3つ覚えるの? それとも1つから作れる?

△ やってみよう てんびんで、ねんど玉の重さを知ろう

1 円玉は、1 枚がちょうど 1g です。これをおもりにして、重さのわからないねんど玉の重さを調べます。理科室の上皿てんびんか、ハンガーと紙コップで作ったてんびんを使います。

① 左の皿に、ねんど玉と 1 円玉 3 枚を

のせよう。


② 右の皿に 1 円玉を 1 枚ずつのせて、つり合う枚数をさがそう。

③ 両方の皿から、1 円玉を 3 枚ずつとろう。てんびんは、どうなるかな？

④ 右の皿に残った 1 円玉は何枚かな？

ねんど玉は何 g かな？

右に 11 枚のせたところで、つり合ったとします。両方の皿から同じ枚数をとると、つり合いはくずれぬかな？



🕒 思い出そう この章で使う、前に学んだこと

2-11 道のり = 速さ × 時間。文字で書くと $x = v \times t$ (x 道のり、v 速さ、t 時間)

2-12 × は省いて vt と書く。÷ は分数で書く： $x \div v = \frac{x}{v}$

2-13 代入： $x = vt$ に $v = 5$ 、 $t = 4$ を入れると、 $x = 5 \times 4 = 20$

2-4 分子と分母を同じ数でわる (約分)： $\frac{12}{8} = \frac{3}{2}$

1-14 0 でわることはできない。




図 2 てんびんと「＝」は、同じことを表している。



ミナ

両方から同じだけとっても、つり合ったままだね。このことを式で書くと、どうなるのかな？

数学の道具

1 等式は天びん

2-13 では、式に数を代入して、答えを求めました。この章では反対に、答えのほうにわかっていて、式の中のわからない数を求めます。手がかりは天びんです。

やってみようの天びんを、式で書いてみましょう。ねんど玉の重さはわからないので、 x g とします (2-11: わからない数も文字で書ける)。左の皿は、ねんど玉と1円玉3枚なので $x + 3$ (g)、右の皿は1円玉11枚なので 11 (g) です。つり合っているので、左と右は同じ重さです。だから、 $x + 3 = 11$ と書けます。

このように、「 $=$ 」で結んだ式を等式といいます。「 $=$ 」の左の式を左辺、右の式を右辺、2つをあわせて両辺といいます。「辺」は、ここでは「がわ」という意味です。




図3 両方の皿から同じ3gをとっても、つり合ったまま。

両方から3枚ずつとっても、天びんはつり合ったままです。同じ重さのものから、同じ重さをとったのだから、残りも同じ重さのはずですね。式では、両辺から3をひいたことになります。

$$x + 3 - 3 = 11 - 3$$

左辺は、3をたしてから3をひいたので、 x だけが残ります。右辺は $11 - 3 = 8$ です。だから $x = 8$ 。ねんど玉は8gです。

確かめてみましょう。 $x = 8$ を $x + 3 = 11$ に代入すると (2-13)、 $8 + 3 = 11$ で、両辺が等しくなります。答えは正しいとわかります。

たす・かける・わるも同じ ひくだけでなく、たす・かける・わるも、両方の皿に同じことをすれば、つり合ったままです。8gのねんど玉で、確かめてみましょう。




図4 両方の皿に同じことをすれば、つり合ったまま。

いちばん下の「わる」を見てください。左にねんど玉3個、右に1円玉24枚でつり合っています ($3x = 24$)。左を3つに分けると、1つ分はねんど玉1個。

右も3つに分けると、1つ分は $24 \div 3 = 8$ 枚。同じ重さを同じ数に分けたので、1つ分どうしも同じ重さです。だから $x = 8$ です。

すること	てん 天びんでは	しき 式では ($A = B$ のとき)
たす	りょうほう おな おも 両方に同じ重さをのせる	$A + C = B + C$
ひく	りょうほう おな おも 両方から同じ重さをとる	$A - C = B - C$
かける	りょうほう おな かず ばい 両方を同じ数の倍にする	$AC = BC$
わる	りょうほう おな かず わ 両方を同じ数に分けて、1つ分にする	$\frac{A}{C} = \frac{B}{C}$ (C は 0 でない)

ひょう 表1 等式の性質 (A 、 B 、 C には、どんな数や式が入ってもよい)

この4つのきまりを、**等式の性質**といいます。0でわることはできないので(1-14)、わる数は0でない数にします。0に分けることは、できませんね。また、天びんを反対がわから見てもつり合っているように、左辺と右辺を入れかえてもかまいません。

片方だけにすると？ 右の皿からだけ3枚とると、右が軽くなって天びんはかたむきます。式でも、 $x + 3 = 11 - 3$ は $x + 3 = 8$ になってしまい、 $x = 8$ を代入すると $11 = 8$ でまちがいです。必ず両辺に同じことをします。

② $x = vt$ から、時間を求める式を作る

② はてな？ の自転車で、かかる時間を t 秒とします。 $x = vt$ に、わかっている $x = 1200$ と $v = 4$ を代入すると(2-13)、

$$1200 = 4t$$


となります。 $4t$ は $4 \times t$ 、つまり「 t の4つ分」です。これが1200と等しいのです。この t を、2つのやり方で求めてみます。

テープ図で t のテープを4本つなぐ

と、1200の長さになります。4本は同じ

長さなので、1本分は $1200 \div 4 = 300$

です。



てん 天びんで t だけを残すために、^{のこ}両辺を 4 でわります。等式の性質の図の「わる」と同じです。

$$\frac{1200}{4} = \frac{4t}{4} \quad \text{だから} \quad 300 = t$$

$\frac{4t}{4}$ が t になるのは、 t を 4 倍してから 4 でわると、もとの t にもどるからです (分子と分母の 4 を約分した、と考えてもよい。2-4)。

たんい 単位もつけると 単位ごと計算すると (2-13)、

$$t = \frac{1200 \text{ m}}{4 \text{ m/s}} = 300 \text{ s}$$

となります。m を m/s でわると、なぜ s になるのでしょうか。4 m/s は「1 秒あたり 4 m」です。1200 m の中に 4 m がいくつあるかを数えると 300 こで、その 1 こ 1 こに 1 秒ずつかかるので、300 秒です。分に直すには、60 s/min でわります (2-13)。

$$300 \text{ s} \div 60 \text{ s/min} = 300 \cancel{\text{s}} \times \frac{1 \text{ min}}{60 \cancel{\text{s}}} = 5 \text{ min}$$

いえ 家から駅まで、300 秒、つまり 5 分かかります。

もじ 文字のまま、^{おな}同じ変形をする ^{しき}式を変えていくことを、^{しき}式の変形といいます。1 行に 1 つのきまりだけを使い、使ったきまりを右に書きます。数が変わっても、することは「^{りょうへん}両辺を速さでわる」で同じです。そこで、^{かず}数を入れる前の文字のまま、^{おな}同じ変形をしてみましょう (表の右)。

^{かず} 数で	^{もじ} 文字で	^{ぎょう} この行で使ったきまり
$1200 = 4t$	$x = vt$	
$\frac{1200}{4} = \frac{4t}{4}$	$\frac{x}{v} = \frac{vt}{v}$	^{りょうへん} 両辺を 4 (v) でわる
$300 = t$	$\frac{x}{v} = t$	^{けいさん} 計算する (v を約分)
$t = 300$	$t = \frac{x}{v}$	^{さへん} 左辺と ^{うへん} 右辺を入れかえる

^{ひょう}表 2 ^{かず}数でも^{もじ}文字でも、^{おな}同じ変形をする。

$\frac{vt}{v}$ は、分子にも分母にも同じ v があるので、 $\frac{4t}{4}$ と同じように約分でき、 t になります。「時間＝道のり÷速さ」の式ができました。 $x = 1200$ 、 $v = 4$ を代入すると $t = 300$ で、数で解いた答えと同じです。なお、 v でわるので、 v は 0 ではないとします。速さが 0 (止まっている) なら、いつまでも駅に着きませんね。同じように、 $x = vt$ の両辺を t でわれば、 $\frac{x}{t} = \frac{vt}{t} = v$ なので、 $v = \frac{x}{t}$ (速さ＝道のり÷時間) もできます。2-3 で学んだ「速さ＝道のり÷時間」と同じです。




図 5 1 つの式から、のこりの 2 つの式が作れる。

② はてな? の答え：300 秒 (5 分) かかります。そして、公式は $x = vt$ の 1 つだけ覚えておけば、のこりの 2 つは、等式の性質でいつでも作れます。

$t = \frac{x}{v}$ のように、ほしい量が左辺に 1 つだけある形にすることを、その量について解くといいます。 $t = \frac{x}{v}$ は、 $x = vt$ を t について解いた式です。解いた式があれば、2-13 のように何回も代入してはさまなくても、1 回の代入で答えが出ます。

③ 移項：たす・ひくを 1 行で

数学の道具 1 (296 ページ) では、 $x + 3 = 11$ の両辺から 3 をひきました。その 3 行を、ならべてみます。

$x + 3 = 11$		
$x + 3 - 3 = 11 - 3$	両辺から 3 をひく	
$x = 11 - 3$	左辺は $+3 - 3 = 0$ で、 x だけ残る	

1 行目と 3 行目だけをくらべてみましょう。

$$x + 3 = 11$$

$$x = 11 - 3$$

左辺の $+3$ が「 $=$ 」をこえて

右辺にうつると、 -3 になる

図6 移項。「 $=$ 」の向こうへうつすと、符号が反対になる。

左辺にあった $+3$ が消えて、右辺に -3 が出てきたように見えます。このように、等式の一方の辺にある項（2-12）を、符号を変えてもう一方の辺にうつすことを、**移項**といいます。移項は、新しいきまりではありません。「両辺から同じ数をひく（たす）」を、まん中の行を書かずに1行で書いたものです。

マイナスの項の移項 $x - 5 = 7$

では、両辺に 5 をたします。

$-5 + 5 = 0$ なので、左辺は x だけ

になります。 -5 を移項すると $+5$

になる、ということです。 $x = 12$

を代入すると $12 - 5 = 7$ で、正し

いとわかります。

$$x - 5 = 7$$

$$x - 5 + 5 = 7 + 5$$

$$x = 12$$

両辺に 5 をたす

$$-5 + 5 = 0$$

移項とわり算を続けて使う 1個 3g のビーズを、 5g の箱に x 個入れると、全体の重さは $y = 3x + 5$ (g) です（ビーズ x 個で $3 \times x\text{g}$ 、それに箱の 5g をたす）。重さから個数がわかるように、 x について解きます。

$$y = 3x + 5$$

$$y - 5 = 3x$$

$$\frac{y - 5}{3} = x$$

$$x = \frac{y - 5}{3}$$

$+5$ を移項

両辺を 3 でわる

入れかえる

$$x \xrightarrow{\times 3} 3x \xrightarrow{+5} y$$

$$x \xleftarrow{\div 3} y - 5 \xleftarrow{-5} y$$

図の上の段は、 x から y を作る順番です（ $\times 3$ してから $+5$ ）。下の段は、 y から x にもどす順番です。もどすときは、あとからしたこと（ $+5$ ）を先にもどします。くつ下をはいてからくつをはいたら、ぬぐときはくつが先なのと同じです。

$y = 50$ のときは、

$$x = \frac{50 - 5}{3} = \frac{45}{3} = 15$$


で、15 個です。確かめると、 $3 \times 15 + 5 = 45 + 5 = 50$ で合っています。

4 わり算をもどすには、両辺にかける

$\frac{x}{3} = 7$ は、「 x を 3 つに分けた 1 つ分が 7」

という意味です (2-12: ÷ は分数で書く)。

右のテープ図のように、全体の x は、7 が 3 つ分で $7 \times 3 = 21$ です。



式では、両辺に 3 をかけます。3 でわったものに 3 をかけると、もとにもどるからです。

$$\begin{array}{l} \frac{x}{3} = 7 \\ \frac{x}{3} \times 3 = 7 \times 3 \\ x = 21 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{両辺に 3 をかける} \\ \div 3 \text{ と } \times 3 \text{ で、もとにもどる} \end{array}$$

確かめると、 $\frac{21}{3} = 7$ で合っています。

かけてから移項する テストの点を 2 回とったとき、1 回目を a 点、2 回目を b 点とすると、平均 m は $m = \frac{a + b}{2}$ です (2-6: 合計を回数でわる)。「平均を 80 点にするには、1 回目が 74 点なら 2 回目は何点？」のような問いに答えるために、 b について解いてみましょう。

$$\begin{array}{l} m = \frac{a + b}{2} \\ 2m = a + b \\ 2m - a = b \\ b = 2m - a \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{両辺に 2 をかける (分母の 2 が消える)} \\ + a \text{ を移項} \\ \text{入れかえる} \end{array}$$

$m = 80$ 、 $a = 74$ を代入^{だいにゆう}すると、 $b = 2 \times 80 - 74 = 160 - 74 = 86$ (点^{てん})。
確かめると、 $\frac{74 + 86}{2} = \frac{160}{2} = 80$ です。2 行目で、右^{ぎやうめ}辺^{うへん}の $\frac{a + b}{2}$ に 2 をかけると、 a と b の両方^{りやうほう}がそろって分母^{ぶんぼ}から出てきます。 $a + b$ はひとまとまりだからです (2-13)。

もどす計算^{けいさん}の表^{ひょう} ここまでの変形^{へんけい}をまとめると、 x についている計算^{けいさん}を、反対^{はんたい}の計算^{けいさん}で両^{りやう}辺^{へん}からとりのぞいていました。

x についている計算 ^{けいさん}	両 ^{りやう} 辺 ^{へん} にする反対 ^{はんたい} の計算 ^{けいさん}	例 ^{れい}
$+ 2$	2 をひく (移項 ^{いこう})	$x + 2 = 9 \rightarrow x = 7$
$- 3$	3 をたす (移項 ^{いこう})	$x - 3 = 5 \rightarrow x = 8$
$\times 4$	4 でわる	$4x = 20 \rightarrow x = 5$
$\div 2$	2 をかける	$\frac{x}{2} = 6 \rightarrow x = 12$

表 3 たし算とひき算、かけ算とわり算は、たがいにもどし合う計算^{けいさん}。

たいせつ

等式^{どうしき}の両^{りやう}辺^{へん}に同じ数^{おな かず}をたしても、ひいても、かけても、同じ数^{おな かず} (0 でない) でわっても、等式^{どうしき}は成^{なり}り立^たつ。

移項^{いこう} : 項^{こう}を「=」の向^むこうへうつすと、符^ふ号^{ごう}が反^{はん}対^{たい}になる (両^{りやう}辺^{へん}に同じ数^{おな かず}をたす・ひくのと^{おな}同じ)。

もどすときは、あとからしたことを先^{さき}にもどす。

式^{しき}の変形^{へんけい}は 1 行^{ぎやう}ずつ。その行^{ぎやう}で使^{つか}ったきまりを^か書^かく。答^{こた}えは代^だ入^{いにゆう}して確^{たし}かめる。

この章で出てきたことば

等式・左辺・右辺・両辺 「＝」で結んだ式と、その左・右・両方の辺。

等式の性質 両辺に同じ数をたす・ひく・かける・わっても、等式は成り立つ。

移項 項の符号を変えて、「＝」の向こうの辺へうつすこと。

～について**とく** ほしい量が左辺に1つだけある形にすること。

例題でたしかめよう

例題1 4つのきまりで x を求める

次の等式を x について解きましょう。(1) $x + 5 = 12$ (2) $x - 4 = 9$
(3) $6x = 42$ (4) $\frac{x}{5} = 3$

考え方 x についている計算の反対を、両辺にします。+5なら5をひく、-4なら4をたす、×6なら6でわる、÷5なら5をかけます。

しき (1) 両辺から5をひく $x = 12 - 5 = 7$

(2) 両辺に4をたす $x = 9 + 4 = 13$

(3) 両辺を6でわる $x = \frac{42}{6} = 7$

(4) 両辺に5をかける $x = 3 \times 5 = 15$

確かめ：7 + 5 = 12、13 - 4 = 9、6 × 7 = 42、 $\frac{15}{5} = 3$

こたえ (1) $x = 7$ (2) $x = 13$ (3) $x = 7$ (4) $x = 15$

じぶんでとこう1

次の等式を x について解きましょう。(1) $x + 7 = 10$ (2) $x - 9 = 2$
(3) $4x = 36$ (4) $\frac{x}{2} = 8$

 例題 2 両辺から同じ数をひく

ばねの長さ L (cm) とのび x (cm) には、 $L = x + 12$ の関係があります (12 はのびる前の長さ)。 x について解き、 $L = 17$ のときの、のびを求めましょう。

考え方 求めたい x を左辺にして、1 つだけ残します。

しき $L = x + 12$

$$x + 12 = L$$

$$x = L - 12$$

左辺と右辺を入れかえる

両辺から 12 をひく

こたえ $x = L - 12$ 。 $L = 17$ なら $x = 17 - 12 = 5$ で、5 cm

 例題 3 両辺を同じ数でわる

電圧 V (V)、電流 I (A)、抵抗 R (Ω) には、 $V = RI$ の関係があります。
 Ω (オーム) は電気の通りにくさ (抵抗) の単位です (くわしくは 2-15)。
 I について解き、 $V = 6$ 、 $R = 3$ のときの I を求めましょう。

考え方 RI は $R \times I$ 。 I にかかっている R を、わってはずします。

しき $V = RI$

$$RI = V$$

$$\frac{RI}{R} = \frac{V}{R}$$

$$I = \frac{V}{R}$$

左辺と右辺を入れかえる

両辺を R でわる

R を約分

こたえ $I = \frac{V}{R}$ 。 代入して $I = \frac{6}{3} = 2$ で、2 A

じぶんでところ2

あさ き おん 朝の気温 $a^{\circ}\text{C}$ と ひる き おん 昼の気温 $b^{\circ}\text{C}$ には、 $b = a + 6$ の かんけい関係がありました。 a について と解き、 $b = 21$ のときの a を もと求めましょう。

じぶんでところ3

$x = vt$ を v について と解き、150 m を びよう はし30 秒で走ったときの はや もと速さを求めましょう。

れいだい 例題4 りようへん おな かず 両辺に同じ数をかける

$t = \frac{x}{v}$ を、 v について と解きましょう。

かんが かんた **考え方** 分母にある v は、りようへん両辺に v をかけて分母から出します。 $\frac{x}{v} \times v = x$

です (かず数なら $\frac{1200}{4} \times 4 = 1200$)。

しき

$$t = \frac{x}{v}$$

$$t \times v = \frac{x}{v} \times v$$

$$tv = x$$

$$v = \frac{x}{t}$$

りようへん両辺に v をかける

$\div v$ と $\times v$ で、もとにもどる

りようへん両辺を t でわる

こたえ $v = \frac{x}{t}$ (298 ページで作った式と同じ)

例題5 移項してからわる

日本で使う温度 C (°C) と、アメリカで使う温度 F には、 $F = 1.8C + 32$ の関係があります (2-13)。 C について解き、 $F = 86$ のときの C を求めましょう。

考え方 C から F を作るときは「 $\times 1.8$ 」 $\rightarrow$ 「 $+ 32$ 」の順です。もどすときは、あとからした「 $+ 32$ 」を先にもどします。

しき $F = 1.8C + 32$

$$1.8C + 32 = F$$

$$1.8C = F - 32$$

$$C = \frac{F - 32}{1.8}$$

こたえ $C = \frac{F - 32}{1.8}$ 。 $C = \frac{86 - 32}{1.8} = \frac{54}{1.8} = 30$ で、 30°C (確かめ： $1.8 \times 30 + 32 = 86$)

左辺と右辺を入れかえる

$+ 32$ を移項

両辺を 1.8 でわる

じぶんでとこう 4

$I = \frac{V}{R}$ を R について解き、 $3V$ で $0.1A$ の電流が流れたときの抵抗を求めましょう。

じぶんでとこう 5

地下 $10m$ (高さ $-10m$ 、2-2) から毎秒 $2m$ で上がるエレベーターの、 t 秒後の高さは $h = 2t - 10$ (m) です。 t について解き、何秒後に高さ $30m$ に着くかを求めましょう。

例題 6 両辺にかけてから移項する

$y = \frac{x+4}{3}$ を x について解き、 $y = 5$ のときの x を求めましょう。

考え方 分母の 3 を、両辺に 3 をかけて消します。 $x+4$ はひとまとまりなので、そのあと $+4$ を移項します。

しき $y = \frac{x+4}{3}$

$$3y = x + 4$$

$$3y - 4 = x$$

$$x = 3y - 4$$

両辺に 3 をかける

$+4$ を移項

入れかえる

こたえ $x = 3y - 4$ 。 $y = 5$ なら $x = 3 \times 5 - 4 = 11$ (確かめ: $\frac{11+4}{3} = 5$)

例題 7 解いてから、単位ごと代入する

カーナビは、のこりの道のり x と平均の速さ v から、あとどれだけ時間がかかるかを計算します。のこり 3 km、平均時速 15 km (15 km/h) のとき、あと何分かかりますか。

考え方 $x = vt$ を t について解いた $t = \frac{x}{v}$ に、単位ごと代入します。km とうしが約分されて、時間 (h) が出ます。分に直すには 60 min/h をかけます。

しき $t = \frac{x}{v} = \frac{3 \text{ km}}{15 \text{ km/h}} = 0.2 \text{ h}$

$$0.2 \text{ h} \times 60 \text{ min/h} = 12 \text{ min} \quad \text{h が約分されて min}$$

こたえ 12 分

じぶんでとこう 6

2 回^{かい}のテストの平均^{へい きん}は
 $m = \frac{a+b}{2}$ です。a につ
 いて解^とき、平均^{へい きん}が 70 点^{てん}、2 回^{かい}目^め
 が 65 点^{てん}のときの 1 回^{かい}目^めの点^{てん}を
 求^{もと}めましょう。

じぶんでとこう 7

6 km の道^{みち}を、4 m/s で走^{はし}ります。
 $t = \frac{x}{v}$ を使^{つか}って、かか^じる時^{かん}間^{びょう}を秒^{びょう}
 と分^{ふん}で求^{もと}めましょ^うう（先^{さき}に、km
 を m に直^{なお}そう）。

⚠ まちがえやすいところをチェック

⚠ まちがえやすいところ

移^い項^{こう}で、符^ふ号^{ごう}を変^かえわすれる

✗ $x + 3 = 11$ から $x = 11 + 3$

○ $x + 3 = 11$ から $x = 11 - 3$

移^い項^{こう}は「両^{りょう}辺^{へん}から 3 をひく」こと^{こと}です。 $x = 14$ を代^{だい}入^{にゅう}すると $14 + 3 = 17$
 で、11 にならないので、まちがいに気^きづけます。

⚠ まちがえやすいところ

右辺の一部だけをわってしまう

✗ $y = 3x + 5$ から $\frac{y}{3} = x + 5$

○ $y = 3x + 5$ から $\frac{y}{3} = x + \frac{5}{3}$

右辺の全体 ($3x$ も 5 も) を 3 でわります ($2-12$)。先に $+5$ を移項すれば、まちがえにくくなります。

⚠ まちがえやすいところ

左辺の一部にだけかけてしまう

✗ $\frac{x}{3} + 2 = 5$ の両辺に 3 をかけて $x + 2 = 15$

○ $\frac{x}{3} + 2 = 5$ の両辺に 3 をかけて $x + 6 = 15$

左辺は $\frac{x}{3}$ と 2 の 2 つの項です。両方に 3 をかけます ($2-12$ の分配法則)。

先に $+2$ を移項して $\frac{x}{3} = 3$ にしてもよく、どちらも $x = 9$ です。

⚠ まちがえやすいところ

わる式を逆にしてしまう

✗ $x = vt$ から $t = v \div x$

○ $x = vt$ から $t = x \div v$

1200 m を 4 m/s で走るなら $1200 \div 4 = 300$ 秒。 $4 \div 1200$ では短すぎますね。単位でも確かめられます。 $\text{m/s} \div \text{m}$ では、時間の単位 s になりません。

物理・工学ではこう使う

LED を光らせる抵抗

LED は、電流が流れすぎるとこわれます。そこで抵抗をつなぎ、電流をちょうどよくします。電池の 3V は、LED と抵抗で分けて使われます。赤い LED は約 2V を使うので、抵抗にかかる電圧は $3 - 2 = 1$ で約 1V。流したい電流が 0.02A なら、 $V = RI$ を R について解いた $R = \frac{V}{I}$ に代入して、

$$R = \frac{V}{I} = \frac{1}{0.02} = 50$$


50Ω の抵抗を選びます。

カーナビの到着予想

カーナビは、のこりの道のり x と平均の速さ v から、 $t = \frac{x}{v}$ であとどれだけかかるかを計算します（例題 7）。のこり 30 km、平均時速 40 km なら、 $\frac{30}{40} = 0.75$ で 0.75 h。0.75 h $\times$ 60 min/h = 45 min で、あと 45 分です。

ロボットのうで

ロボットの手を、ほしい位置に動かすには、「うでの角度から手の位置を求める式」を、角度について解きます。大学では、これを逆運動学とよびます（4-0）。



コラム 2乗をもどすには $\sqrt{\quad}$

物が落ちはじめた t 秒で落ちる距離は、およそ $x = 5t^2$ (m) です (2-13)。
両辺を5でわると $t^2 = \frac{x}{5}$ 。 t は2回かけると $\frac{x}{5}$ になる0以上の数なので、 $t = \sqrt{\frac{x}{5}}$ です (2-8)。20 m なら $t = \sqrt{4} = 2$ で、落ちるのに2秒かかります。2-13のものさしキャッチ (0.15 m) なら、 $t = \sqrt{0.03}$ で、電卓の $\sqrt{\quad}$ キーを使うと0.173...秒。2-13で、はさんで調べた「0.17秒と0.18秒のあいだ」と合います。2乗は $\sqrt{\quad}$ でもどせます。



しょうまつもんだい 章末問題

2-14 のまとめ

きほん 基本



1 次の等式を x について解きましょう。

(1) $x + 8 = 15$ (2) $x - 6 = 4$ (3) $5x = 35$ (4) $\frac{x}{3} = 7$

2 次の変形で、①と②の行では、どんなきまりを使ったでしょう。

$$4x - 2 = 10$$

$$4x = 12$$

$$x = 3$$

①

②

3 $x = vt$ を t について解き、3000 m を5 m/s で走るのにかかる時間を、秒と分で求めましょう。

4 $V = RI$ を R について解き、12 V で0.5 A の電流が流れたときの抵抗を求めましょう。

5 1本^{ほん} 4g のくぎを、30g の箱^{はこ}に x 本^{ほん} 入^いれると、全^{ぜん}体^{たい}の重^{おも}さは $y = 4x + 30$ (g) です。 x について解^とき、全^{ぜん}体^{たい}が 70g のときの本^{ほん}数^{すう}を求^{もと}めましよう。

6 次の式を、[] の中^{なか}の文^も字^じについて解^ときましよう。

(1) $a + b = c$ [b] (2) $S = ab$ [a] (3) $m = \frac{a+b}{2}$ [a]

チャレンジ ★★

7 $C = \frac{F-32}{1.8}$ を F について解^ときましよう。また、 25°C は、 F ではいくつですか。

8 円周^{えんしゅう} = 直^{ちよう}径^{けい} $\times$ 円周率^{えんしゅうりつ} (2-9) を、円周^{えんしゅう} ℓ 、直^{ちよう}径^{けい} d で $\ell = \pi d$ と書^かきます。自^じ動^{どう}車^{しゃ}のタイヤが1回^{かい}転^{てん}すると、ち^{ちよう}う^うど 2m 進^{すす}みました。 d について解^とき、タイヤの直^{ちよう}径^{けい}を求^{もと}めましよう。 $\pi = 3.14$ とし、答^{こた}えは $\frac{1}{100}$ の位^{くらい}ま^までのが^がい数^{すう}にし^します (2-6)。

9 ソラさんは、 $y = 2x + 6$ を x について解^といて、 $x = \frac{y+6}{2}$ としました。 $y = 10$ を入^いれて確^{たし}かめると、ま^{まち}が^がい^いだ^だとわ^わか^かり^りま^ます。ど^{どこ}で^でま^{まち}が^がえ^えた^たの^ので^でし^しう。正^{ただ}しく解^ときましよう。

✓ ふりかえり できるようになったかな？

- ☐ 等^{とう}式^{しき}の性^{せい}質^{しつ}を、天^{てん}び^びん^んで説^{せつ}明^{めい}できる。 → 296 ページ
- ☐ $x = vt$ を t や v について解^とける。 → 298 ページ
- ☐ 移^い項^{こう}を使^{つか}い、1 行^{ぎよう}ず^ずつ^つき^きま^まり^りを^を書^かいて変^{へん}形^{けい}できる。 → 300 ページ



ミナ

こ^{こう}う^うし^{しき}き^きは 1 つ覚^{おぼ}え^えれ^れば、あ^あと^とは天^{てん}び^びん^んで作^{つく}れる^るんだ^だね。次^{つぎ}の^{しやう}章^{しょう}では、ば^ばね^ねや電^{でん}気^きの式^{しき}を、実^{じつ}験^{けん}から作^{つく}る^るよ。

2-15

比例と反比例

この章の先に 2-3 2-8 2-10 2-14 この章の先に 3-3 3-4 3-7 5-12 6-6


この章でできるようになること

- ★ 表から「 x が 2 倍になると y も 2 倍」を見つけて、 $y = ax$ の式とグラフに表せる。
- ★★ ばねの力 $F = kx$ と電気の式 $V = RI$ を、表から作って使える。
- ★★ 反比例 (xy が一定) を見分け、「2 倍にするとどうなるか」を答えられる。

? はてな?


ばねにおもりを 1 個つると、2 cm のびました。おもりを 2 個にすると、何 cm のびるかな? 10 個つるしたら?

ばねを 2 倍のばすには、2 倍の力があるのでしょうか。それとも、もっと大きな力があるのでしょうか。



△ やってみよう バネののびをはかろう

- 1 バネをスタンドにつるし、横に立てたものさしで、ばねの下のはしの目もりを読もう。
- 2 1個 50g のおもりを1個ずつふやしてつるし、そのたびに目もりを読もう。
- 3 読んだ目もりから、はじめの目もりをひいて、のびを表にしよう（あとーまえ、2-3）。



みなさんがはかった結果です。

おもりの数 (個)	0	1	2	3	4	5
のび (cm)	0	2.0	4.1	5.9	8.0	10.0

のびは、おもりの数とどんな関係になっているかな？

🕒 おもいだそう この章で使う、前に学んだこと

- 2-3 わり算で「1あたりの量」をつくる。速さ = 道のり ÷ 時間
- 2-6 はかった値にはずれがある。何回かの値をならして考える。
- 2-8 振り子の周期は、糸の長さを4倍にすると2倍になる。
- 2-10 単位をそろえる：2 cm ÷ 100 cm/m = 0.02 m (1 m あたり 100 cm)
- 2-14 $V = RI$ の両辺を R でわると $I = \frac{V}{R}$



デルタ

ひょう かず よこ み
表の数を、横に見たり、たてに見たりすると、きまりが見つかるよ。

数学の道具


1 2倍、3倍になると：比例

やってみようの表を、たてに見てみましょう。のびをおもりの数でわると、おもり1個あたりののびがわかります（2-3の「1あたりの量」）。

おもりの数（個）	1	2	3	4	5
のび（cm）	2.0	4.1	5.9	8.0	10.0
1個あたりののび（cm）	2.0	2.05	1.97	2.0	2.0

表1 のび÷個数は、どれも約2（1.97は $\frac{1}{100}$ の位までのがい数）

どれも約2cmです。2.05や1.97のように少しずれるのは、はかるときのずれです（2-6）。ならすと、おもり1個あたり2cmのびと考えられます。そこで、おもりの数を x 個、のびを y cmとして、ずれをならした表を作ります。



おもりの数 x (個)	0	1	2	3	4	5
のび y (cm)	0	2	4	6	8	10

図1 x が2倍・3倍になると、 y も2倍・3倍になる。

x が1から2へ2倍になると、 y も2から4へ2倍。 x が1から3へ3倍になると、 y も2から6へ3倍。このように、 x が2倍、3倍、…になると、 y も2倍、3倍、…になるとき、「 y は x に比例する」といいます。

式にする 1個あたり2cmのびるので、 x 個なら、2cmの x こ分で $2 \times x$ (cm)のびます(1-12:1つつ $\times$ いくつつ分)。だから $y = 2x$ と書けます。 x が0でないところでは、 $y \div x$ はいつも2です。

一般に、比例は $y = ax$ と書けます。 a は「 x が1のときの y 」、つまり1あたりの量で、**比例定数**といいます。 $y = ax$ の両辺を x でわると(2-14)、 $a = \frac{y}{x}$ です。

なぜ2倍になると2倍? $y = ax$ で x を2倍の $2x$ にすると、 y は $a \times 2x = 2 \times ax$ で、もとの ax の2倍になります。 a がどんな数でも同じです。

② はてな? の答え: 2個なら $2 \times 2 = 4$ で4cm、10個なら $2 \times 10 = 20$ で20cmのびます。ただし、ばねがもとにもどらなくなるほど強く引くと、比例しくなくなります。

② 比例のグラフは、0を通るまっすぐな線

2つの量の関係は、グラフにすると一目でわかります。横の軸に x 、たての軸に y をとった方眼に、表の x と y の組を1つつ点でかきこみます。




図2 点のかき方と、まっすぐになるわけ




図3 はかった点と $y = 2x$ 、 $y = x$

点のかき方 左のグラフの赤い点は、 $x = 2$ 、 $y = 4$ を表す点です。0から右へ2、そこから上へ4進んだ所にかきます(青い点線)。ほかの組も同じようにかきます。くわしくは3-2で学びます。

まっすぐになるわけ $y = 2x$ では、 x が1ふえるごとに、 y はいつも同じ2だけふえます（左のグラフの緑の階段）。同じ形の階段がくり返すので、点はまっすぐにならびます。おもりが0個なら、のびも0なので、線は $x = 0$ 、 $y = 0$ の点から始まります。この点を**原点**といいます。

右のグラフのように、はかった点（黒）は、原点から始まるまっすぐな線（青）の近くにならびます。比例のグラフは、原点を通る直線です。比例定数が大きいほど、1ふえるごとに上がる高さが大きいので、線は急になります（オレンジは $y = x$ ）。

3 ばねの力： $F = kx$

物理では、おもりの数ではなく、ばねを引く力で考えます。力の大きさは、**N**（ニュートン）という単位ではかります（2-10）。

記号カード

初めて出た章 2-15

N

読み方 ニュートン
意味 力の単位。質量 約 100 g の物にはたらく重さ（重力）が約 1 N。
英語 newton

100 g で約 1 N になるわけ 地球は、質量 1 kg の物を約 10 N の力で下に引いています（くわしくは 9.8 N。2-0 の「1 秒ごとに約 10 m/s ずつ速くなる」の 10 と同じ数です。5-5）。この力が、ふだん「重さ」とよんでいるものです。100 g は 1 kg（1000 g）の 10 分の 1 なので、引く力も 10 分の 1 の約 1 N です。50 g のおもり 1 個なら、その半分の約 0.5 N です。

質量（g、kg）は「物そのものの量」で、月に持っていても変わりません。重さ（N）は「地球が引く力」で、月では約 6 分の 1 になります。ばねがのびるのは、この力で引かれるからです。

力を F N、のびを x m として、表を作り直します。のびは m にそろえます。力の単位も m も、世界共通の SI 単位（2-10）だからです。cm を m に直すには、100 cm/m でわります。

$$2\text{ cm} \div 100\text{ cm/m} = 2\text{ cm} \times \frac{1\text{ m}}{100\text{ cm}} = 0.02\text{ m}$$


おもりの数 (個)	1	2	3	4
のび x (m)	0.02	0.04	0.06	0.08
ちから 力 F (N)	0.5	1.0	1.5	2.0
$F \div x$ (N/m)	25	25	25	25

表2 力は、のびに比例する。

たとえば1個のとき、 $0.5\text{ N} \div 0.02\text{ m} = 25\text{ N/m}$ です。 $F \div x$ がいつも同じなので、力はのびに比例します。比例定数を k と書くと、

$$F = kx$$

この k をばね定数といいます。単位は N/m (ニュートン毎メートル) で、「1m あたり何 N いるか」という1あたりの量です (速さ m/s が「1秒あたり何 m」なのと同じ)。ほんとうに1m ものばすわけではありません。



cm で考えても同じ このばねを 1cm あたりで考えると、

$$0.5\text{ N} \div 2\text{ cm} = 0.25\text{ N/cm}$$

です。1m の中には 100cm あるので、 100 cm/m をかけると、cm が約分されて消えます。


$$0.25\text{ N/cm} \times 100\text{ cm/m} = 25\text{ N/m}$$

2通りの計算が合います。

硬いばねほど、同じだけのばすのに大きな力があるので、 k は大きくなります。**？はてな？** のもう1つの答え： $F = kx$ で x を2倍にすると F も2倍なので、ばねを2倍のばすには、2倍の力がいります。

4 電圧と電流：オームの法則

抵抗（電流を流れにくくする部品）に乾電池をつなぎ、電流計で電流をはかりました。電圧（電流をおし出すはたらきの大きさ）の単位は V（ボルト）、電流の単位は A（アンペア）です。乾電池 1 個は 1.5 V で、2 個、3 個と直列につなぐと（小 4 の理科）、電圧は $1.5 \times 2 = 3.0$ 、 $1.5 \times 3 = 4.5$ (V) とふえます。



乾電池の数 (個)	1	2	3	4
電圧 V (V)	1.5	3.0	4.5	6.0
電流 I (A)	0.03	0.06	0.09	0.12
$V \div I$ (Ω)	50	50	50	50

表 3 電流は、電圧に比例する。

電圧が 2 倍なら電流も 2 倍。 $V \div I$ はいつも 50 で一定です。この値を、その部品の抵抗 R といいます。単位は Ω （オーム）で、 $V \div A = \Omega$ です。

記号カード

初めて出た章 2-15

Ω

読み方 オーム
意味 抵抗の単位。1V で 1A 流れる抵抗が 1 Ω 。
英語 ohm

$R = \frac{V}{I}$ は、「1A 流すのに何 V いるか」という 1 あたりの量です。電流を流しにくい部品ほど、たくさんの電圧があるので、 R は大きくなります。 $R = \frac{V}{I}$ の両辺に I をかけると $V = RI$ 、さらに両辺を R でわると $I = \frac{V}{R}$ です (2-14)。この関係をオームの法則といいます。 $V = RI$ は、 $F = kx$ と同じ比例の形 ($y = ax$) です。

5 かけると一定：反比例

こんどは、増える^ふと減る^へ2つの量^{りょう}です。1200 m の道^{みち}を行くときの、速さ^{はや} x (m/s) と、かかる時間^{じ かん} y (s) を表にします。かかる時間^{じ かん}は、時間^{じ かん}=道^{みち}のり^{はや}÷速さ^{はや} (2-14) で計算^{けいさん}します。たとえば $x = 4$ なら $1200 \div 4 = 300$ です。


速さ x (m/s) 時間 y (s)	1	2	3	4	5	6
	1200	600	400	300	240	200

$\xrightarrow{2 \text{ 倍}}$ $\xrightarrow{2 \text{ 倍}}$
 $\xleftarrow{\frac{1}{2} \text{ 倍}}$ $\xleftarrow{\frac{1}{2} \text{ 倍}}$

図4 x が2倍になると、 y は $\frac{1}{2}$ 倍になる。

速さ^{はや}が1から2へ2倍^{ばい}になると、時間^{じ かん}は1200から600へ $\frac{1}{2}$ 倍^{ばい}。速さ^{はや}が1から3へ3倍^{ばい}になると、時間^{じ かん}は1200から400へ $\frac{1}{3}$ 倍^{ばい}です。このように、 x が2倍^{ばい}、3倍^{ばい}、…になると、 y は $\frac{1}{2}$ 倍^{ばい}、 $\frac{1}{3}$ 倍^{ばい}、…になるとき、「 y は x に反比例^{はんびれい}する」といいます。

かけ算^{さん}が一定^{いっせい} 表^{ひょう}のたての組^{くみ}で $x \times y$ を計算^{けい}すると、 1×1200 、 2×600 、 3×400 、…で、どれも1200です。速さ^{はや}×時間^{じ かん}は道^{みち}のり (2-3) で、道^{みち}のり^{はや}はいつも1200 m だからです。



一定^{いっせい}の値^{あたい}を a とすると、 $xy = a$ 。両辺^{りょうへん}を x でわって (2-14)、 $y = \frac{a}{x}$ と書^かけます。 x を2倍^{ばい}にすると、 $\frac{a}{2x}$ で、分母^{ぶんぼ}が2倍^{ばい}になるので、 y は $\frac{1}{2}$ 倍^{ばい}になります。

反比例^{はんびれい}のグラフ 点^{てん}をかきこむと、上^{うへ}のグラフのように、右^{みぎ}へ行くほど下^さがり、下^さがり方がだんだんゆるやかになる曲線^{きよくせん}になります。速さ^{はや}をどれだけ大きく^{おお}

しても、時間は0にはなりません。だから曲線は、横の軸に近づくけれど、くっつきません。比例とちがい、直線ではなく、原点も通りません（くわしくは3-7）。

6 2倍にすると、どうなる？

「増えると増える」だけでは、何倍になるかはわかりません。 x を2倍にしたとき y が何倍になるかは、関係の形で決まります。比例・反比例のほかに、これまでの章で出てきた2つの関係もくらべてみましょう。

2乗に比例 物が落ちる距離は $y = 5x^2$ （ x は時間、2-13）。 x を2倍にすると、 x^2 は $2 \times 2 = 4$ 倍になります。 $x = 1$ で $y = 5$ 、 $x = 2$ で $y = 5 \times 4 = 20$ 、 $x = 4$ で $y = 5 \times 16 = 80$ 。時間が2倍で4倍、4倍で16倍です。 $y = ax^2$ の形を「 y は x の2乗に比例する」といいます。

$\sqrt{\quad}$ に比例 振り子の周期は、糸の長さの $\sqrt{\quad}$ に比例します（2-8）。長さを4倍にすると、周期は $\sqrt{4} = 2$ 倍。長さを2倍にすると、周期は $\sqrt{2}$ 倍で、約1.41倍です。反対に、周期を2倍にしたければ、長さは $2 \times 2 = 4$ 倍にします。

関係	例	2倍にする	4倍にする
比例 $y = ax$	ばねののびと力	2倍	4倍
反比例 $y = \frac{a}{x}$	はやすさとかかる時間	$\frac{1}{2}$ 倍	$\frac{1}{4}$ 倍
2乗に比例 $y = ax^2$	おちる時間と距離（2-13）	4倍	16倍
$\sqrt{x}$ に比例	いとながふ、こしゅうき糸の長さと振り子の周期（2-8）	やく 約 1.41倍	2倍

表4 x を2倍・4倍にしたときの y 。

もっと知りたい ★★


注射器の空気も反比例

先をふさいだ注射器の空気を、体積が半分になるまでおしこむと、中の空気がおし返す強さ（圧力）は2倍になります。温度が変わらなければ、（おし返す強さ） $\times$ （体積）が一定です。空気入れ（ポンプ）のつつの中の空

き 気も、このきまりにしたがいます（高校の物理で「ボイルの法則」として
まな 学びます）。

🔍 コラム てこのつり合いも反比例

てこがつり合うのは、（おもりの重さ）
×（支点からの距離）が左右で等しいと
きです（小6の理科）。右の図では、左が
 $2 \times 2 = 4$ 、右が $1 \times 4 = 4$ 。支点から
2 倍はなすと、つり合う重さは $\frac{1}{2}$ になり
ます。



たいせつ

$y = ax$ （比例）： x が 2 倍なら y も 2 倍。 $y \div x$ が一定（ $= a$ 、1 あたり
の量）。グラフは原点を通る直線。

$y = \frac{a}{x}$ （反比例）： x が 2 倍なら y は $\frac{1}{2}$ 倍。 $x \times y$ が一定（ $= a$ ）。

比例か反比例かは、 $y \div x$ や $x \times y$ を計算して確かめる。

📖 この章で出てきたことば

比例・比例定数 $y = ax$ の関係。 $a = \frac{y}{x}$ が比例定数。グラフは原点を通る直線。

反比例 $y = \frac{a}{x}$ の関係。 xy が一定。

ばね定数 $F = kx$ の k 。1 m のばすのに何 N いるか（1 あたりの量）。

オームの法則 $V = RI$ 。電流は電圧に比例する。 R は抵抗。

例題でたしかめよう

例題1 比例の式を作る

はり金の重さ y g は長さ x m に比例し、2 m で 30 g です。 y を x の式で表し、8 m の重さを求めましょう。

考え方 比例なので $y = ax$ の形です。比例定数 $a = \frac{y}{x}$ は、1 m あたりの重さです。

しき $a = \frac{30}{2} = 15$ わかっている $x = 2$ 、 $y = 30$ を使う

だから $y = 15x$ 。 $x = 8$ を代入して $y = 15 \times 8 = 120$

こたえ $y = 15x$ 、120 g (確かめ：長さが 4 倍なので重さも 4 倍、 $30 \times 4 = 120$)

例題2 ばねの力 $F = kx$

(1) 1.5 N で引くと 5 cm のびるばねの、ばね定数は何 N/m ですか。

(2) ばね定数 40 N/m のばねを、5 cm のばす力は何 N ですか。

(3) (2) のばねを 3 N で引くと、何 cm のびますか。

考え方 ばね定数は「1 m あたり」なので、のびは m にそろえます。(1) は $k = \frac{F}{x}$ 、(3) は $x = \frac{F}{k}$ ($F = kx$ を 2-14 のように変形) を使います。

しき $5 \text{ cm} \div 100 \text{ cm/m} = 0.05 \text{ m}$

(1) $k = \frac{1.5}{0.05} = 30$ (2) $F = 40 \times 0.05 = 2$

(3) $x = \frac{3}{40} = 0.075$ 。 $0.075 \text{ m} \times 100 \text{ cm/m} = 7.5 \text{ cm}$

こたえ (1) 30 N/m (2) 2 N (3) 7.5 cm

じぶんでとこう 1

水^{みず}の深さ^{ふか} y cm は時間^{じかん} x 分に比
例^{れい}し、3 分^{ぶん}で 12 cm でした。 y を
 x の式^{しき}で表^{あらわ}し、10 分^{ぶん}後の深さ^{ふか}を
求め^{もと}めましょう。

じぶんでとこう 2

(1) 1.5 N で 6 cm のびるばねの、
ばね定数^{ていすう}を求め^{もと}めましょう。(2) こ
のばねを 12 cm のばす力^{ちから}と、(3)
2 N で引^ひいたときののび^{もと}を求め
ましょう。

例題 3 オームの法則

(1) 20Ω の抵抗^{ていこう}に 6 V をかけると何^{なん} A 流れ^{なが}ますか。(2) 20Ω の抵抗^{ていこう}に
0.5 A 流^{なが}すには何^{なん} V かければよいですか。(3) 6 V をかけると 0.3 A 流れ^{なが}
る部品^{ぶひん}の抵抗^{ていこう}は何^{なん} Ω ですか。

考え方 ほしい量^{りょう}について解^といた式^{しき}を使^{つか}います。(1) は $I = \frac{V}{R}$ 、(2) は
 $V = RI$ 、(3) は $R = \frac{V}{I}$ 。

しき (1) $I = \frac{6}{20} = 0.3$ (2) $V = 20 \times 0.5 = 10$ (3) $R = \frac{6}{0.3} = 20$

こたえ (1) 0.3 A (2) 10 V (3) 20Ω

例題 4 反比例と、2倍・ $\frac{1}{2}$ 倍にすると？

4 m/s で 300 秒かかる道を、(1) 6 m/s で行くと何秒かかりますか。(2) 速さを 2 倍にすると、時間は何倍ですか。(3) 速さを $\frac{1}{2}$ 倍にすると、時間は何倍ですか。

考え方 道のりが同じなので、速さ×時間が一定（反比例）です。

しき $xy = 4 \times 300 = 1200$ (1) $y = \frac{1200}{6} = 200$

(2) 8 m/s なら $y = \frac{1200}{8} = 150$ 。 $150 \div 300 = \frac{1}{2}$

(3) 2 m/s なら $y = \frac{1200}{2} = 600$ 。 $600 \div 300 = 2$

こたえ (1) 200 秒 (2) $\frac{1}{2}$ 倍 (3) 2 倍

じぶんでとこう 3

(1) 50Ω の抵抗に 4.5 V をかけたときの電流、(2) 50Ω に 0.2 A 流すのに必要な電圧、(3) 9 V で 0.3 A 流れる部品の抵抗を求めましょう。

じぶんでとこう 4

かみ合う歯車は、(歯の数) × (回転数) が等しくなります (かみ合った所を通る歯の数が同じだから)。(1) 歯が 30 の歯車が 4 回転すると、歯が 20 の歯車は何回転しますか。(2) 歯の数を $\frac{1}{2}$ 倍にすると、回転数は何倍ですか。

例題 5 比例・反比例・どちらでもない、を見分ける

y を x の式で表し、比例・反比例・どちらでもない、のどれかを答えましょう。

- (1) 1 m が 120 円のリボンを x m 買ったときの代金 y 円
- (2) 面積が 18 cm^2 の長方形の、たて $x \text{ cm}$ と横 $y \text{ cm}$
- (3) 10 L の水が入った水そうに、1 分に 2 L ずつ水を入れたときの、 x 分後の水の量 y L

考え方 式を作ってから、 $x = 1, 2, 3$ を代入して表にし、 $y \div x$ と $x \times y$ を計算します。

しき (1) $y = 120x$ 。 $x = 1, 2, 3$ で $y = 120, 240, 360$ 。 $y \div x$ はいつも 120

(2) $xy = 18$ より $y = \frac{18}{x}$ 。 $x = 1, 2, 3$ で $y = 18, 9, 6$ 。 $x \times y$ はいつも 18

(3) $y = 2x + 10$ 。 $x = 1, 2, 3$ で $y = 12, 14, 16$ 。 $y \div x$ は 12、7、5.33…でばらばら。 $x \times y$ も 12、28、48 でばらばら

こたえ (1) 比例 (2) 反比例 (3) どちらでもない (ふえるけれど、2 倍にはならない)

例題6 2乗に比例・ $\sqrt{\quad}$ に比例

- (1) 物が落ちる距離は、時間の2乗に比例します。1秒で5m落ちるとき、3秒では何倍、何m落ちますか。
- (2) 振り子の周期は、糸の長さの $\sqrt{\quad}$ に比例します。糸の長さ約25cmで周期が1秒の振り子を、周期3秒にするには、長さを何倍、約何cmにしますか。

考え方 (1) 時間が3倍なら、2乗は $3 \times 3 = 9$ 倍。(2) 周期を3倍にするには、 $\sqrt{\quad}$ が3倍になる長さ、つまり $3 \times 3 = 9$ 倍の長さにします($\sqrt{9} = 3$ 。2-8)。

しき (1) $5 \times 9 = 45$ (2) $25 \times 9 = 225$

こたえ (1) 9倍、45m (2) 9倍、約225cm

じぶんでこう5

y を x の式で表し、比例・反比例・どちらでもない、のどれかを答えましょう。(1) 1ふくろ6個入りのあめを x ふくろ買ったときのあめの数 y 個 (2) 30個のあめを x 人で同じ数ずつ分けたときの1人分 y 個 (3) 100ページの本を x ページ読んだときの残り y ページ

じぶんでこう6

- (1) 1秒で5m落ちる物は、4秒では何倍、何m落ちますか。(2) 周期1秒の振り子(約25cm)の糸を16倍の約400cmにすると、周期は何秒になりますか。

例題 7 比例を使って、数えずに数を求める

同じ紙 100 枚の重さをはかると 400 g でした。この紙のたばの重さが 2.6 kg のとき、紙は何枚ありますか。

考え方 同じ紙なら、重さ y g は枚数 x 枚に比例します。1 枚あたりの重さ（比例定数）を求めます。重さは g にそろえます（1000 g/kg をかける）。

しき $a = \frac{400}{100} = 4$ だから $y = 4x$ 1 枚 4 g

$2.6 \text{ kg} \times 1000 \text{ g/kg} = 2600 \text{ g}$ kg が約分されて g

$2600 = 4x$ の両辺を 4 でわって (2-14)、 $x = 650$

こたえ 650 枚（確かめ： $4 \times 650 = 2600$ ）

じぶんでとこう 7

同じくぎ 50 本の重さは 120 g でした。このくぎ全部の重さが 0.96 kg のとき、くぎは何本ありますか。

⚠ まちがえやすいところをチェック

⚠ まちがえやすいところ

「増えると増える」なら比例？

✗ ばねの全体の長さは、おもりの数に比例する

○ 比例するのは「のび」。全体の長さは比例しない

もとの長さ 12 cm なら、1 個で 14、2 個で 16 cm。2 倍になりません。

$y \div x$ が一定かで確かめよう。

⚠ まちがえやすいところ

グラフが直線なら比例？

✕ $y = x + 2$ のグラフはまっすぐなので、比例

○ $x = 0$ で $y = 2$ 。原点を通らないので、比例ではない

比例のグラフは、直線で、しかも原点を通ります。 $x = 1$ で 3、 $x = 2$ で 4。2 倍になっていません。

⚠ まちがえやすいところ

ばね定数の単位をそろえない

✕ 0.5 N で 2 cm のびたので、 $k = 0.5 \div 2 = 0.25 \text{ N/m}$

○ $2 \text{ cm} \div 100 \text{ cm/m} = 0.02 \text{ m}$ だから、 $k = 0.5 \div 0.02 = 25 \text{ N/m}$
 N/m は「 1 m あたり」です。 cm のままだと 100 倍ずれます (2-10)。

⚠ まちがえやすいところ

「増えると減る」なら反比例？

✕ 10 L から $x \text{ L}$ 使った残り $y = 10 - x$ は、反比例

○ $x = 1$ で $y = 9$ 、 $x = 2$ で $y = 8$ 。 xy が一定でないので反比例でない
 反比例かどうかは、 $x \times y$ をかけて確かめよう。

ぶつ り こうがく つか
物理・工学ではこう使う

ばねばかり

ばねばかりの目もりが同じ間隔でなっているのは、
のびが力に比例するからです。力が1 N ふえるごと
に、のびはいつも同じだけふえます。のびをはかれ
ば、 $F = kx$ で力がわかります。

自動車^{じどうしゃ}のばね

タイヤの近くには、車の重さを支えて、でこぼこ道
のゆれをやわらげるばねがあります。ばね定数が約
30000 N/m もある、硬いばねです。1 本のばねに、さ
らに 150 N (約 15 kg の荷物の重さ) がかかると、

$$x = \frac{150}{30000} = 0.005,$$

$$0.005 \text{ m} \times 1000 \text{ mm/m} = 5 \text{ mm}$$

で、5 mm 沈みます。

自転車^{じてんしゃ}のギア

前のギアの歯が 44 枚のとき、ペダル 1 回転で、チェーンは歯 44 枚分進
みます。後ろのギアは、歯が 11 枚なら $44 \div 11 = 4$ で 4 回転、22 枚な
ら $44 \div 22 = 2$ で 2 回転します。(歯の数) $\times$ (回転数) = 44 で一定な
ので、後ろのギアの回転数は、歯の数に反比例します。歯の少ないギアほ
ど速く走れますが、ペダルは重くなります。

大学^{だいがく}への種^{たね}

ばねの $F = kx$ と電気^{でんき}の $V = RI$ は、どちらも比例^{ひ れい}の形です。ばねにつ
るしたおもりのゆれ (6-6) と、電気^{でんき}の回路^{かい ろ}の中^{なか}のゆれも、同じ形の式で書
けます。機械^{きかい}と電気^{でんき}を、1 つの数学^{すうがく}で設計^{せっけい}できるのです。





しょうまつもんだい
章末問題

2-15 のまとめ

きほん
基本



1 y を x の式で表し、比例・反比例・どちらでもない、のどれかを答えましょう ($y \div x$ や $x \times y$ を計算して確かめよう。329 ページ)。

- (1) 1 個 80 円のパンを x 個買ったときの代金 y 円
- (2) 24 cm^2 の長方形の、たて $x \text{ cm}$ と横 $y \text{ cm}$
- (3) 20 歳の兄の、 x 年後の年齢 y 歳

2 y は x に比例し、 $x = 4$ のとき $y = 10$ です。 y を x の式で表し、 $x = 10$ のときの y を求めましょう。

3 ばね定数 50 N/m のばねがあります。(1) 4 cm のばす力は何 N ですか。(2) 3 N で引くと何 cm のびますか。

4 10Ω の抵抗があります。(1) 3 V をかけたときの電流は何 A ですか。(2) 1.2 A 流すには何 V かければよいですか。

5 36 km はなれた町へ行きます。(1) 時速 12 km で行くと何時間かかりますか。(2) 2 時間で着くには、時速何 km で行けばよいですか。





図5 速さ $\times$ 時間は、いつも 36 km 。

- 6 y が x の2乗に比例するとき、 x を3倍にすると y は何倍になりますか。
 y が x に反比例するときはどうですか。

チャレンジ ★★

- 7 周期が1秒の振り子の糸の長さは、約25 cm です。周期を2秒にするには、糸の長さを何倍、約何 cm にすればよいですか (2-8. 322 ページの表を見よう)。



- 8 2 N で引くと 4 cm のびるばねがあります。このばねのばね定数は何 N/m ですか。3 N で引くと何 cm のびますか。

- 9 乾電池 2 個 (3 V) につないだ電熱線に 0.6 A 流れました。この電熱線の抵抗は何 Ω ですか。乾電池を 4 個 (6 V) にすると、電流は何 A になりますか。

✓ ふりかえり できるようになったかな？

- ☐ 比例を見つけ、 $y = ax$ の式とグラフにできる。 → 316 ページ
- ☐ ばねの $F = kx$ 、オームの法則 $V = RI$ を使える。 → 318 ページ
- ☐ 反比例を見分け、2 倍にするとどうなるか答えられる。 → 321 ページ



デルタ

ばねも電気も、表を作ってわり算をしたら、同じ「比例」の形が見えたね。次の章では、追いかけて式で解くよ。

2-16

何秒後に追いつく？ 1 次方程式

この章の先に 2-2 2-12 2-13 2-14 この章の先に 3-4 3-6 3-10 6-2

この章でできるようになること

- ★★ わからない数を文字にして方程式をつくり、表でためして解きがせる。
- ★★ 等式の性質と移項で、1 次方程式を 1 行ずつ解ける。
- ★★ 追いかかけの問題を、表・グラフ・方程式で解き、代入して確かめられる。

? はてな？

弟は、兄より 10 m 前から、秒速 2 m で走り出しました。兄は同じときに、秒速 4 m で追いかけます。兄は何秒後に弟に追いつくかな？




図 1 2 人は同じときにスタート。どこで追いつく？

兄のほうが速いので、いつかは追いつきそうです。でも、それが何秒後なのかは、見ているだけではわかりません。この章では、「わからない数」を文字にして式をつくり、その数を見つけ出す方法を学びます。同じ問題を、表・グラフ・方程式の3つの方法で解いてくらべます。

△ やってみよう 電卓でためして、表を作ろう

スタートから t 秒後の2人の位置を計算します。位置は、スタートのときに兄がいた場所を0として、そこから前へ何 m の所にいるかで表します。

- ① 兄は1秒に4m、弟は1秒に2m進みます。下の表の1秒後・2秒後の数が、なぜそうなるか確かめよう。
- ② 表をノートに写し、 $t = 3$ から先を電卓で計算してうめよう。
- ③ 2人の位置が同じになるのは、何秒後かな？

時間 t (s)	0	1	2	3	4	5	6	7
兄の位置 (m)	0	4	8					
弟の位置 (m)	10	12	14					

🕒 思い出そう この章で使う、前に学んだこと

- 2-3 道のり = 速さ × 時間。4 m/s で3秒進むと $4 \times 3 = 12$ で12 m。
- 2-12 $4 \times t$ は $\times$ をはぶいて $4t$ と書く。同類項をまとめる： $4t - 2t = 2t$ 。分配法則： $3(x + 4) = 3x + 12$
- 2-14 等式は天びん。両辺に同じことをしても、等式は成り立つ。移項すると符号が反対になる。
- 2-2 $(-10) \div (-2) = 5$ 。マイナスどうしのわり算の答えはプラス。
- 2-10 1分あたり60秒なので60 s/min。2 min $\times$ 60 s/min = 120 s (min が約分されて消える)

すうがく 数学の道具

① 位置を式で表す：なぜ $4t$ と $10 + 2t$

まず、2人が何秒後にどこにいるかを、図にしてみましょう。青い点が兄、だ
 いだいの点が弟です。1秒ごとに、兄は4m、弟は2mだけ右へ進みます。




図2 1秒ごとの2人の位置。差(赤)は、1秒に2mずつ小さくなる。

兄の位置 兄は0の所から出て、1秒に4mずつ進みます。1秒後は $4 \times 1 = 4$ 、
 2秒後は $4 \times 2 = 8$ 、3秒後は $4 \times 3 = 12$ です。どれも「 $4 \times$ 秒の数」になっ
 ています。これは「道のり=速さ×時間」(2-3) そのものです。秒の数を t とす
 ると、兄の位置は $4 \times t$ 、 $\times$ をはぶいて $4t$ (m) です (2-12)。

弟の位置 弟は、はじめから10の所にいます。そこから1秒に2mずつ進
 むので、 t 秒で $2t$ (m) 進みます。位置は「はじめの10」に「進んだ $2t$ 」をた
 した $10 + 2t$ (m) です。3秒後なら $10 + 2 \times 3 = 16$ です。 $\times$ を+より先に計
 算します (2-11)。

時間 t (s)	0	1	2	3	4	5
兄 $4t$ (m)	4×0 = 0	4×1 = 4	4×2 = 8	4×3 = 12	4×4 = 16	4×5 = 20
弟 $10 + 2t$ (m)	$10 + 0$ = 10	$10 + 2$ = 12	$10 + 4$ = 14	$10 + 6$ = 16	$10 + 8$ = 18	$10 + 10$ = 20

表 1 式の t に 0、1、2、…を代入すると (2-13)、やってみようの表と同じ数が出る。

② 差に目をつける：1 秒に 2m ずつ近づく

もう 1 つの見方もあります。上の図の赤い差を見てください。10、8、6、4、2、0 と、1 秒に 2 ずつへっています。

なぜ 2 なのでしょう。1 秒の間に、兄は 4m 進み、弟は 2m 進みます。兄のほうが $4 - 2 = 2$ で 2m 多く進むので、そのぶん差がちぢまるのです。兄は弟に、1 秒に 2m ずつ近づいていきます。これを「近づく速さ」とよぶことにします。

$$4\text{m/s} - 2\text{m/s} = 2\text{m/s}$$

はじめの差は 10m です。2m ずつ近づいて 10m をうめるには、10 の中に 2 が何こあるかを考えて、 $10 \div 2 = 5$ で 5 秒かかります。単位ごと書くと (2-13)、

$$10\text{m} \div 2\text{m/s} = 10\text{m} \times \frac{1\text{s}}{2\text{m}} = 5\text{s}$$

m どうしが約分されて、時間の単位 s が残ります。答えは 5 秒。表でも、5 秒後に 2 人とも 20m の所にいました。

時間 t (s)	0	1	2	3	4	5
差 (弟 - 兄) (m)	10	8	6	4	2	0

表 2 差は 1 秒に 2 ずつへり、5 秒後に 0 になる。

② はてな？ の答え：兄は 5 秒後に、スタートから 20m の所で弟に追いつきます。

差を使うこの考え方は、追いかかけの問題にはとても便利です。でも、水そうの水がふえる問題や、ものを配る問題など、場面が変わると、そのたびに新しい考え方を工夫しなければなりません。そこで、どんな場面でも同じ手順で解ける方法を、次から学びます。

③ ためして探す：方程式と解

「追いつく」とは、「2人の位置が等しくなる」ことです。兄の位置は $4t$ 、弟の位置は $10 + 2t$ だったので、「=」でつなぐと等式 (2-14) になります。

$$4t = 10 + 2t$$

位置の単位は m、時間の単位は s にそろえてあるので、式の中では数だけを書いています。

この等式の t に、いろいろな数を入れて、左辺と右辺をくらべてみましょう。

t	左辺 $4t$	右辺 $10 + 2t$	ひと等しい？
1	$4 \times 1 = 4$	$10 + 2 \times 1 = 12$	$\times$ ($4 < 12$)
2	$4 \times 2 = 8$	$10 + 2 \times 2 = 14$	$\times$ ($8 < 14$)
3	$4 \times 3 = 12$	$10 + 2 \times 3 = 16$	$\times$ ($12 < 16$)
4	$4 \times 4 = 16$	$10 + 2 \times 4 = 18$	$\times$ ($16 < 18$)
5	$4 \times 5 = 20$	$10 + 2 \times 5 = 20$	$\bigcirc$ ($20 = 20$)
6	$4 \times 6 = 24$	$10 + 2 \times 6 = 22$	$\times$ ($24 > 22$)

表3 $t = 5$ のときだけ、左辺と右辺が等しくなる。

$t = 3$ のときは $12 = 16$ となり、まちがった等式です。 $t = 5$ のときだけ、 $20 = 20$ で正しい等式になります。6秒後には兄のほうが前に出るので、また等しくなくなります。

このように、文字に入れる数によって、成り立ったり成り立たなかったりする等式を**方程式**といいます。方程式を成り立たせる数（ここでは5）を、その方程式の**解**といいます。解を求めることを**方程式を解く**といいます。

式の種類	例と、文字に数を入れたとき
いつでも成り立つ等式	$a + b = b + a$ (2-11)。どんな数を入れても成り立つ
方程式	$4t = 10 + 2t$ 。 $t = 5$ のときだけ成り立つ

表 4 「=」のある式でも、いつでも成り立つものと、方程式がある。

表で 1 つずつためすのは、確かな方法です。でも、答えが 100 秒後なら 100 回も計算しなければなりません。もっと早く解く方法を考えましょう。

4 てんびんで解く

2-14 で、等式はてんびんのつり合いと同じだと学びました。左右の皿から同じ重さをとっても、同じ重さを分けても、つり合ったままです。

$4t = 10 + 2t$ をてんびんにしてみましょう。中の数がわからない箱を t とします。 $4t$ は「 t の箱が 4 つ」、 $10 + 2t$ は「10 のおもりと t の箱 2 つ」です。




図 3 ① 両方の皿から箱を 2 つずつとると、箱 2 つが 10 とつり合う。

なぜ 2 つずつとるの？ 右の皿には、箱が 2 つとおもり 10 がのっています。箱を 2 つとれば、右の皿はおもり 10 だけになり、箱は左の皿だけに残ります。箱を片方に集めると、箱の重さを考えやすくなります。左の皿からも同じ 2 つをとるので、つり合いはくずれません。




図4 ② 箱2つで10なら、両方を半分にする、箱1つは5とつり合う。

なぜ2でわるの？ 箱2つで10の重さです。同じ箱が2つなので、1つ分は10を2つに等しく分けた $10 \div 2 = 5$ です。両方の皿を半分にしても、つり合いはくずれません。式では「両辺を2でわる」です (2-14)。

天びんでしたことを、式で1行ずつ書くと、こうなります。右のらんには、その行でしたことを書きます。

$$\begin{aligned}
 4t &= 10 + 2t \\
 4t - 2t &= 10 + 2t - 2t \\
 2t &= 10 \\
 t &= 5
 \end{aligned}$$

① 両辺から $2t$ をひく (箱を2つずつとる)

同類項をまとめる ($4t - 2t = 2t$, $2t - 2t = 0$)

② 両辺を2でわる (2つに分ける)

答えは $t = 5$ で、表でためしたときと同じです。表なら6回も計算しましたが、天びんの考え方なら2つの操作で答えにたどりつきました。

5 移項で短く書く

上の2行目では、両辺から $2t$ をひきました。右辺では $+2t - 2t$ で $2t$ が消え、左辺には $-2t$ がふえました。結果だけを見ると、右辺の $+2t$ が、符号を変えて $-2t$ として左辺へ移ったように見えます。

$$\begin{aligned}
 4t &= 10 + 2t \\
 4t - 2t &= 10
 \end{aligned}$$

「=」の向こうへうつすと、符号が反対 ($+\rightarrow-$) になる。中身は「両辺から $2t$ をひく」こと。

図5 移項 (2-14)。両辺から同じものをひく計算を、1行で書いたもの。

このように項を反対の辺へうつすことが、2-14 で学んだ**移項**です。移項を使うと、「両辺から $2t$ をひく」の行を書かずに済みます。

$$4t = 10 + 2t \rightarrow 4t - 2t = 10$$

マイナスの項を移項すると、プラスになります。たとえば $x - 7 = 5$ の -7 を移項すると $x = 5 + 7$ です。これは「両辺に 7 をたす」ことを 1 行で書いたものです ($x - 7 + 7 = 5 + 7$)。

6 1 次方程式の解き方

$4t = 10 + 2t$ の文字の項は $4t$ と $2t$ です。どちらも「数×文字」で、文字を 1 回だけかけています。 t^2 ($t \times t$, 2-7) のように文字を 2 回かけた項はありません。このように、文字の項が「数×文字」だけの方程式を **1 次方程式** といいます。「1 次」は、文字を 1 回かけている、という意味です (t^2 のある方程式は 2 次方程式で、3-10 で学びます)。

1 次方程式は、いつも次の 3 つの手順で解けます。

手順	なぜそうするの？
① 文字の項を左辺に、数の項を右辺に移項する	天びんで、箱を片方の皿に、おもりをもつ片方に集めるため
② 両辺をそれぞれまとめて、 $ax = b$ の形にする	「箱が a こで、おもり b とつり合う」形にするため
③ 両辺を x の係数 a でわる	箱 a こ分、箱 1 こ分を求めるため

表 5 1 次方程式の解き方。天びんでしたことと同じ。

たとえば $3x - 7 = x + 5$ を解いてみましょう。文字は t でも x でも、解き方は同じです。

$$3x - 7 = x + 5$$

$$3x - x = 5 + 7$$

$$2x = 12$$

$$x = 6$$

① 右辺の x を左辺へ、左辺の -7 を右辺へ移項

② まとめる ($3x - x = 3x - 1x = 2x$)

③ 両辺を 2 でわる ($12 \div 2 = 6$)


- x は $1x$ のことです (2-12)。だから $3x - x$ は $3x - 1x = 2x$ です。
- -7 は移項すると $+7$ になります。両辺に 7 をたしたのと同じです。
- $+x$ は移項すると $-x$ になります。両辺から x をひいたのと同じです。

7 表・グラフ・方程式で、同じ答え

3 つ目の方法は、グラフです。横に時間 t 、たてに位置をとります (比例のグラフ、2-15)。グラフは、次の手順でかきます。

- ① 表を作る (兄は $4t$ 、弟は $10 + 2t$ に $t = 0, 1, 2, \dots$ を代入)。
- ② 表の数の組を、点にしてとる ($t = 1$ 、位置 4 なら、横 1・たて 4 の所)。
- ③ 同じ人の点を、まっすぐな線でつなぐ (速さが一定なので、点は一直線にならぶ)。
- ④ 2 本の線が交わる点を読む。

位置 (m)



2 本の線が交わる点は、兄の線の上にも、弟の線の上にもあります。つまり「同じ時刻に同じ位置にいる」点です。

交わる点を読むと、横が 5、たてが 20 です。表とも方程式とも同じ答えになりました。

表では見のがす答え 弟が 9m 先からスタートしたら、どうでしょう。表を作ってみます。

時間 t (s)	0	1	2	3	4	5	6
兄 $4t$ (m)	0	4	8	12	16	20	24
弟 $9 + 2t$ (m)	9	11	13	15	17	19	21

表6 4秒後はまだ弟が前 ($16 < 17$)。5秒後は兄が前 ($20 > 19$)。

表のどこにも、同じ数がありません。4秒後と5秒後の間で追いこしたことはわかりますが、ちょうど何秒後かはわかりません。方程式なら、ぴったり求めます。

$$4t = 9 + 2t \rightarrow 4t - 2t = 9 \rightarrow 2t = 9 \rightarrow t = 4.5$$

答えは4.5秒後です (確かめ: $4 \times 4.5 = 18$ 、 $9 + 2 \times 4.5 = 18$)。

方法	よいところ	こまるところ
表	かけ算とたし算だけでできる	4.5秒のような答えは見のがす
グラフ	ようすが目で見える	細かい値が読みにくい
方程式	いつでもぴったり求まる	ようすは見えにくい

表7 3つの方法をくらべよう。組み合わせると強い。

8 答えを確かめる

方程式を解いたら、解をもとの式に代入して、左辺と右辺が等しくなるか確かめます。途中で符号などをまちがえていたら、ここで気づけます。

$t = 5$ なら、左辺は $4 \times 5 = 20$ 、右辺は $10 + 2 \times 5 = 20$ で等しいので、正しい解です。

答えが場面に合うかも見ます。たとえば、兄が秒速 1.5m しか出せなかったとします。方程式は $1.5t = 10 + 2t$ です。

$$1.5t - 2t = 10 \rightarrow -0.5t = 10 \rightarrow t = 10 \div (-0.5) = -20$$

答えはマイナスの 20 です。時間のマイナスは「スタートより前」を表します (2-2)。もし 2 人がずっと前から走っていたとしたら、20 秒前に同じ場所にい

た、という意味です。でも2人はスタートから走り出したので、そのような時はありません。兄のほうがおそいので、差は1秒に0.5mずつ広がり、これから先は追いつけません。式の答えが出て、場面にもどして意味を考えることが大切です。

🔍 もっと知りたい ★★

解がない方程式

2人とも秒速2mなら、方程式は $2t = 10 + 2t$ です。 $2t$ を移項すると $2t - 2t = 10$ 、つまり $0 = 10$ になります。 t に何を入れても0は10になりません。だから、この方程式には解がありません。場面にもどすと「2人は同じ速さなので、いつまでも10mはなれたまま」です。グラフでは、2本の線が同じかたむきで平行になり、いつまでも交わりません(3-6)。

たいせつ

- ① わからない数を文字にする ② 等しい量で方程式をつくる
- ③ 移項・まとめる・わるを1行ずつ ④ 代入して確かめ、場面に合うか
みる

📖 この章で出てきたことば

方程式 文字に入れる数によって、成り立ったり成り立たなかったりする等式。

解 方程式を成り立たせる数。解を求めることを「方程式を解く」という。

1次方程式 文字の項が「数×文字」だけの方程式。 $ax = b$ の形にして解ける。

れいだい 例題でたしかめよう

れいだい 例題 1 いこう 移項するだけ・わるだけの方程式 ほうていしき

ほうていしき 方程式を解きましょう。(1) $x + 7 = 3$ (2) $5x = -15$

かんが **考え方** (1) は $+7$ を いこう 移項するだけ、(2) は りょうへん 両辺を 5 で こた わるだけです。答えがマイナスになることもあります (2-2)。

しき (1) $x = 3 - 7$ $+7$ を いこう 移項 (2) $x = (-15) \div 5$ りょうへん 両辺を 5 で
 $x = -4$ わる

$x = -3$ マイナス ÷ プラスは
 マイナス

こたえ (1) $x = -4$ (確かめ: $-4 + 7 = 3$) (2) $x = -3$ (確かめ: $5 \times (-3) = -15$)

じぶんでこう 1

ほうていしき 方程式を解き、だいにゅう 代入して たし 確かめましょう。

(1) $x + 8 = 2$ (2) $4x = -28$



ミナ

こた 答えがマイナスでも、あわてなくていいよ。だいにゅう 代入して さへん 左辺と うへん 右辺が ひと 等しくなれば、それが ただ 正しい かい 解なんだ。

例題2 移項して解く

方程式 $5x - 3 = 2x + 9$ を解きましょう。

しき $5x - 3 = 2x + 9$

$$5x - 2x = 9 + 3$$

$$3x = 12$$

$$x = 4$$

+2x と -3 を移項

まとめる

両辺を 3 でわる

考え方

x の項は左辺へ、数の項は右辺へ。移項すると符号が変わる。

こたえ $x = 4$ (確かめ: 左辺 $5 \times 4 - 3 = 17$ 、右辺 $2 \times 4 + 9 = 17$)

じぶんでこう2

方程式 $7x + 2 = 4x + 17$ を解き、代入して確かめましょう。

例題3 かつこのある方程式

方程式 $3(x + 4) = 5x + 2$ を解きましょう。

しき $3(x + 4) = 5x + 2$

$$3x + 12 = 5x + 2$$

$$3x - 5x = 2 - 12$$

$$-2x = -10$$

$$x = 5$$

かっこをはずす

+5x と +12 を移項

まとめる

両辺を -2 でわる

考え方

まず分配法則 (2-12) でかっこをはずす。 x にも 4 にも 3 をかける。 $(-10) \div (-2)$ の答えはプラス (2-2)。

こたえ $x = 5$ (確かめ: 左辺 $3 \times (5 + 4) = 27$ 、右辺 $5 \times 5 + 2 = 27$)

例題 4 小数のある方程式

方程式 $0.3x + 2 = 0.1x + 3$ を解きましょう。

しき $0.3x + 2 = 0.1x + 3$

$$3x + 20 = x + 30$$

$$3x - x = 30 - 20$$

$$2x = 10$$

$$x = 5$$

すべての項に 10 をかける

移項

まとめる

両辺を 2 でわる

考え方

10 倍すると
小数点が右へ 1
つ動く (2-1)。

$0.3 \times 10 = 3$ 。等式

をこわさないよう、

2 や 3 にも 10 をか

ける。

こたえ $x = 5$ (確かめ: 左辺 $0.3 \times 5 + 2 = 3.5$ 、右辺 $0.1 \times 5 + 3 = 3.5$)

じぶんでとこう 3

方程式 $2(x - 3) = x + 4$ を解き、
代入して確かめましょう。

じぶんでとこう 4

方程式 $0.2x + 1 = 0.5x - 2$ を
解き、代入して確かめましょう。

例題5 分数のある方程式

方程式 $\frac{x}{4} + 3 = x - 6$ を解きましょう。

考え方 $\frac{x}{4}$ は $x \div 4$ です (2-12)。4 をかけると $x \div 4 \times 4 = x$ にもどり、分数が消えます。等式をこわさないように、左辺にも右辺にも、すべての項に4をかけます (分配法則)。これを「分母をはらう」といいます。

しき

$$\frac{x}{4} + 3 = x - 6$$

$$\frac{x}{4} \times 4 + 3 \times 4 = x \times 4 - 6 \times 4$$

$$x + 12 = 4x - 24$$

$$x - 4x = -24 - 12$$

$$-3x = -36$$

$$x = 12$$

両辺のすべての項に4をかける

計算する

$+4x$ と $+12$ を移項

まとめる

両辺を -3 でわる

こたえ $x = 12$ (確かめ: 左辺 $12 \div 4 + 3 = 6$ 、右辺 $12 - 6 = 6$)

じぶんでこう5

方程式 $\frac{x}{2} + 4 = x + 1$ を解き、代入して確かめましょう。両辺のすべての項に2をかけてから解こう。

例題 6 追いかけ (単位をそろえる)


分速 60 m で歩く弟を、3 分後に兄が秒速 2.5 m の自転車で追いかけた。兄は出てから何分後に追いつきますか。

① 速さの単位がちがうので、兄の速さを分速にそろえます。1 分は 60 秒なので、60 s/min をかけます (2-10)。

$$2.5 \text{ m/s} \times 60 \text{ s/min} = 2.5 \frac{\text{m}}{\text{s}} \times \frac{60 \cancel{\text{s}}}{1 \text{ min}} = 150 \text{ m/min}$$

s が約分されて、分速 (m/min) になりました。

② 兄が出てから x 分後に追いつくとします。弟は兄より 3 分早く出たので、そのとき弟は $x + 3$ 分歩いています (下の図)。



③ 追いつくときは、2 人が家から進んだ道のりが等しい。道のり = 速さ × 時間です。

しき

$$150x = 60(x + 3)$$

$$150x = 60x + 180$$

$$150x - 60x = 180$$

$$90x = 180$$

$$x = 2$$

兄の道のり = 弟の道のり

かっこをはずす

+60x を移項

まとめる

両辺を 90 でわる

こたえ 2 分後 (確かめ: 兄 $150 \times 2 = 300$ 、弟 $60 \times (2 + 3) = 300$ で、どちらも 300 m)

じぶんでとこう6

普通列車（分速1km）が駅を出た4分後に、特急（分速1.5km）が同じ駅を出ました。特急が出てから何分後に追いつきますか。時間の図をノートにかいてから式をつくろう。

例題7 2つの水そう

水そうAは深さ10cmから毎分2cmずつ深くなり、Bは40cmから毎分1cmずつ浅くなります。深さが同じになるのは何分後で、何cmですか。

考え方 x 分後の深さを式にします。Aは「はじめの10」に「ふえた $2x$ 」をたして $10 + 2x$ 。Bは「はじめの40」から「へった $1 \times x = x$ 」をひいて $40 - x$ 。この2つが等しいとおきます。

しき $10 + 2x = 40 - x$

$$2x + x = 40 - 10$$

$$3x = 30$$

$$x = 10$$

$-x$ と $+10$ を移項

まとめる

両辺を3でわる

こたえ 10分後、30cm（確かめ：A $10 + 2 \times 10 = 30$ 、B $40 - 10 = 30$ ）

じぶんでとこう7

Aは5cmから毎分3cm、Bは25cmから毎分1cmずつ深くなります。深さが同じになるのは何分後で、何cmですか。


例題 8 あまる・たりない

えんぴつを子どもに配ります。1 人 2 本ずつ配ると 5 本あまり、3 本ずつ配ると 4 本たりません。子どもの人数と、えんぴつの本数を求めましょう。

考え方 子どもを x 人として、えんぴつの本数を、2 通りの配り方で表します。

- ・ 2 本ずつ：配った $2x$ 本に、あまりの 5 本をたすと全部。 $2x + 5$
- ・ 3 本ずつ：配るのに $3x$ 本いるのに、4 本たりない。全部は $3x$ より 4 少ない $3x - 4$

えんぴつ全部（どちらも同じ本数）



3 本ずつ配るのに必要な本数 $3x$

しき $2x + 5 = 3x - 4$

$$2x - 3x = -4 - 5$$

$$-x = -9$$

$$x = 9$$

どちらもえんぴつ全部の本数

$+3x$ と $+5$ を移項

まとめる

両辺を -1 でわる

こたえ 9 人、えんぴつは $2 \times 9 + 5 = 23$ で 23 本（確かめ： $3 \times 9 - 4 = 23$ ）

じぶんでとこう 8

折り紙を 1 人 4 枚ずつ配ると 2 枚あまり、6 枚ずつ配ると 10 枚たりません。人数と折り紙の枚数を求めましょう。

例題9 グラフで解く

$y = 2t$ と $y = 6 + t$ のグラフをかき、交わる点を読みとりましょう。また、 $2t = 6 + t$ を解いて、同じ答えになるか確かめましょう。

考え方 ① $t = 0, 1, 2, \dots$ を代入して表を作る ② 点をとる ③ 線でつなぐ ④ 交わる点を読む。

t	0	2	4	6	8
$2t$	0	4	8	12	16
$6 + t$	6	8	10	12	14


$$2t = 6 + t$$

$$2t - t = 6$$

$$t = 6$$

$+t$ を移項

まとめる



こたえ 交わる点は $t = 6$ 、 $y = 12$ 。方程式の解も $t = 6$ で同じ

じぶんでとこう9

$y = 4t$ と $y = 9 + t$ のグラフをノートにかき、交わる点を読みとりましょう。また、 $4t = 9 + t$ を解いて、同じ答えになるか確かめましょう。




デルタ

どの例題も、「わからない数を文字にする→等しい量で式をつくる→移項・まとめる・わる→確かめる」の順だったね。かっこ・分数・小数は、はじめに形を整えよう。

例題 10 向かい合って出会う

家と公園は 900 m はなれています。姉は家から分速 70 m で、弟は公園から分速 80 m で、同じときに向かい合って歩き出しました。2 人は何分後に会いますか。



考え方 x 分後に会おうとします。そのとき、姉が歩いた $70x$ と弟が歩いた $80x$ をつなぐと、ちょうど 900 m になります (図)。追いかけてちがいが、向かい合うときは 2 人とも間をちぢめるので、近づく速さは和の $70 + 80 = 150$ (m/min) です。

しき $70x + 80x = 900$
 $150x = 900$
 $x = 6$

2 人の道のりの和が 900 m
 まとめる
 両辺を 150 でわる

こたえ 6 分後 (確かめ: $70 \times 6 + 80 \times 6 = 420 + 480 = 900$ 。差の考え方でも $900 \text{ m} \div 150 \text{ m/min} = 6 \text{ min}$)

じぶんでこう 10

1200 m はなれた 2 つの場所から、妹は分速 60 m、兄は分速 100 m で、同じときに向かい合って歩き出しました。2 人は何分後に会いますか。

⚠ まちがえやすいところをチェック

⚠ まちがえやすいところ

移項で符号を変えない

✕ $4t = 10 + 2t$ から $4t + 2t = 10$

○ $4t = 10 + 2t$ から $4t - 2t = 10$

移項は「両辺から $2t$ をひく」ことです。まちがえたまま $6t = 10$ で解くと $t = \frac{5}{3}$ になり、代入すると左辺 $4 \times \frac{5}{3} = \frac{20}{3}$ 、右辺 $10 + 2 \times \frac{5}{3} = \frac{40}{3}$ で等しくなりません。確かめをすれば、まちがいに気づけます。

⚠ まちがえやすいところ

マイナスでわるとき、符号をまちがえる

✕ $-2x = -10$ から $x = -5$

○ $-2x = -10$ から $x = (-10) \div (-2) = 5$

マイナスどうしのわり算の答えはプラスです (2-2)。係数の -2 でわるときは、符号もいっしょにわります。

⚠ まちがえやすいところ

かっこの後ろの項にかけわすれる

✗ $3(x + 4) = 3x + 4$

○ $3(x + 4) = 3x + 12$

かっこの中のどの項にも 3 をかけます (2-12)。たて 3、横 $x + 4$ の長方形の面積で考えると、横の x の部分も 4 の部分もたてが 3 なので、まちがえません。

⚠ まちがえやすいところ

ぶん ぼ 分母をはらうとき、いち ぶ 一部の項にしかかけない

✗ $\frac{x}{4} + 3 = x - 6$ から $x + 3 = 4x - 24$

○ $\frac{x}{4} + 3 = x - 6$ から $x + 12 = 4x - 24$

両辺に 4 をかけるときは、分数でない項 (3) にも 4 をかけます。てん びん の両方の皿の物を、ぜん ぶ 全部 4 倍にするのと同じです。

⚠ まちがえやすいところ

「たりない」をたしてしまう

✗ 3 本ずつ配ると 4 本たりない → えんぴつは $3x + 4$

○ 3 本ずつ配ると 4 本たりない → えんぴつは $3x - 4$

たりないのは、配るのに必要な $3x$ 本より、持っている本数が少ないということです。テープの図をかくと、まちがえません。

物理・工学ではこう使う

自動ブレーキ

車の自動ブレーキは、カメラやレーダーで前の車までの距離と速さをはかり、「このままだと、あと何秒で追いつくか（ぶつかるか）」を計算しています。

自分の車が時速 72 km、30 m 先の車が時速 54 km で走っているとします。距離は m なので、速さも秒速 (m/s) にそろえます。1 km は 1000 m なので 1000 m/km、1 時間は 3600 秒なので 3600 s/h を使います (2-10)。

$$72 \text{ km/h} \times 1000 \text{ m/km} \div 3600 \text{ s/h} = \frac{72 \times 1000}{3600} \text{ m/s} = 20 \text{ m/s}$$

$$54 \text{ km/h} \times 1000 \text{ m/km} \div 3600 \text{ s/h} = \frac{54 \times 1000}{3600} \text{ m/s} = 15 \text{ m/s}$$

km どうし、h どうしが約分されて、m/s が残ります。t 秒後に追いつくとすると、

$$20t = 30 + 15t \rightarrow 20t - 15t = 30 \rightarrow 5t = 30 \rightarrow t = 6$$

このままだと 6 秒でぶつかるので、車は早めに音で知らせたり、ブレーキをかけたりします。本物の車は、この計算を 1 秒に何十回もくり返しています。





図6 距離と速さから、追いつくまでの時間を計算する。

ぶつり こうがく つか
物理・工学ではこう使う

でんしゃ
電車のダイヤ

てつどう かいしゃ よこ じこく えき い
鉄道の会社は、横に時刻、たてに駅の位
ち
置をとったグラフ（ダイヤグラム）で運
こう けいかく せん まじ ところ とつきゅう
行を計画します。線が交わる所が、特急
が普通列車に追いつく所です。線路が1
ぼん ところ お
本の所で追いついてはこまるので、その
まえ ふつうれっしゃ えき ま とつきゅう
前に普通列車を B 駅で待たせて、特急
に先へ行ってもらいます（横に平らな
せん と ま
線が「止まって待つ」）。



だいがく たね
大学への種

ひょう ためして こと ちか ほうほう はや て と
表でためして答えに近づく方法は、コンピュータで速くすると、手では解
けない ほうていしき と つよ どうぐ になります (2-19、6-2)。大学では「数値
けいさん まな
計算」として学びます。また、でんき かいろう では、わからない でんりゅう
も 文字にして、ほうていしき なんぼん と れんりつほうていしき
も文字にして、方程式を何本もいっしょに解きます（連立方程式、3-6）。

🔍 コラム 「方程式」といふことば

ほうていしき
「方程式」は、2000 年ほど前の中国の算数の本『九章算術』にある「方
てい しょう な まえ き ほん かず し かく けい
程」という章の名前から来ています。この本では、数を四角くならべて計
さん ほう し かく てい
算していました。「方」は四角くならべること、「程」はくらべてはかるこ
とを表す、といわれています。むかしの人も、わからない数を求めるため
に、おな くふう していたのです。



しょうまつもんだい
章末問題

2-16 のまとめ

きほん
基本



1 つぎ ほうていしき と
次の方程式を解きましょう。

(1) $x + 9 = 4$ (2) $6x = -18$ (3) $3x - 4 = x + 8$

(4) $2(x + 5) = 4x$ (5) $\frac{x}{3} + 2 = x - 4$ (6) $0.4x - 1 = 0.1x + 2$

2 2、3、4のうち、方程式 $5x - 4 = 2x + 5$ の解はどれですか。代入して確かめましょう。

3 いもうと いえ で ふんご あね じてんしゃ お いもうと ふんそく
妹が家を出て5分後に、姉が自転車で追いかけてきました。妹は分速70m、
姉は秒速3.5mです。姉は出てから何分後に追いつきますか。

4 みず
水そうAには20Lの水があり、毎分4Lずつ入れます。Bには80Lあり、毎分2Lずつ出します。水の量が同じになるのは何分後で、何Lですか。

5 $y = 3t$ と $y = 12 + t$ のグラフをノートにかき、交わる点を読みとりましょう。また、 $3t = 12 + t$ を解いて、同じ答えになるか確かめましょう。





図7 ノートにかくグラフの例。 $t = 0, 1, 2$ の点をとったところ。続きをかこう。

チャレンジ ★★

6 40 m 先を 15 m/s で走る車に、25 m/s で近づいています。同じ速さのままだと、何秒後に追いつきますか。方程式と、「差がちちまる速さ」の 2 つの方法で求めましょう。



7 あめを 1 人 3 個ずつ配ると 8 個あまり、5 個ずつ配ると 6 個たりません。人数を x 人として方程式をつくり、人数とあめの数を求めましょう。

8 兄は秒速 3 m、10 m 先の弟も秒速 3 m で同じときに走り出しました。 $3t = 10 + 3t$ を解こうとすると、どうなりますか。それは場面では何を表していますか。

✓ ふりかえり できるようになったかな？

- ☐ 方程式をつくり、表でためして解をさがせる。 → 338 ページ
- ☐ 1 次方程式を 1 行ずつ解ける。 → 341 ページ
- ☐ 表・グラフ・方程式で解き、確かめられる。 → 342 ページ




ソラ

表でもグラフでも方程式でも、答えは 5 秒。方程式なら、4.5 秒のよ
うな答えもぴったり出るね。

コンピュータで^{けいさん}計算

- ? 0と1だけで、どんな^{かず}数も^か書ける?
- ? 1000^{かい}回の^{けいさん}計算も、コピー^{かい}1回でできる?
- ? 0.1を^{かい}10回たしても、1にならない?

1	0	1	1



コンピュータは、0と1だけで^{かず}数を覚えていて、くり返し^{かえ}の^{けい}計算^{さん}がとても得意だよ。^{とく}表計算^{ひょうけいさん}とプログラムで、^{けい}たくさんの^{さん}計算をコンピュータにまかせ^{ほうほう}る方法を^{まな}学ぶよ。

この部^ぶで学^{まな}ぶこと

2-17 コンピュータの数^{かず}: 2 進数^{しんすう}と 16 進数^{しんすう}

×2 ★★★★★ P.362

0 と 1 だけで、どんな数^{かず}も書^かける

2-18 表計算^{ひょうけいさん}で計算^{けいさん}しよう

田★★★★★ P.386

1000 回^{かい}の計算^{けいさん}も、コピー 1 回^{かい}で

2-19 プログラムで計算^{けいさん}しよう

△★★★★★ P.406

0.1 を 10 回^{かい}たしても、1 にならない?

この部^ぶを読^よむと…

表計算^{ひょうけいさん}とプログラムで、くり返し^{かえ}の計算^{けいさん}や、表^{ひょう}からグラフ^{つく}を作る作業^{きぎょう}ができるようになります。

このあとの巻^{かん}では、むずかしい計算^{けいさん}をコンピュータで確^{たし}かめなが^{すす}ら進みます。

2-17

コンピュータの数： 2進数と16進数

道しるべ この章の前に 1-2 2-7 この章の先に 2-19 3-11

この章でできるようになること

- ★★ 2進数の位が $1 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 8 \cdots$ であることを使って、2進数と10進数を行き来できる。
- ★★ ビットの数から、何通りの数を表せるかを計算できる。
- ★★ 2進数を4けたずつまとめて、16進数で書ける。

? はてな?

ランプが4つならんでいます。どのランプも、「つく」か「消える」かの2通りしかありません。

ランプのつき方で、数を表すことにします。4つのランプで、ちがう数を何通り表せるかな? 4通り? 8通り? それとも、もっと?



コンピュータの中には、「5」や「7」の形をした部品はありません。あるのは、電気を流すか流さないかを切りかえる、とても小さなスイッチ（トランジスタという部品）だけです。スマホの頭脳にあたる部品には、このスイッチが何十億こ

も入っています。スイッチのオンとオフだけで、どうやって数を表しているのでしょうか。この章では、コンピュータの数の書き方を調べます。

やってみよう 点のカードで数を作ろう

厚紙で5枚のカードを作り、16こ・8こ・4こ・2こ・1この点をかきます。左から点の多い順にならべ、表（点が見える面）か裏かを決めて、見えている点を数えます。




図1 表を1、裏を0と書くと、13は「01101」になる。

- 1 表と裏をいろいろ変えて、見えている点の数を数えよう。
- 2 6を作るには、どのカードを表にすればよいか？ 20では？
- 3 0から31まで、どの数でも作れるかな？ 作り方は1通りだけかな？

思い出そう この章で使う、前に学んだこと

- 1-2 10 あつまったらたばねて、1つ左の位へ。234は、100が2つ、10が3つ、1が4つ。
- 2-7 $2^1 = 2$ 、 $2^2 = 4$ 、 $2^3 = 8$ 、 $2^4 = 16$ 。 $2^0 = 1$ 。指数が1ふえるごとに2倍。
 $2^{10} = 1024$ はほぼ1000。
- 2-7 かけ算は指数をたす： $2^3 \times 2^4 = 2^7$
- 2-6 四捨五入：求める位の1つ下が0~4なら切り捨て、5~9なら切り上げ。

数学の道具

① 10進数のしくみを見なおす：10進数

ふだん使う数は、0～9の10種類の数字で書きます。9の次は、数字が足りなくなるので、1つ左の位に1を立てて「10」と書きます。1が10あつまったら、1つ左の位の1になるのです（1-2）。




図2 234のしくみ。位の大きさは、1つ左へ進むごとに10倍（ $1 \cdot 10 \cdot 100$ ）。

1が10こで10、10が10こで $10 \times 10 = 100$ 、100が10こで1000です。だから位の大きさは、右から $1 \cdot 10 \cdot 100 \cdot 1000 \dots$ と、1つ左へ進むごとに10倍になります。2-7の書き方では、 $10^0 \cdot 10^1 \cdot 10^2 \cdot 10^3 \dots$ です。

このように、10あつまるとに1つ左の位へ上がる書き方を10進数といいます。「10進」は「10で次の位へ進む」という意味です。

② 2あつまったら、1つ左の位へ

ランプには「消える」と「つく」の2種類しかありません。数字にすると、0と1の2つだけです。そこで、消えるを0、つくを1として、2あつまったら1つ左の位へ上がることにします。

10進数で9の次が「10」になったのと同じです。0と1しか使えないので、1の次で数字が足りなくなり、1つ左の位に1を立てて「10」と書きます。0から順に数えてみましょう。

10進数	8	4	2	1	2進数	10進数	8	4	2	1	2進数
0	○	○	○	○	0	8	●	○	○	○	1000
1	○	○	○	●	1	9	●	○	○	●	1001
2	○	○	●	○	10	10	●	○	●	○	1010
3	○	○	●	●	11	11	●	○	●	●	1011
4	○	●	○	○	100	12	●	●	○	○	1100
5	○	●	○	●	101	13	●	●	○	●	1101
6	○	●	●	○	110	14	●	●	●	○	1110
7	○	●	●	●	111	15	●	●	●	●	1111

図3 ランプで0から15まで数える。色のついた行で、1つ左の位に上がる。

くり上がりのようす 3 (11₍₂₎) に1をたすと、右の位は1 + 1 = 2 になりますが、2 という数字はありません。2 あつまったので0 にして、1つ左へくり上げます。すると左の位も 1 + 1 = 2 になるので、また0 にしてくり上げます。こうして 100₍₂₎ になります。10 進数の 99 + 1 = 100 と同じ動きです。

	計算	おこしていること
10進数	999 + 1 = 1000	どの位も「9 + 1 = 10」で0になり、くり上がる
2進数	111 ₍₂₎ + 1 = 1000 ₍₂₎	どの位も「1 + 1 = 2」で0になり、くり上がる

表1 10進数は10で、2進数は2で、くり上がる。

位の大きさは、なぜ1・2・4・8？ 新しい位に1が立つのは、2・4・8のときでした（表の色のついた行）。正方形のブロックで確かめましょう。1のブロックが2つで「2のまとまり」、2のまとまりが2つで「4のまとまり」、4のまとまりが2つで「8のまとまり」になります。




図4 2つずつまとめていくと、まとまりの大きさは1・2・4・8・16…と2倍ずつになる。

だから2進数の位の大きさは、右から $1 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 8 \cdot 16 \dots$ 。1つ左へ進むごとに2倍で、 2^0 、 2^1 、 2^2 、 2^3 、 $2^4 \dots$ です(2-7)。10進数の「10倍ずつ」が、「2倍ずつ」に変わっただけです。

右から何番目	8	7	6	5	4	3	2	1
位の大きさ	128	64	32	16	8	4	2	1
2の累乗	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0

表2 2進数の位の大きさ。左へ1つ進むごとに2倍。

このように、2あつまるごとに1つ左の位へ上がる書き方を2進数といいます。1011₍₂₎のように右下に(2)をつけて、10進数と区別します。読むときは「いち・ゼロ・いち・いち」と、1けたずつ読みます。

2進数の10₍₂₎は「じゅう」ではありません。「2が1つ、1が0こ」で、2のことです。

②はてな? の答え: 4つのランプは、0000から1111までの16通り(0~15)を表せます。②はてな? のランプは「つく・消える・つく・つく」で1011₍₂₎なので、 $8 + 2 + 1 = 11$ を表しています。

3 2進数と10進数を行き来する

2進数 → 10進数

1が立っている位の大きさを、たします。234を $200 + 30 + 4$ と考えたのと同じです。

位	1011 ₍₂₎	位 × 数字
8	1	8
4	0	0
2	1	2
1	1	1

$$8 + 0 + 2 + 1 = 11$$

10進数 → 2進数

大きい位から順に、使えたらひきます（やってみようのカードを、大きい順に表にするか決めていくのと同じ）。

位	13の残りから使える？	数字
8	使う：13 - 8 = 5	1
4	使う：5 - 4 = 1	1
2	使わない（2は残りの1より大きい）	0
1	使う：1 - 1 = 0	1

上から読んで $13 = 1101_{(2)}$

なぜ大きい位から？ 16より小さい数なら、 $8 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 1$ を1つずつ使えば、どれでも作れます（ $8 + 4 + 2 + 1 = 15$ まで）。だから、使える中でいちばん大きい8を先に使っておけば、残りは必ず小さい位で作れます。もし大きい8を使わずに残すと、 $4 \cdot 2 \cdot 1$ を全部使っても7にしかならず、13には届きません。2進数では、どの位も「使う（1）」か「使わない（0）」かのどちらかで、2回使うことはありません。

残りが0になれば、できあがりです。確かめは、左の方法で10進数にもどします。 $1101_{(2)}$ は $8 + 4 + 0 + 1 = 13$ で、もとの13にもどりしました。

やってみよう の答え：6は点4こと2このカード（ $4 + 2$ ）、20は16こと4このカード（ $16 + 4$ ）を表にします。0から31まで、どの数もちょうど1通りで作れます（31は全部表で $16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 31$ ）。

もっと知りたい ★★

2でわっていく方法

10進数を2進数にするには、2でわってあまりを書く方法もあります。13なら、

わり算	あまり	意味
$13 \div 2 = 6$ あまり 1	1	1の位は1 (13は奇数)
$6 \div 2 = 3$ あまり 0	0	2の位は0
$3 \div 2 = 1$ あまり 1	1	4の位は1
$1 \div 2 = 0$ あまり 1	1	8の位は1

あまりを下から上へ読むと $1101_{(2)}$ です。最初のあまりが1の位になるのは、 $2 \cdot 4 \cdot 8 \dots$ の位がどれも2でわり切れるので、2でわったあまりは1の位からしか出ないからです。商の6は「2のまとまりが6こ」という意味で、それをまた2つずつまとめると4のまとまりの数がわかります。

4 ビットの数と、何通り

2進数の1けた(0か1か)をビットといいます。ランプ1つが1ビットです。ランプを1つふやすと、何通りになるかな？




図5 ビットを1つふやすと、前のならびの左に0か1をつけるので、2倍になる。

なぜ2倍なのでしょう。2ビットの4通り（00、01、10、11）の左に、新しいランプをつけます。新しいランプが0のときに4通り、1のときにも4通りあるので、 $4 + 4 = 4 \times 2 = 8$ 通りです。ランプを1つふやすたびに、前の通りの数が「0のとき」と「1のとき」の2組になるので、2倍になります。

だから、ビットの数だけ2をかけます。4ビットなら $2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^4 = 16$ 通りです（**？はてな？**の答えと同じ）。

ビットの数	1	2	3	4	5	6	7	8	10	16
何通り	2	4	8	16	32	64	128	256	1024	65536

表3 1ビットふえると2倍。nビットで2^n通り。

8ビットをまとめて1バイトといいます。1バイトで表せるのは $2^8 = 256$ 通りです。0から数えはじめるので、0から255までの数になります（いちばん大きい数は、通りの数より1小さい）。

細かさ

デジタルのはかりや温度計は、はかった量を何ビットかの数で覚えます。たとえば16cmのはばを、表せる通りの数で等しく分けます。ビットが1つふえると区切りの数が2倍になるので、1段階の大きさは半分になります。



1 段階の大きさは、「はば÷段階の数」です。16 cm を 4 つに分ければ $16 \div 4 = 4$ で 4 cm、16 に分ければ $16 \div 16 = 1$ で 1 cm です。計器が見分けられるいちばん小さいちがい（1 段階の大きさ）を**分解能**といいます。8 ビット（256 段階）なら、

$$16 \text{ cm} \div 256 = 0.0625 \text{ cm}$$

で、0.0625 cm（約 0.6 mm）のちがいまで見分けられます。ビットをふやすほど細かくはかれますが、覚える数のけたは長くなります。

5 4 けたずつまとめる：16 進数

2 進数は、けたがすぐ長くなります。255 は $11111111_{(2)}$ で 8 けたもあり、人が読み書きすると見まちがえやすくなります。そこで、右から 4 けたずつ区切って、4 けたを 1 文字で書くことにします。

なぜ 4 けたずつ？ 2 進数の 4 けたは、ビットの表より $2^4 = 16$ 通り（0000 ~ 1111、つまり 0~15）です。だから、16 種類の文字を用意すれば、4 けたをちょうど 1 文字で表せます。0~9 のほかに、10~15 を 1 文字で書く数字はないので、アルファベットの A~F を使います（A が 10、B が 11、…、F が 15）。

10 進数	0	1	2	3	4	5	6	7
2 進数	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111
16 進数	0	1	2	3	4	5	6	7
10 進数	8	9	10	11	12	13	14	15
2 進数	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
16 進数	8	9	A	B	C	D	E	F

表 4 2 進数 4 けたが、16 進数の 1 けたになる。

16 あつまるとに 1 つ左の位へ上がる書き方を **16 進数**といいます。F の次（15 の次）は、1 つ左の位に 1 が立って「10」になります。だから位の大きさは、右から $1 \cdot 16 \cdot 16 \times 16 = 256 \cdots$ です。

なぜ右から区切るの？ 1の位は右のはしにあるからです。右の4けた（1・2・4・8の位）が16進数の1の位に、その左の4けた（16・32・64・128の位）が16の位になります。左のはしが4けたにならないときは、左に0をつけてそろえます（101101₍₂₎ は 0010 | 1101）。

255 を 16進数にしてみましょう。

$$11111111_{(2)} \rightarrow \underbrace{1111}_F \underbrace{1111}_F \rightarrow FF_{(16)}$$

確かめに10進数へもどします。16の位がF（15）、1の位がF（15）なので、

$$FF_{(16)} = 16 \times 15 + 1 \times 15 = 240 + 15 = 255$$

8けたの2進数が、たった2けたで書けました。1バイト（8ビット）は、16進数でちょうど2けたです。

6 色の番号と、組み合わせの数

スマホの画面を虫めがねで見ると、赤・緑・青の小さな光がならんでいます。この3色の明るさを変えて混ぜると、いろいろな色に見えます。それぞれの明るさを1バイト(0~255)で決めます。1バイトは16進数で2けたなので、赤・緑・青の順に2けたずつならべて、色を#FF8000のように6けたで書きます。

赤		FF → 255
緑		80 → 128
青		00 → 0
		#FF8000

#FF8000 を読んでみましょう。前から2けたずつ区切ると、FF・80・00です。

- 赤：FF₍₁₆₎ = 16 × 15 + 15 = 255 (いちばん明るい)
- 緑：80₍₁₆₎ = 16 × 8 + 0 = 128 (半分くらいの明るさ)
- 青：00₍₁₆₎ = 0 (光らない)

赤がいっぱいで緑が半分なので、だいたい色に見えます。

全部で何色？ 赤・緑・青がそれぞれ256通りのとき、色は全部で何通りでしょう。数が大きいので、まず赤と緑だけで、それぞれ「消える・光る」の2通りのときを考えます。




図6 赤2通り × 緑2通り。表のますの数が、組み合わせの数。

赤の1通りごとに、緑の通りが全部ある（表の1行ごとに列が全部ある）ので、組み合わせの数はかけ算になります。ビットの数で2倍ずつふえたのも、同じ理由です。青もあれば、さらにかけます。それぞれ256通りなら、

$$256 \times 256 \times 256 = 2^8 \times 2^8 \times 2^8 = 2^{24} = 16777216$$

で、約1678万通りの色を表せます（ $2^8 \times 2^8 \times 2^8$ は指数をたして 2^{8+8+8} 、2-7）。1つの点の色に、 $8 \times 3 = 24$ ビットを使っています。

たいせつ

2進数：2あつまったら1つ左の位へ。位は右から1・2・4・8・16…（2倍ずつ）

ビットが1つふえると2倍。 n ビットで 2^n 通り。8ビット（1バイト）で256通り（0～255）

2進数 4けたが、**16進数** 1けた（0～9、A～F）。組み合わせの数はかけ算

この章で出てきたことば

10進数・2進数・16進数 10・2・16あつまったら、1つ左の位へ上がる書き方。

ビット・バイト 2進数の1けたが1ビット。8ビットをまとめて1バイト。

分解能 計器が見分けられる、いちばん小さいちがひ。

記号カード

初めて出た章 2-17

10₍₂₎

読み方 いち・ゼロ
意味 2進数で書いた数。10₍₂₎
は2のこと。
英語 binary number

記号カード

初めて出た章 2-17

FF₍₁₆₎

読み方 エフ・エフ
意味 16進数で書いた数。
FF₍₁₆₎ は255のこと。
英語 hexadecimal number

例題でたしかめよう

例題 1 2進数を10進数に

11010₍₂₎ を10進数になおしましょう。

考え方 5けたなので、位は右から1・2・4・8・16。位の大きさと数字をかけて、たします。

しき

位	16	8	4	2	1
数字	1	1	0	1	0

$$16 \times 1 + 8 \times 1 + 4 \times 0 + 2 \times 1 + 1 \times 0 = 16 + 8 + 2 = 26$$

こたえ 26

じぶんでところ1

100110₍₂₎ を10進数になおしましょう。6けたなので、いちばん左の位は32です。



ソラ

2進数→10進数は、位の大きさを表に書いて、1が立っている位だけたせばいいんだね。0の位はたさなくていいよ。

例題2 10進数を2進数に

45 を2進数になおしましょう。

考え方 $1 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 8 \cdot 16 \cdot 32 \cdot 64 \cdots$ のうち、45より小さくていちばん大きいのは32（64は45より大きい）。32の位から順に、使えたらひきます。

しき 32を使う： $45 - 32 = 13$ 。16は使わない（ $16 > 13$ ）。8を使う： $13 - 8 = 5$

4を使う： $5 - 4 = 1$ 。2は使わない（ $2 > 1$ ）。1を使う： $1 - 1 = 0$

位	32	16	8	4	2	1
数字	1	0	1	1	0	1

こたえ $101101_{(2)}$ （確かめ： $32 + 8 + 4 + 1 = 45$ ）

じぶんでこう2

27 を2進数になおしましょう。

コラム 片手で31まで数えられる

指1本を1ビットと考えます。右手の親指を1、人差し指を2、中指を4、薬指を8、小指を16の位にして、立てた指を1、曲げた指を0とします。全部立てると $16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 31$ 。片手5本で $2^5 = 32$ 通り、0から31まで数えられます。両手10本なら $2^{10} = 1024$ 通りで、0から1023までです。友だちと、指で数を伝え合ってみよう。

 例題3 ビットの数と1段階の大きさ

0℃から64℃までのばを、8ビットの数で等しく分けて表す温度計があります。(1) 何段階ですか。(2) 1段階は何℃ですか。

考え方 1ビットごとに2倍なので、8ビットは2を8回かけます。ばを段階の数だけの小さなばに等しく区切り、下から順に0、1、2、…と数を1つずつわりあてます。だから1段階の大きさは、ば÷段階の数です。

しき (1) $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^8 = 256$

(2) はばは $64 - 0 = 64$ で64℃。 $64 \div 256 = 0.25$

こたえ (1) 256段階 (2) 0.25℃

いちばん上の段階(数は255)は、63.75℃から64℃までのばです。

 じぶんでこう3

0gから512gまでのばを、10ビットの数で等しく分けて表す電子はかりがあります。(1) 何段階ですか。(2) 1段階は何gですか。

例題4 わり切れないときは四捨五入

0V から 10V までの電圧を、8 ビットの数で等しく分けて表します。1 段階は何 V ですか。小数 第 5 位を四捨五入して答えましょう。

考え方 8 ビットは 256 段階。10 ÷ 256 はわり切れるまで長いので、小数 第 5 位を見て四捨五入します (2-6)。

しき $10 \div 256 = 0.0390625$

小数 第 5 位は 6 (0.0390625)。5～9 なので切り上げて 0.0391

こたえ 約 0.0391 V

じぶんでとこう 4

0V から 3V までの電圧を、10 ビットの数で等しく分けて表します。1 段階は何 V ですか。小数 第 5 位を四捨五入して答えましょう。

例題5 16進数で書く

10110100₍₂₎ を 16 進数で書き、10 進数にもなおしましょう。

考え方 右から 4 けたずつ区切り、4 けたごとに 10 進数にしてから、10～15 なら A～F にします。16 進数の位は右から 1・16。

しき 1011 | 0100

左の 4 けた：1011₍₂₎ = 8 + 2 + 1 = 11 で B

右の 4 けた：0100₍₂₎ = 4 で 4

$$B4_{(16)} = 16 \times 11 + 1 \times 4 = 176 + 4 = 180$$

こたえ B4₍₁₆₎、180

じぶんでとこう5

11100101₍₂₎ を 16 進数で書き、10 進数にもなおしましょう。

例題6 色の番号を読む

色の番号「#40C0FF」の赤・緑・青の明るさを、それぞれ 10 進数で答えましょう。

考え方 前から 2 けたずつ、赤・緑・青。どれも 16 進数 2 けたなので、16 の位 $\times$ 16 + 1 の位。C は 12、F は 15 です。

しき 赤 $40_{(16)} = 16 \times 4 + 0 = 64$ 緑 $C0_{(16)} = 16 \times 12 + 0 = 192$
青 $FF_{(16)} = 16 \times 15 + 15 = 255$

こたえ 赤 64、緑 192、青 255 (明るい水色)

じぶんでとこう6

色の番号「#2080A0」の赤・緑・青の明るさを、それぞれ 10 進数で答えましょう。

例題7 組み合わせの数

古いゲーム機には、赤・緑・青の明るさを、それぞれ2ビットで決めるものがありました。全部で何通りの色を表せますか。

考え方 2ビットは $2^2 = 4$ 通り。赤の1通りごとに緑が4通り、その1通りごとに青が4通りあるので、かけ算です。

しき $4 \times 4 \times 4 = 64$ (ビットで考えると $2 + 2 + 2 = 6$ ビットで $2^6 = 64$)

こたえ 64 通り

じぶんでどう?

赤・緑・青の明るさを、それぞれ4ビットで決めると、全部で何通りの色を表せますか。

例題8 1分間に記録する数 (単位つきで換算)

音楽CDは、1秒あたり44100回、音の大きさをはかって数にしています。1分間の曲では、何回はかっていますか。

考え方 「1秒あたり44100回」は単位つきの量で、44100回/sと書けます。時間を秒にそろえるために、1分を60s/minで秒にしてから(2-10)、44100回/sをかけます。

しき $1 \text{ min} \times 60 \text{ s/min} = 1 \text{ min} \times \frac{60 \text{ s}}{1 \text{ min}} = 60 \text{ s}$

$$60 \text{ s} \times 44100 \frac{\text{回}}{\text{s}} = 60 \text{ s} \times 44100 \frac{\text{回}}{\text{s}} = 2646000 \text{ 回}$$

こたえ 2646000 回 (約 265 万回)

 じぶんでところ 8

どう が びょう
動画は、1 秒あたり 30 枚の絵をつぎつぎに見せています。2 分間の動画
ふんかん どう が
には、絵が何枚ありますか。単位つきの式で求めましょう。

⚠ まちがえやすいところをチェック

⚠ まちがえやすいところ

くらい おお
位の大きさを $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4$ とする

✕ $1011_{(2)} = 4 \times 1 + 3 \times 0 + 2 \times 1 + 1 \times 1 = 7$

○ $1011_{(2)} = 8 \times 1 + 4 \times 0 + 2 \times 1 + 1 \times 1 = 11$

2進数の位は、1ずつふえるのではなく、左へ1つ進むごとに2倍になります（ $1 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 8$ ）。

⚠ まちがえやすいところ

8ビットで「0～256」とする

✕ 8ビットで表せるいちばん大きい数は256

○ 8ビットは256通り。0から数えるので、いちばん大きい数は255

4ビットで確かめると、0～15の16通りでした。いちばん大きい数は、通りの数より1小さくなります。

⚠ まちがえやすいところ

16進数に区切るとき、左から区切る

✕ $101101_{(2)}$ を $1011 | 01$ と区切って $B1_{(16)}$

○ $101101_{(2)}$ を $0010 | 1101$ と区切って $2D_{(16)}$

1の位は右のはしなので、右から区切ります（どちらも $45 : 16 \times 2 + 13 = 45$ ）。

物理・工学ではこう使う

センサーの値を数にする

温度センサーは、温度を電圧に変える部品です。電圧はなめらかに変わりますが、コンピュータは何ビットかの数しか覚えられません。そこで、電圧をいちばん近い段階の数に置きかえます。




図7 3ビット（8段階）では、なめらかな変化が階段になる。ビットをふやすと、階段が細くなる。

● マイコンボード

電子工作用の小さなコンピュータには、0V～5Vを10ビット（1024段階）の数にするものがあります。

● 音楽のデータ

音楽CDは、音の大きさを16ビット（65536段階）の数にして、1秒あたり44100回記録しています（例題で計算したように、1分で264万回あまり）。

大学の工学では、量を段階の数にすることを「AD変換」とよび、ビットの数と細かさの関係から計器を設計します。

なぜ2進数？

0～9Vの10段階で10種類の数字を表すと、雑音で3Vが3.6Vにずれただけで4とまちがえます。「高い（1）」「低い（0）」の2種類なら、少しずれてもまちがえません。だからコンピュータは2進数を使うのです。

しょうまつもんだい
章末問題

2-17 のまとめ

きほん
基本


1 ランプ（つく = 1、消える = 0）が表している2進数を書き、10進数になおしましょう。

(1)  (2)  (3) 

2 2進数になおしましょう。(1) 7 (2) 18 (3) 50

3 何通りの数を表せますか。(1) 5ビット (2) 12ビット

4 0 cm から 128 cm までのはばを、8ビットの数で等しく分けて表す距離センサーがあります。1段階は何 cm ですか。



5 $11110000_{(2)}$ を16進数で書き、10進数にもなおしましょう。

6 色の番号「#80FF00」の赤・緑・青の明るさを、それぞれ10進数で答えましょう。



#80FF00 の色（黄緑）

チャレンジ ★★

- 7 1バイトで表せるいちばん大きい数を、2進数・16進数・10進数で書きましょう。
- 8 マイコンボードは、0Vから5Vまでのはばを、10ビットの数で等しく分けて表します。1段階は何Vですか。小数第5位を四捨五入して答えましょう。
- 9 スマホの画面の点は、赤・緑・青をそれぞれ8ビットで決めます（色の番号→372ページ）。（1）1つの点の色は、全部で何ビットですか。（2）何通りの色を表せますか。
- 10 音楽CDは、1秒あたり44100回、音の大きさを記録します。3分間の曲では、何回記録しますか。単位つきの式で求めましょう。
- 11 $1111_{(2)}$ に1をたすと、2進数でどうなりますか。10進数にもなおして確かめましょう。

✓ ふりかえり できるようになったかな？

- ☐ 2進数と10進数を行き来できる。 → 367ページ
- ☐ ビットの数から、何通りの数を表せるかを計算できる。 → 368ページ
- ☐ 2進数を4けたずつまとめて、16進数で書ける。 → 370ページ



ミナ

0と1だけで、どんな数も書けたね。次の2-18では、たくさんの計算をコンピュータにまかせる方法を学ぶよ。

メモ

Handwriting practice area with horizontal dashed lines.

2-18

ひょうけいさん けいさん
表計算で計算しよう

この章の先に 1-18 2-11 2-13 この章の先に 5-8 6-2

この章でできるようになること

- ★★ セルの番地を使って「=」で始まる式を書き、式をコピーして同じ計算をくり返せる。
- ★★ ずらしたくない番地に \$ をつけて使える。
- ★★ 上の行の結果を使って下の行を計算し、表とグラフで変わり方を調べられる。

? はてな?

お年玉の 3000 円を貯金箱に入れ、毎月 500 円ずつ入れていきます。ちょうど 10000 円になるのは、何か月後かな? 10 年後には、いくらになるかな?



10 年は 120 か月です。電卓で 1 か月ずつたしていくと、120 回もたし算をすることになります。

1つ1つは同じ「500をたす」計算です。同じ計算を何百回もくり返すのは、人には大変ですが、コンピュータには得意なことです。この章では、表計算ソフトを使って、くり返しの計算をコンピュータにまかせる方法を学びます。

△ やってみよう 表計算ソフトに計算させよう

タブレットやパソコンで表計算ソフトを開きます。画面は、たとと横に線を引いた大きな表です。

- ① A列の1行目(A1)に3、2行目(A2)に5を入れよう。
- ② A3に「=A1+A2」と入れて、Enterキーをおそう。A3には何が出るかな？
- ③ A1を10に変えよう。A3はどうなるかな？

A3	fx	=A1+A2
----	----	--------

	A
1	3
2	5
3	8

A1を10に
変えたと
→

	A
1	10
2	5
3	15

図1 A3には式の答えが出る。A1を変えると、A3の答えも自動で変わる。

A3には3+5の答え8が出ます。A1を10に変えると、A3は何もしなくても10+5=15に変わります。A3には「8」という数ではなく、「A1とA2をたす」という計算のしかたが入っているからです。画面の上の細長い欄(式の欄)を見ると、A3に入っている式が見えます。

思い出そう この章で使う、前に学んだこと

- 1-18** おれ線グラフにすると、変わり方がひと目でわかる。
- 2-11** 計算の順番：かっこの中が先。×÷は+-より先。 $2 + 3 \times 4 = 14$,
 $(2 + 3) \times 4 = 20$
- 2-13** 式の文字に数を入れると、式の値が出る（代入）。
- 2-5** 5%は0.05、10%は0.1。もとにする量の5%は、もとにする量 $\times$ 0.05。
- 2-10** 1時間あたり60分で60 min/h。1時間あたり3600秒で3600 s/h。1 km
 あたり1000 mで1000 m/km。

数学の道具

① セルと番地、「=」で始まる式

表計算の表の、1つ1つのますをセルと
 いいます。たての列にはA・B・C…、横の
 行には1・2・3…と名前がついています。
 B列の3行目のセルは「B3」です。これ
 をセルの番地といいます。列の文字が先、
 行の番号があとです。家の住所のように、
 番地がわかれば、どのセルかが1つに決
 まります。

B 列
↓

	A	B	C
1			
2			
3		B3	
4			

3 行目 →

セルに「=」から始まる式を入れると、表計算ソフトが計算して、答えを表示
 します。「=」で始めるのは、「これは文字ではなく計算の式です」とコンピュー
 タに知らせるためです。

キーボードには×や÷のキーがありません。また、×はアルファベットのxと
 まちがえやすいので、次の記号を使います。

さんすう きごう 算数の記号	+	-	×	÷	2^3
ひょうけいさん きごう 表計算の記号	+	-	*	/	$2\sim 3$

表1 表計算で使う計算の記号。/ は分数の横線をななめにした形。

計算の順番は、算数と同じです (2-11)。=2+3*4 と入れると、*を先に計算して $2 + 12 = 14$ 。=(2+3)*4 と入れると、かっこの中を先に計算して $5 \times 4 = 20$ です。表計算の式も、必要などころにはかっこをつけます。

式の中には、数のかわりにセルの番地を書けます。たとえば、A2 に長方形のたて 3、B2 によこ 4 を入れ、C2 に =A2*B2 と入れると、C2 に面積 12 が出来ます (次のページの図の 2 行目)。番地の所に、そのセルの数が代入されるのです (2-13)。文字の式 $x \times y$ の x と y に数を入れるのと同じです。

② 式をコピーすると、番地もずれる

長方形が 4 つあるときは、C2 の式を C3~C5 にコピーします (セルの右下の角を下へひっぱる)。コピーした式はどうなるかな？

入っている式				ひょうじ 表示される答え			
	A	B	C		A	B	C
1	たて	よこ	めんせき 面積	1	たて	よこ	めんせき 面積
2	3	4	=A2*B2	2	3	4	12
3	5	2	=A3*B3	3	5	2	10
4	2	7	=A4*B4	4	2	7	14
5	6	6	=A5*B5	5	6	6	36

図2 下へ 1 つコピーするごとに、式の行の番号が 1 ずつふえる。

コピーすると、式の中の番地も同じだけずれます。下へ 1 つなら行の番号が 1 ふえ、右へ 1 つなら列の文字が 1 つ進みます。

なぜずれるの？ 表計算ソフトは、C2 の $=A2*B2$ を「A2 と B2」という名前ではなく、「自分から見て2つ左のセル×1つ左のセル」という位置の関係で覚えていきます。道案内の「ここから左へ2軒目」と同じで、立っている場所が変われば、指す家も変わります。




図3 C2もC3も、「自分から2つ左×1つ左」という同じ式。

だから、式をコピーするだけで、どの行でも「同じ行のたて×よこ」が計算されます。行が1000あっても、コピー1回ですみます。

3 ずらしたくない番地には\$をつける

ずれるのが困るときもあります。りんご1個の値段120円をB1に入れ、A列の個数から代金を出します。B3に $=A3*B1$ と入れて下へコピーすると、B4は $=A4*B2$ になります。B2には「代金」という文字しか入っていないので、正しく計算できません。

値段のB1は、どの行からでも同じセルを使いたいので、 $=B\$1$ と書きます。 $=B\$1$ は「ここは動かさない」という印です。列の文字の前の\$は列を、行の番号の前の\$は行を止めます。両方につけると、どの向きにコピーしてもずれません。

	A	B
1	1 個の値段	120
2	個数	代金
3	1	=A3*\$B\$1
4	2	=A4*\$B\$1
5	3	=A5*\$B\$1

	A	B
1	1 個の値段	120
2	個数	代金
3	1	120
4	2	240
5	3	360

図4 A列の番地はズれるが、\$B\$1はズれない。

値段が130円に上がったなら、B1を130に変えるだけで、代金の列が全部自動で計算しなおされます。変わるかもしれない数を1つのセルにまとめておくと、便利です。

4 上の行の結果を使って、下の行を計算する

②はてな?の貯金を計算しましょう。きまりは「今月の貯金は、先月の貯金+500」です。そこで、A列に月、B列に貯金を書く表を作ります。

- 2行目に、はじめ(0か月)のようすを入れる：A2に0、B2に3000。
- 3行目に、1つ上の行を使った式を入れる：A3に=A2+1(月が1ふえる)、B3に=B2+500(先月+500)。
- A3とB3を選んで、下へコピーする。

	A	B
1	つき 月	ちよきん えん 貯金 (円)
2	0	3000
3	=A2+1	=B2+500
4	=A3+1	=B3+500
5	=A4+1	=B4+500

	A	B
1	つき 月	ちよきん 貯金
2	0	3000
3	1	3500
4	2	4000
⋮	⋮	⋮
16	14	10000
⋮	⋮	⋮
122	120	63000

表2 3行目の式を122行目までコピーすると、1か月ずつ計算が進む。

B3の=B2+500は、B2の3000を使って3500になります。B4にコピーされた=B3+500は、B3の答え3500を使って4000になります。こうして、上から順に1行ずつ、前の月の結果を使って計算が進みます。リレーでバトンをわたしていくのと同じです。

なぜ122行目？ 0か月が2行目にあるので、行の番号は、いつも「月の数+2」です。14か月は14+2=16で16行目、120か月は120+2=122で122行目です。

10年は何か月？ 1年あたり12か月です。単位つきで換算すると(2-10)、年どうしが約分されて、

$$10 \text{ 年} \times 12 \frac{\text{か月}}{\text{年}} = 120 \text{ か月}$$

？はてな？ の答え：B列を下へたどると、10000が出るのは16行目、つまり14か月後です。120か月後(10年後)は122行目で、**63000円**です。

式でも確かめられます。 x か月後の貯金は $3000 + 500x$ (円)です。10000円になるのは $3000 + 500x = 10000$ のときで、2-16のように解くと $500x = 7000$ 、

$x = 14$ 。120 か月後は $3000 + 500 \times 120 = 63000$ です。表計算と同じ答えになりました。

表計算では、上の行の結果を使って下の行を計算し、式をコピーしてくり返せます。きまりを変えれば、いろいろな変わり方を調べられます。


上の行から下の行へのきまり	B3 の式	B 列 (B2 から)
毎月 500 円ずつふえる	=B2+500	3000、3500、4000、4500、…
1 分ごとに 6 L ずつへる	=B2-6	80、74、68、62、…
10 分ごとに 2 倍になる (2-7)	=B2*2	100、200、400、800、…

表 3 きまりがちがっても、B3 に式を 1 つ書いてコピーするだけ。

5 表からグラフを作る

表ができたなら、グラフにしよう。

- 1 グラフにしたいセルのはんい (A1 から B26 など) を選ぶ。
- 2 グラフのメニューから、点を線でつなぐグラフを選ぶ。
- 3 横の軸・たての軸に、名前と単位をつける。



毎月同じだけふえるので、点はまっすぐにならびます。2 倍ずつふえるきまりなら、点はだんだん急に上がっていきます。表の数を変えると、グラフも自動で変わります。

たいせつ

式は「=」で始め、セルの番地を使って書く (×は*、÷は/)。順番は算数と同じ

式をコピーすると番地もずれる。ずらしたくない番地は \$B\$1

上の行の結果を使って下の行を計算し、式をコピーしてくり返せる

この章で出てきたことば

セル・番地 表計算の表の1つ1つのますがセル。その場所を「B3」のように表したのが番地。

式のコピー 式をほかのセルにうつすこと。式の中の番地も同じだけずれる。

記号カード

初めて出た章 2-18

*

読み方 アスタリスク
意味 表計算やプログラムで、かけ算×のかわりに使う記号。
英語 asterisk

記号カード

初めて出た章 2-18

\$

読み方 ドル
意味 番地の列の文字・行の番号の前につけると、コピーしてもずれない。
英語 dollar sign

例題でたしかめよう

例題1 式を書く

A2 に道のり (m)、B2 に時間 (s) が入っています。C2 に速さを出す式を書きましょう。A2 が 150、B2 が 30 なら、C2 には何が出ますか。

考え方 速さ = 道のり ÷ 時間 (2-3)。道のりは A2、時間は B2 なので、番地を入れます。÷ は / で書きます。

しき =A2/B2。150 ÷ 30 = 5

こたえ =A2/B2、5 (単位は m ÷ s で 5 m/s)

じぶんでとこう 1

A2にお菓子1個の重さ(g)、B2に個数が入っています。C2に全体の重さを出す式を書きましょう。A2が120、B2が8なら、C2には何が出ますか。

例題2 かっこが要る式

A2にケーキ1個の値段300(円)、B2にジュース1本の値段100(円)が入っています。ケーキとジュースを1つずつ、2人分買うときの代金をC2に出す式を書きましょう。

かんがえ方 1人分は「ケーキ+ジュース」で、それが2人分です。「ケーキ+ジュース」を1つのまとまりにしたいので、かっこでかこみます(2-11)。

しき $= (A2+B2)*2$ 。 $(300 + 100) \times 2 = 400 \times 2 = 800$

かっこがないと $= A2+B2*2$ で $300 + 100 \times 2 = 300 + 200 = 500$
(ジュースだけが2本になる)

こたえ $= (A2+B2)*2$ 、800 (800円)

じぶんでとこう 2

A2に長方形のたて(cm)、B2によこ(cm)が入っています。C2に長方形のまわりの長さを出す式を書きましょう。A2が5、B2が8なら、C2には何が出ますか。

例題3 式のコピー

D2 に =B2-C2 と入れ、D6 までコピーしました。D5 の式は何ですか。

考え方 D2 から D5 へは下へ3つ (5 - 2 = 3) なので、式の中の行の番号も3ふえます。列の文字は変わりません。

しき B2 → B5、C2 → C5

こたえ =B5-C5

例題4 \$をつけた番地 (時速を秒速に)

A 列の3行目から下に時速 (km/h) が入っています。B3 に秒速 (m/s) を出す式を書いて下へコピーします。B1 には換算に使う数を入れておきます。B1 に入れる数、B3 の式、A5 が72 のときのB5 の値を答えましょう。

考え方 ① 時速 72 km を単位つきで秒速にすると (2-10)、

$$\begin{aligned} 72 \text{ km/h} \times 1000 \text{ m/km} \div 3600 \text{ s/h} &= 72 \times \frac{1000}{3600} \text{ m/s} \\ &= \frac{72}{3.6} \text{ m/s} = 20 \text{ m/s} \end{aligned}$$

$\frac{1000}{3600} = \frac{1}{3.6}$ なので、どの時速も「÷ 3.6」で秒速になります。

② 3.6 は、どの行でも同じ数なので、B1 に1つだけ入れ、\$B\$1 で使います。

しき B1 : 3.6 B3 : =A3/\$B\$1

B5 にコピーされた式は =A5/\$B\$1 で、72 ÷ 3.6 = 20

こたえ B1 は 3.6、B3 は =A3/\$B\$1、B5 は 20 (20 m/s)

じぶんでとこう 3

C3 に $=A3*B3$ と入れ、C8 までコピーしました。C7 の式は何ですか。

じぶんでとこう 4

B1 に 1 m の値段 150 (円)、A 列の 3 行目から下に長さ (m) が入っています。B3 に代金の式を書いて下へコピーします。B3 の式と、A4 が 2.5 のときの B4 の値は？

例題 5 上の行の結果を使う (ひき算)

80 L の水そうから、1 分ごとに 6 L ずつ水をぬきます。A2 に 0 (分)、B2 に 80 を入れ、B3 の式を下へコピーします。B3 の式を書き、50 L になるのは何分後かを答えましょう。

かんが 考え方 1 分後の水は、1 分前の水より 6 L 少ない。だから「1 つ上の行 - 6」です。

しき B3 : $=B2-6$

B 列は 80、74、68、62、56、50 (B2~B7)

50 は B7。行の番号は「分 + 2」なので、 $7 - 2 = 5$

こたえ $=B2-6$ 、5 分後 (確かめ : $80 - 6 \times 5 = 50$)

じぶんでとこう 5

お落ちるボールの速さは、0.1 秒ごとに $9.8 \text{ m/s}^2 \times 0.1 \text{ s} = 0.98 \text{ m/s}$ ずつふえます (2-10)。B2 に 0 を入れ、B3 の式を下へコピーします。B3 の式と、0.5 秒後 (B7) の速さは？

例題6 2倍ずつふえる（時間の換算つき）

ある細菌は、20分ごとに2倍にふえます。B2にははじめの数50を入れ、B3に「20分後の数」の式を書いて下へコピーします。B3の式を書き、2時間後の数が行目に出て、いくつになるかを答えましょう。

考え方 ① 1つ下の行は20分後で、1つ上の行の2倍。

② 2時間を分に換算して、20分が何回あるかを調べます。

$$2\text{h} \times 60\text{min/h} = 2\cancel{\text{h}} \times \frac{60\text{min}}{1\cancel{\text{h}}} = 120\text{min}, \quad 120\text{min} \div 20\text{min} = 6$$

20分が6回なので、2倍が6回。B2から6行下のB8です。

しき B3: =B2*2

B列は50、100、200、400、800、1600、3200（B2～B8）

こたえ =B2*2、B8で3200（確かめ： $50 \times 2^6 = 50 \times 64 = 3200$ 、2-7）

じぶんでとこう6

厚さ0.1mmの紙は、1回折るごとに厚さが2倍になります（2-7）。B2に0.1を入れ、B3に「1回折ったあと」の式を書いて下へコピーします。B3の式と、10回折ったときの厚さが出るセル、その厚さを答えましょう。



ミナ

2倍ずつふえると、10回で1000倍以上（ $2^{10} = 1024$ ）！表計算なら、こんな大きな変化もすぐに確かめられるね。

例題 7 差の割合で変わる

5℃に冷えた飲み物を、25℃の部屋に置きます。1分ごとに「部屋と飲み物の温度の差」の10%ずつ温度が上がるとします。B2に5を入れ、B3の式を書いて下へコピーします。B3の式と、B3・B4・B5の値を答えましょう。

考え方 ① 差は「部屋－飲み物」で、25-B2。② その10%は0.1をかけて $0.1 \times (25 - B2)$ (2-5)。差を先に計算したいので、かつこが要ります。③ それを今の温度にたします。

しき B3 := B2 + 0.1 * (25 - B2)

$$B3 : 5 + 0.1 \times (25 - 5) = 5 + 0.1 \times 20 = 5 + 2 = 7$$

$$B4 : 7 + 0.1 \times (25 - 7) = 7 + 1.8 = 8.8$$

$$B5 : 8.8 + 0.1 \times (25 - 8.8) = 8.8 + 1.62 = 10.42$$

こたえ =B2+0.1*(25-B2)。B3は7、B4は8.8、B5は10.42 (℃)

じぶんでこう7

60℃のお湯を、20℃の部屋に置きます。1分ごとに「お湯と部屋の温度の差」の20%ずつ温度が下がるとします。B2に60を入れたとき、B3の式と、B3・B4の値を答えましょう。




図5 例題7の式を31行コピーしてグラフにしたもの。差が小さくなるほど上がり方がゆっくりになり、部屋の温度に近づく。

例題8 合計と平均を出す命令

B2からB6に、5回のテストの点(72、85、64、90、79)が入っています。B7に合計、B8に平均を出す式を書きましょう。

考え方 $=B2+B3+B4+B5+B6$ でもできますが、行が多いと大変です。表計算には、はんいの数をまとめたたすSUM(サム、合計)という命令があります。B2:B6は「B2からB6まで」という意味です。平均は合計÷個数(2-6)なので、 $=B7/5$ か、平均の命令AVERAGE(アベレージ)を使います。

しき B7: $=SUM(B2:B6)$

$$72 + 85 + 64 + 90 + 79 = 390$$

$$B8: =AVERAGE(B2:B6)$$

$$390 \div 5 = 78$$

こたえ B7は $=SUM(B2:B6)$ で390、B8は $=AVERAGE(B2:B6)$ (または $=B7/5$)で78

	A
1	点
2	72
3	85
4	64
5	90
6	79
7	$=SUM(B2:B6)$
8	$=AVERAGE(B2:B6)$

じぶんでこう8

A2 から A5 に、4 日間の読書の時間（12、15、9、14 分）が入っています。A6 に合計、A7 に平均を出す式と、その値を答えましょう。



ソラ

SUM や AVERAGE のような命令を使うと、1000 行の合計も平均も 1 つの式で出せるんだ。

⚠ まちがえやすいところをチェック

⚠ まちがえやすいところ

「=」をつけわすれる

✗ C2 に A2*B2 と入れる（文字のまま表示される）

○ C2 に =A2*B2 と入れる（計算した答えが出る）

「=」は、「ここに計算の答えを入れて」という合図です。

⚠ まちがえやすいところ

\$ をつけわすれて、コピーする

✗ B3 に =A3*B1 → B4 にコピーすると =A4*B2（B2 は「代金」の文字）

○ B3 に =A3*\$B\$1 → B4 にコピーすると =A4*\$B\$1

同じセルを使い続けたい番地には、\$ をつけます。

⚠ まちがえやすいところ

かっこをつけわすれる

✕ B3 に $=B2-0.05*B2-20$ (80 なら $80-4-20=56$)

○ B3 に $=B2-0.05*(B2-20)$ (80 なら $80-0.05 \times 60=77$)

かっこがないと、*を先に計算し(2-11)、20を最後にひいてしまいます。
「差の5%」の「差」を1つのまとまりにするには、かっこが要ります。

⚠ まちがえやすいところ

自分のセルを式に入れてしまう

✕ B3 に $=B3+500$ (「循環参照」の注意が出る)

○ B3 に $=B2+500$ (1つ上の行を使う)

B3の答えを出すのにB3の答えが要ると、いつまでも計算が終わりません。
「先月+500」の「先月」は、1つ上の行です。

⚠ まちがえやすいところ

番地の列と行を逆に書く

✕ B列の3行目を「3B」と書く

○ B列の3行目は「B3」(列の文字が先、行の番号があと)

「3B」と書くと、表計算ソフトは番地だとわかりません。

物理・工学ではこう使う


お湯の冷め方を予想する

熱いお湯は、部屋の温度との差が大きいほど速く冷めます。差が小さくなると、冷め方もゆっくりになります。あるカップでは、1分ごとに「お湯と部屋（20℃）の温度の差」の5%ずつ下がりました。

式を1つずつ組み立てます。① 差は「お湯－部屋」で B2-20。② その5%は $0.05 \times (B2-20)$ 。③ それを今の温度からひく。B2に80を入れ、B3に $=B2-0.05 \times (B2-20)$ と入れて下へコピーします。手で確かめると、B3は $80 - 0.05 \times 60 = 80 - 3 = 77$ 、B4は $77 - 0.05 \times 57 = 77 - 2.85 = 74.15$ です。

	A	B
1	分	℃
2	0	80
3	1	77
4	2	74.15
5	3	71.44
⋮	⋮	⋮
12	10	55.92

(小数第3位を四捨五入)



はじめは1分に3℃も下がりますが、10分後には1分に約1.8℃しか下がらず、だんだんゆっくり冷めて、部屋の温度に近づきます。「今の状態から、少し先の状態を計算する」ことをくり返すこの方法は、第5巻(5-8)・第6巻(6-2 オイラー法)で本格的に使います。ロケットの進み方や天気予報も、コンピュータがこの方法で計算しています。



しょうまつもんだい
章末問題

2-18 のまとめ

基本



1 右の表を見て答えましょう。

- (1) B3 に入っている数は何ですか。
(2) 25 が入っているセルの番地は何ですか。

	A	B	C
1	4	9	16
2	7	25	3
3	11	8	30

2 A2 と B2 の数を使う式を、C2 に入れる形で書きましょう。

- (1) 和 (たし算の答え) (2) 積 (かけ算の答え) (3) A2 を B2 でわった商

3 A2 に 10、B2 に 6 が入っています。C2 に $=A2+B2/2$ と入れると、何が出ますか。また、A2 と B2 の平均を出したいとき、式をどう直せばよいですか。

4 D2 に $=B2*C2$ と入れ、D6 までコピーしました。D4 の式は何ですか。

5 C3 に $=B3*\$E\1 と入れ、C7 までコピーしました。C6 の式は何ですか。

6 B2 に 2000 を入れ、B3 に $=B2+150$ と入れて、下へコピーしました。B6 に表示される数は何ですか。

7 C2 に $=A2*B2$ と入れ、C4 までコピーしました。C3 と C4 に表示される数は何ですか。

	A	B	C
1	たて (cm)	よこ (cm)	面積 (cm ²)
2	4	6	$=A2*B2$
3	7	3	
4	2.5	8	

チャレンジ ★★

8 ある細菌は、10 分ごとに 2 倍にふえます。B2 にははじめの数 100 を入れ、B3 に式を書いて下へコピーします。B3 の式と、1 時間後の数を答えましょう (換算は単位つきで)。

9 ゆうさんは、B3 に $=A3*B1$ と入れて下へコピーしたところ、B4 から下の答えがおかしくなりました。なぜですか。B3 の式をどう直せばよいですか。

10 お湯は、1 分ごとに「部屋 (20℃) との差」の 10% ずつ下がります。B2 に 80、B3 に $=B2-0.1*(B2-20)$ と入れて下へコピーしました。B3・B4・B5 の数を求めましょう。

✓ ふりかえり できるようになったかな？

- ☐ 「=」の式を書き、コピーしてくり返せる。 → 388 ページ
- ☐ ずらしたくない番地に \$ をつけて使える。 → 390 ページ
- ☐ 上の行の結果で下の行を計算し、グラフにできる。 → 391 ページ



ソラ

コピー 1 回で、1000 回の計算ができたね。次の 2-19 では、計算の手順を自分で書く「プログラム」を学ぶよ。

2-19 プログラムで計算しよう


↑ 通しるべ この章の前に 2-9 2-17 2-18 この章の先に 5-2 6-2

この章でできるようになること

- ★★ 変数と代入を使った短いプログラムを読んで、結果を予想できる。
- ★★ くり返しと「もし～なら」を使ったプログラムを読める。
- ★★ コンピュータの小数に小さなずれが出るわけと、その対策を説明できる。

? はてな?

コンピュータに「0.1 を 10 回たして」とたのみました。答えは 1…のはずです。ところが、画面に出たのは右の数でした。コンピュータが、計算をまちがえたのかな?



0.1 を 10 回たすのは、電卓や手計算なら誰でもできる計算です。ふしぎなずれのわけは、コンピュータの数の覚え方 (2-17) にあります。この章では、コンピュータに計算の手順を伝えるプログラムの読み方を学び、このなぞを解きます。


△ やってみよう ロボットになって、命令どおりに動こう

ふたりで組みます。ひとりが命令を書き、もうひとりがロボットになって、書かれたとおりに動きます。使える命令は「前へ何歩」と「右を向く」の2つだけです。

① 1 辺 2 歩の正方形をまわって元の場所・元の向きにもどる命令を、ノートに順番に書こう。

② ロボットに、書いた順番どおりに動いてもらおう。命令にないことはしない。

③ 同じ命令の組が、何回出てきたかな？ もっと短く書けないかな？



スタート (上向き)

①の命令は、「前へ2歩、右を向く、前へ2歩、右を向く、…」と8行になります。「前へ2歩・右を向く」の組が4回出てくるので、「この2つを4回くり返す」と書けば、3行ですみます。ロボットは、書かれていないことは何もしません。命令の順番をまちがえると、ちがう場所に行ってしまいます。コンピュータへの命令も、これと同じです。

思い出そう この章で使う、前に学んだこと

- 2-9** $\frac{1}{3} = 0.333 \dots$ のように、分数を小数にすると、終わらずにくり返すことがある。
- 2-17** 2進数の位は、右から $1 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 8 \dots$ 。大きい位から、使えたらひいて2進数にする。
- 2-7** $2^{-1} = \frac{1}{2}$ 、 $2^{-2} = \frac{1}{4}$ 、 $2^{-3} = \frac{1}{8}$ 。 $2^{10} = 1024$ はほぼ 1000。
- 2-18** 表計算では、上の行の結果を使って下の行を計算し、式をコピーしてくり返せる。 $\times$ は $*$ 。
- 2-16** $x = x + 1$ を移項すると $0 = 1$ となり、方程式としては解がない。

数学の道具

1 プログラムと変数・代入

コンピュータへの命令を順番にならべたものを**プログラム**といいます。ブロックをつないで書く方法（Scratch など）と、文字で書く方法（Python など）があります。同じプログラムを、2つの書き方でならべてみましょう。

x を 3 にする

y を $x \times 2 + 1$ にする

y を表示する

Python

```
x = 3
y = x * 2 + 1
print(y)
```

実行結果

7

プログラムは、上から順に1行ずつ実行されます。x や y は、数を入れておく名前付きの箱で、**変数**といいます（2-11の「どんな数でも入る箱」と同じ）。 $=$ は「右を計算して、答えを左の箱に入れる」という命令で、**代入**といいます。 $*$ はかけ算（2-18と同じ）、**print** は「表示する」という命令です。

1行ずつ、箱の中身がどうなるかを見てみましょう。

① $x = 3$

x3

y

xの箱に3を入れる

② $y = x * 2 + 1$

x3

y7

xの中身3を使って
 $3 \times 2 + 1 = 7$ をyへ

③ $\text{print}(y)$

x3

y7

yの中身7を画面に出す

図 1 1行実行するごとの箱の中身。②では、かけ算を先に計算する (2-11)。

この箱の中身の変わり方は、表にするとわかりやすくなります。1行実行するごとに、表の1行をうめていきます。空の箱は「-」と書きます。

じっこう 実行した行	x	y	ひょうじ 表示
$x = 3$	3	-	
$y = x * 2 + 1$	3	7	
$\text{print}(y)$	3	7	7

表 1 変数の中身を追う表。プログラムを読むときの強い味方。

2 $x = x + 1$ は方程式ではない

では、 $x = x + 1$ は何をするのでしょうか。方程式 $x = x + 1$ なら、 x を移項すると $0 = 1$ になり、解はありません (2-16)。でも、プログラムの $=$ は「等しい」ではなく、代入です。 x に3が入っているとき、コンピュータは次の順で動きます。

- 1 右がわの $x + 1$ を見る。 x の箱の中身は3。
- 2 $3 + 1 = 4$ を計算する。
- 3 答えの4を、左がわの x の箱に入れる。前に入っていた3は消えて、4に入れかわる。



図2 $x = x + 1$: 今の x に 1 をたして、 x に入れなおす。

黒板に書いた点数を消して、1 点ふやした数を書きなおすのと同じです。だから $x = x + 1$ は「 x を 1 ふやす」という命令になります。2-18 の `=B2+500` が「上のセルに 500 をたしてここに入れる」だったのと、よく似ています。プログラムで「等しいか」を比べたいときは、`=` ではなく `==` を使います。

3 くり返し

2-18 の貯金 (3000 円から毎月 500 円) を、12 か月分計算するプログラムです。



Python

```
money = 3000
for i in range(12):
    money = money + 500
print(money)
```

実行結果

9000

- `for i in range(12):` は「下の命令を 12 回くり返す」という意味です。`i` は回数を数える係の変数で、0、1、2、…、11 と 12 回変わります (0 から数えるので、最後は 11)。
- くり返すのは、右へ下げて (4 文字分あけて) 書いた行だけです。Scratch の絵で、くり返しの枠の中に入っているブロックにあたります。
- `print(money)` は下げていないので、くり返しが終わってから 1 回だけ実行されます。

変数の表で追ってみましょう。

じっこう 実行した行	i	money	ひょうじ 表示
money = 3000	—	3000	
1 回目 : money = money + 500	0	3500	
2 回目 : money = money + 500	1	4000	
3 回目 : money = money + 500	2	4500	
⋮	⋮	⋮	
12 回目 : money = money + 500	11	9000	
print(money)	11	9000	9000

表 2 くり返すたびに、money が 500 ずつふえる。2-18 の表計算の B 列と同じ数にならぶ。

表計算では、式をコピーした行の数だけ計算がくり返されました。プログラムでは、同じ 1 つの箱の中身を、range の回数だけ書きかえていきます。答えは、式で計算した $3000 + 500 \times 12 = 3000 + 6000 = 9000$ と同じです。

4 もし～なら：条件分岐

12 か月後に 10000 円たまったかどうかで、表示することばを変えます。

もし money ≥ 10000 なら

「たまった」と表示

でなければ

「まだ」と表示

Python

```
if money >= 10000:
    print("たまった")
else:
    print("まだ")
```

実行結果

まだ

※ Scratch には ≥ のブロックがないので、「money > 9999」のように書きます。

if の後ろの条件 (money >= 10000) が正しければ、すぐ下の下げた行を実行します。正しくなければ、else の下の行を実行します。このように、条件が

正しいかどうかで実行する命令を変えることを条件分岐といいます。道が2つに分かれていて、条件で進む道を選ぶイメージです。

money は 9000 です。9000 $\geq$ 10000 は正しくない (9000 は 10000 より小さい) ので、else の下の「まだ」が表示されます。

プログラム	算数	意味
$\geq$	$\geq$	左が右以上 (2-2)
$\leq$	$\leq$	左が右以下
$>$	$>$	左が右より大きい
$<$	$<$	左が右より小さい (未満)
$==$	$=$	左と右が等しい

表3 くらべる記号。キーボードに $\geq$ ・ $\leq$ がないので、2文字で書く。

5 0.1 を 10 回たしても、1 にならない

「? はてな?」を確認しましょう。1 回たすごとに x を表示します。print(x) を右へ下げてあるので、くり返しの中で毎回表示されます。

Python	実行結果
x = 0	0.1
for i in range(10):	0.2
x = x + 0.1	0.30000000000000004
print(x)	0.4
	0.5
	0.6
	0.7
	0.7999999999999999
	0.8999999999999999
	0.9999999999999999

左の列のあとに右の列が出る。黄色は、ずれた数。

3 回目から小さなずれが見えます。わけは、コンピュータが数を 2 進数で、決まったけた数だけ覚えているからです (2-17)。

2 進数の小数 10 進数の小数の位は、 $\frac{1}{10} \cdot \frac{1}{100} \dots$ と、右へ 1 つ進むごとに $\frac{1}{10}$ になりました (2-1)。2 進数では、右へ 1 つ進むごとに $\frac{1}{2}$ になります。だから小数の位は、 $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{16} \dots$ です (2^{-1} 、 2^{-2} 、 $\dots$ 、 2^{-7})。

10進数	2進数	
$0.5 = \frac{1}{2}$	$0.1_{(2)}$	終わる
$0.75 = \frac{1}{2} + \frac{1}{4}$	$0.11_{(2)}$	終わる
0.1	$0.000110011001100 \dots_{(2)}$	終わらない

表4 0.1 は、2進数では「0011」がくり返されて終わらない。

0.1 を2進数にしてみる 2-17 で整数を2進数にしたのと同じように、大きい位から順に、使えたらひきます。

位	のこ残りから使える？	すうじ数字
$\frac{1}{2} = 0.5$	つかわない (のこ残り 0.1 より大きい)	0
$\frac{1}{4} = 0.25$	つかわない	0
$\frac{1}{8} = 0.125$	つかわない	0
$\frac{1}{16} = 0.0625$	使う : $0.1 - 0.0625 = 0.0375$	1
$\frac{1}{32} = 0.03125$	使う : $0.0375 - 0.03125 = 0.00625$	1
$\frac{1}{64}, \frac{1}{128}$	つかわない (のこ残り 0.00625 より大きい)	0, 0
$\frac{1}{256}, \frac{1}{512}$	つかう, つかう (のこ残りは 0.000390625)	1, 1
:	のこ残りはいつまでも 0 にならない	:

表5 残りが0にならないので、2進数のけたが終わらない。

5番目の位のあとの残り 0.00625 は、ちょうど $0.1 \div 16$ です。0.1 を16でわった数が残ったので、ここから先は、位を4つずらして同じことがくり返されます。だから「0011」がいつまでも続くのです。

0.1 は、10進数の $\frac{1}{3} = 0.333 \dots$ のように、2進数ではどこまでも続きます(2-9)。コンピュータはけたを途中で切って覚えるので、0.1 はほんの少しずれ、たし算をくり返すとずれが見えてきます。

❓ はてな？ の答え：コンピュータはまちがえたのではなく、0.1 をぴったり覚えられないのです。

10進数でたとえると 4けたまでしか書けない計算機では、 $\frac{1}{3}$ は 0.3333 と覚えるしかありません。3回たすと $0.3333 + 0.3333 + 0.3333 = 0.9999$ で、1になりません。本当は $\frac{1}{3} \times 3 = 1$ なのに、覚えたときに切り捨てた分が、たすたびにたまっていくのです。

🔍 もっと知りたい ★★

2倍していく方法で、くり返しを見る

10進数の小数を10倍すると、小数点が右へ1つ動き、 $\frac{1}{10}$ の位の数字が整数の位に出てきました(2-1)。2進数では、2倍すると $\frac{1}{2}$ の位の数字が整数の位に出てきます。だから、2倍して整数の部分(0か1)を書き、小数の部分をもた2倍する、をくり返すと、2進数のけたが順に出てきます。

0.1×2	0.2×2	0.4×2	0.8×2	0.6×2	0.2×2
$= 0.2$	$= 0.4$	$= 0.8$	$= 1.6$	$= 1.2$	$= 0.4$
0	0	0	1	1	0

6回目で、2回目と同じ「 0.2×2 」にもどりました。ここから先は、0、0、1、1、0、0、1、1、…と同じ数字がくり返されます。2-9で、わり算のあまりが前と同じになると小数がくり返したのと、同じしくみです。

⑥ 近い2つの数のひき算と、ずれの対策

コンピュータは、小数1つを64ビット(2-17)で覚えます。そのうち、数字のならびを覚えるのに使うのは約53ビット分です。 $2^{10} = 1024$ はほぼ1000なので(2-7)、 2^{50} はほぼ $1000^5 = 10^{15}$ です。実際に $2^{53} = 9007199254740992$ で16けたです。だから、コンピュータが覚えられる数は、10進数にすると上か

ら約 16 けたまでです。0.1 のように 2 進数で終わらない数は、上から 17 けためあたりに小さなずれをもっています。

大ききのととても近い 2 つの数をひき算すると、どうなるでしょう。1000.1 から 1000 をひいてみます。コンピュータの中の 1000.1 は、上から 17 けためのあたりが少しずれています。

黒いけたは正しい。赤いけたが小さなずれ

1000.1000000000000000227

− 1000.0000000000000000

0.1000000000000000227

コンピュータの中の

1000.1

上の「1000」が消えて、

ずれ（赤）が前に出る

図 3 1000.1 − 1000。答えの正しいけたは、ひいて消えた「1000」の分だけ少なくなる。

ひき算で上の「1000」が消えたので、答えの正しいけたは 4 けたぶん少なくなり、赤いずれが前に出てきました。大きい数どうしほど、消えるけたが多いので、ずれが前に出ます。

プログラム	実行結果
print(1.1 - 1)	0.100000000000000009
print(1000.1 - 1000)	0.10000000000000002274
print(10000000000.1 - 10000000000)	0.10000002384185791

表 6 本当の答えはどれも 0.1。近い大きな数どうしほど、ずれ（赤）が前に出る。

コンピュータは数を有限のけたしか覚えていないので、とても近い 2 つの数をひき算すると、下のけたのずれが目立ちます。「有限」は「限りがある」という意味です。第 5 巻の 5-2 では、このずれが表計算の答えに出てきます。

ずれの対策

- ① **整数で数える**：整数は2進数でもぴったり書けるので、ずれません (2-17)。
 $n = n + 1$ を10回くり返して10を作り、最後に $n / 10$ とすると、ぴったり1.0になります。
- ② **ずれを見こんで比べる**： $x == 1$ ではなく、 $0.999999 < x < 1.000001$ のように「1にとっても近いかな」を比べます (不等号、2-2)。
- ③ **式を変形して、近い数のひき算をなくす**：計算する前に、文字の式のまま整理しておきます (5-2)。

たいせつ

プログラムの $=$ は代入：右を計算して、左の変数に入れる。変数の中身は表で追う

0.1 は、2進数では終わらないので、覚えると少しずれる
 とても近い2つの数をひき算すると、下のけたのずれが目立つ

この章で出てきたことば

プログラム コンピュータへの命令を、順番にならべたもの。

変数・代入 数を入れておく名前つきの箱が変数。箱に数を入れることが代入。

条件分岐 条件が正しいかどうかで、実行する命令を変えること。

記号カード

初めて出た章 2-19

$==$

読み方 イコール・イコール
意味 プログラムで、左と右が等しいかを比べる記号。 $=$ は代入。
英語 equal to

記号カード

初めて出た章 2-19

$>=$

読み方 だいたいイコール
意味 プログラムで $\geq$ のかわりに使う記号。左が右以上。
英語 greater than or equal to

例題でたしかめよう

例題 1 代入の順番

右のプログラムで表示される 2 つの数を答え
ましょう。(print(a, b) は、a と b をなら
べて表示します。)

考え方 上から 1 行ずつ、箱の中身を表に書
く。b は、b を計算した時の a を使うので、あ
とで a が変わっても b は変わらない。

Python

```
a = 4
b = a * 3
a = a + 1
print(a, b)
```

しき

実行した行	a	b	計算
a = 4	4	—	
b = a * 3	4	12	4 × 3 = 12
a = a + 1	5	12	4 + 1 = 5。b は 12 のまま
print(a, b)	5	12	「5 12」と表示

こたえ 5 12

じぶんでこう 1

x = 10、y = x - 3、x = y * 2、print(x, y) の順に実行すると、何
が表示されますか。変数の表を書いて答えましょう。

例題2 くり返し

右のプログラムで表示される数は？

考え方 `range(5)` で、下げた行を 5 回。
`print` は最後に 1 回。

しき `s` は $0 \rightarrow 3 \rightarrow 6 \rightarrow 9 \rightarrow 12 \rightarrow 15$

こたえ 15

Python

```
s = 0
for i in range(5):
    s = s + 3
print(s)
```

例題3 もし～なら

右のプログラムで表示されることは？

考え方 `t >= 25` は「 $t \geq 25$ 」。正しいか調べる。

しき $28 \geq 25$ は正しいので、`if` のすぐ下を実行

こたえ なつび

Python

```
t = 28
if t >= 25:
    print("なつび")
else:
    print("ふつう")
```

じぶんでこう2

`n = 1` のあと `n = n * 2` を 4 回
くり返し、`print(n)`。何が表示
される？

じぶんでこう3

`score = 55`。もし `score >= 60`
なら「ごうかく」、でなければ「も
ういちど」と表示。何が出る？

例題4 くり返しのあとで、もし~なら

右のプログラムで表示されることを答

えましょう。

考え方 かんが かた もと しら を 求めてから、if を調べる。

しき ただ した じっこう を w は $20 - 3 \times 4 = 8$ 。 $8 \geq 10$ は正しくないので、else の下を実行

こたえ たりない

Python

```
w = 20
for i in range(4):
    w = w - 3
if w >= 10:
    print("じゅうぶん")
else:
    print("たりない")
```

例題5 2進数で終わる小数

0.375 は、2進数で終わる小数ですか。終わるなら2進数で書きましょう。

考え方 かんが かた おお くらい の 大きい位 ($\frac{1}{2} = 0.5$ 、 $\frac{1}{4} = 0.25$ 、 $\frac{1}{8} = 0.125$ 、...) から順に、使えたらひく。残りが0になれば終わる。

しき 0.5 は使わない (0.375 より大きい)

0.25 を使う: $0.375 - 0.25 = 0.125$

0.125 を使う: $0.125 - 0.125 = 0$ 残りが0になった

こたえ お 終わる。 $\frac{1}{2}$ の位が0、 $\frac{1}{4}$ と $\frac{1}{8}$ の位が1で、 $0.011_{(2)}$

じぶんでとこう4

$p = 50$ のあと $p = p + 20$ を3回。そのあと、もし $p \geq 100$ なら「OK」、でなければ「NG」と表示。何が出る？

じぶんでとこう5

0.625 は、2進数で終わる小数ですか。終わるなら2進数で書きましょう。

例題6 単位の換算をプログラムで

右のプログラムは、1日(24h)が何秒かを計算します。それぞれの行の24や60は何を表していますか。また、表示される数を答えましょう。

考え方 1日は24時間(24h/d)、1時間は60分(60min/h)、1分は60秒(60s/min)。

dはday(日)の頭文字です(2-10)。

しき 単位付きの式で書くと、1行ずつ単位が約分されていきます。

$$1 \text{ d} \times 24 \text{ h/d} = 24 \text{ h}$$

$$24 \text{ h} \times 60 \text{ min/h} = 1440 \text{ min}$$

$$1440 \text{ min} \times 60 \text{ s/min} = 86400 \text{ s}$$

hの行の24は24h/d、mの行の60は60min/h、sの行の60は60s/min

こたえ 86400 (1日は86400s)

```
d = 1
h = d * 24
m = h * 60
s = m * 60
print(s)
```

Python

じぶんでとこう6

1時間(60min)が何ミリ秒(ms)かを計算するプログラムを、h = 1から始めて3行で書き、表示される数を答えましょう。1秒は1000ミリ秒(1000ms/s、2-10)です。

⚠️ まちがえやすいところをチェック

⚠️ まちがえやすいところ

$x = x + 1$ を^{ほうていしき}方程式だ^{おも}と思う

✗ $x = x + 1$ は、 x と $x + 1$ が^{ひと}等しいという^い意味だから、おかしい

○ $x = x + 1$ は「今の x に1を^{いま}たして、 x に^い入れなおす」という^{めいれい}命令
プログラムの $=$ は^{だいにゆう}代入です。等しいかを^{ひと}比べるときは $==$ を^{つか}使います。

⚠️ まちがえやすいところ

^さ下げた行と^{ぎょう}下げない^さ行を^{ぎょう}区別^{くべつ}しない

✗ `for i in range(3):` の^{した}下に^さ下げずに `print(x)` → 3 回^{かいひょうじ}表示される

○ ^さ下げずに^か書いた `print(x)` は、^{かえ}くり返し^おが終わってから 1 回^{かい}だけ^{じっこう}実行
される

Python では、^{みぎ}右へ^さ下げた行^{ぎょう}だけが^{かえ}くり返し^{なかみ}の中身です。

⚠️ まちがえやすいところ

^{しょうすう}小数を $==$ で^{くら}比べる

✗ 0.1 を 10 回^{かい}たした x を `if x == 1:` で^{くら}比べる（「1 ではない」と^{はんだん}判断
される）

○ `if 0.999999 < x < 1.000001:` のように、^みずれを見^{くら}こんで比べる
 x は 0.9999999999999999 なので、 $x == 1$ は^{ただ}正しくないことになって
しまいます。

物理・工学ではこう使う

第5巻の「瞬間の速さ」

5-2 では、落ちるボールの1秒後の瞬間の速さ（本当は10 m/s）を、とても短い時間 h 秒の間の平均の速さ $\frac{5(1+h)^2 - 5}{h}$ で求めます。 h を小さくするほど本当の速さに近づく…はずです。

Python

```
h = 0.00000001
x = 5 * (1 + h) ** 2
print((x - 5) / h)
```

** は累乗 (2-7)。(1 + h) ** 2 は $(1+h)^2$

h	実行結果
0.1	10.500000000000007
0.001	10.00499999999871
10^{-5}	10.000050000069649
10^{-8}	9.99999993922529
10^{-10}	10.00000082740371
10^{-12}	10.00088900582341

h を 10^{-8} より小さくすると、逆に10からはなれていきます。 10^{-8} でも、本当の値10.00000005より小さくなっています。 x と5がとても近く、ひき算 $x - 5$ で下のけたのずれが目立つのです。そのうえ、とても小さい h でわるので、ずれが大きくなります。5-2 では式を $10 + 5h$ に変形して、ひき算そのものをなくします。

時計やお金は整数で

コンピュータの時計は「何回目の1ミリ秒か」を、お金は円を、整数で数えます。1日は $86400 \text{ s} \times 1000 \text{ ms/s} = 86400000 \text{ ms}$ なので、1日の時刻は0から86399999までの整数で表せます。大学の「数値計算」では、ずれの小さい計算の手順を考えます。

物理・工学ではこう使う

冷蔵庫の温度を守るプログラム

冷蔵庫の中の小さなコンピュータは、くり返しと「もし～なら」で温度を 5℃ くらいに保っています。1 分ごとに温度センサー（2-17）で温度をはかり、5℃ より高ければ冷やす機械を動かし、そうでなければ止めます。

Python


```
for i in range(1440):
    t = sensor()
    if t > 5:
        cool_on()
    else:
        cool_off()
    wait_1min()
```

sensor() は「温度をはかる」、cool_on() は「冷やす」、wait_1min() は「1 分待つ」という命令（作った会社が用意したもの）。

1440 は、1 日（24 時間）が何分かを表す数です（1 分に 1 回ずつ、1 日分くり返す）。

$$1 \text{ d} \times 24 \text{ h/d} \times 60 \text{ min/h} = 1440 \text{ min}$$

このように、はかった結果を見て機械の動きを決めることを制御といいます。エアコンや自動車のエンジン、ロボットも、同じ考え方のプログラムで動いています。大学の「制御工学」では、オン・オフだけでなく、冷やす強さを少しずつ変える上手な制御を学びます。





しょうまつもんだい 章末問題

2-19 のまとめ

きほん
基本



1 次のプログラムを実行すると、何が表示されますか。

(1)

Python

```
a = 7
b = a * 2
a = a + b
print(a)
```

(2)

Python

```
s = 100
for i in range(4):
    s = s - 15
print(s)
```

(3)

Python

```
n = 3
for i in range(3):
    n = n * 2
print(n)
```

2 次のプログラムを実行すると、何が表示されますか。

Python

```
x = 12
if x >= 15:
    print("おおきい")
else:
    print("ちいさい")
```

3 次の小数のうち、2進数で終わるものをすべて選び、2進数で書きましよう。 ア 0.5 イ 0.125 ウ 0.3 エ 0.75

4 プログラムの $x = x + 1$ と、方程式 $x = x + 1$ のちがいを説明しましょう。

5 次のプログラムで表示される数を答えましょう。また、それは何を計算していますか。1週間は7日です。

Python

```
w = 3
d = w * 7
h = d * 24
print(h)
```

チャレンジ ★★

6 つぎのプログラムを実行すると、何が表示されますか。

Python

```
m = 1000
for i in range(10):
    m = m + 500
if m >= 5000:
    print("たまった")
else:
    print("まだ")
```

7 0.25 を 4 回たした x について、if $x == 1$: で比べると、「等しい」と判断されます。0.1 を 10 回たしたときとちがうのはなぜですか。

8 0.1 を 10 回たして 1 を作りたいとき、ずれが出ないようにするには、どう計算すればよいですか。1 つ説明しましょう。

✓ ふりかえり できるようになったかな？

- ☐ 変数と代入のプログラムの結果を予想できる。 → 408 ページ
- ☐ くり返しと「もし～なら」のプログラムを読める。 → 410 ページ
- ☐ 小数のずれのわけと対策を説明できる。 → 412 ページ



デルタ

コンピュータは計算が速いけれど、数を覚えるけたには限りがあるんだ。式で考える力と組み合わせて使おう。

こたえ

「じぶんでとう」は **じ1** しょうまつもんだい、章末問題は **1** ばんごう のように番号をつけています。とき方は、**同** かたち **じ** れいだい **形** たし の例題にもどって確かめよう。

2-1

- じ1** (1) かぞえる数 (2) はかる数
(3) かぞえる数 (4) はかる数
(5) かぞえる数

- じ2** (1) 6000 mL (2) 5 m (3) 400
本、4000 本

- じ3** (1) 94 mm、9.4 cm (2) 235 cm、
2.35 m

- じ4** (1) 4 cm 3 mm (2) 4.3 cm
(3) 43 mm

- じ5** (1) $\frac{1}{100}$ の位。0.01 kg が 7 こ
(2) 407 こ (3) 40.7、407、0.407

- じ6** 2400 mL、0.85 m

- じ7** (1) 0.8 kg (800 g) のメロン
(2) 2400 mm、2.3 m、225 cm

- 1** (1) はかる数 (2) かぞえる数
(3) はかる数 (4) かぞえる数

- 2** (1) 600 cm (2) 50 mm (3) 3 L
(4) 2000 g

- 3** 8 は 0.1 m が 8 こ、2 は 0.01 m が 2
こ。382 こ

- 4** 0.57 → 5.7、57、0.057 4.3 → 43、
430、0.43

- 5** (1) 260 cm (2) 750 mL
(3) 0.48 kg (4) 3.5 cm

- 6** (1) 12 cm 6 mm (2) 12.6 cm
(3) 126 mm

- 7** 200 本、2000 本

- 8** (1) 2.1 m (210 cm) (2) 1350 mm、
1.3 m、128 cm (cm にそろえると
135、130、128)

- 9** (1) 1.5 m (2) 25 cm (3) 0.6 m

2-2

- じ1** (1) -2 kg (2) 3 kg へること
(3) -5 kg

- じ2** (1) $-1 > -4$ ($-4 < -1$)
(2) $0 > -2.5$ ($-2.5 < 0$) (3) -1、
0、1、2、3

- じ3** (1) 3 (2) -2 (3) -7

- じ4** (1) -4 (2) 3 (3) 3

- じ5** (1) $(-1) - (-7) = 6$ 。6°C 上がった
(2) $(-3) - 4 = -7$ 。7°C 下がった
(3) $1 - (-6) = 7$ 。7°C

- じ6** (1) -12 (2) -21 (3) 10 (4) 12

- じ7** (1) -3 (2) 3 (3) -3

- じ8** 3 秒後： $(-2) \times 3 = -6$ で -6 m
3 秒前： $(-2) \times (-3) = 6$ で +6 m

- 1** (1) -15 m (2) 海面より 120 m
低い所

- 2** (1) < (2) > (3) <

- 3** (1) -4、-3、-2、-1、0、1
(2) -1、0、1、2

- 4** (1) 4 (2) -3 (3) -5 (4) -4
(5) -4 (6) 4

5 (1) -21 (2) -20 (3) 36

(4) -5 (5) 3

6 $(-2) - (-11) = 9$. 9°C

7 -15m . 下向きを+にすると $+15\text{m}$

8 (1) 30 (2) -1

2-3

じ1 (1) 1250g (2) 140cm (3) 時間
と長さなので計算できない

じ2 $3 - (-5) = 8$ $+8^{\circ}\text{C}$ (上がった)、
 $-1 - 3 = -4$ -4°C (下がった)

じ3 $0 \rightarrow 2$ 分は $16 - 10 = 6$ 、 $2 \rightarrow 4$ 分は
 $25 - 16 = 9$ 、 $4 \rightarrow 6$ 分は
 $31 - 25 = 6$ 。2 分から 4 分 ($+9\text{L}$)

じ4 時刻の変化量 $9 - 5 = 4$ (分)、水の量
の変化量 $61 - 25 = 36$ (L)、
 $36 \div 4 = 9$ 1 分あたり 9L

じ5 $8 - 12 = -4$ -4cm (4cm へった)。
 $4 \div 20 = 0.2$ 1 分あたり 0.2cm
へった

じ6 $1.2 \times 2 = 2.4$ 、 $0.4 \times 3 = 1.2$ 、
 $2.4 + 1.2 = 3.6$ 3.6kWh

1 (1) 325cm (2) 1500mL
(3) 30m (4) 4m/s

2 イ、エ。種類のちがう量 (長さ、時間、
重さと温度) はたせないから

3 (1) $6 - (-3) = 9$ $+9^{\circ}\text{C}$
(2) $0 - 6 = -6$ -6°C (3) 9 時
から 12 時 ($+5^{\circ}\text{C}$)

4 $\Delta t = 40\text{s} - 10\text{s} = 30\text{s}$ 、
 $\Delta x = 530\text{m} - 80\text{m} = 450\text{m}$ 、
 $450\text{m} \div 30\text{s} = 15\text{m/s}$

5 $6 \times 25 = 150$ 150m

6 $0.8 \times 6 = 4.8$ 4.8kWh

7 (1) $1 \times 3 = 3$ 3m

(2) $3 + 4 \times 2 = 3 + 8 = 11$ 11m

(3) $0 \sim 3$ 秒の長方形 (たて 1、よこ 3)
と、 $3 \sim 5$ 秒の長方形 (たて 4、よこ 2)
を合わせた部分

8 時刻の変化量 $7 - 2 = 5$ (分)、水の量
の変化量 $80 - 30 = 50$ (L)、
 $50 \div 5 = 10$ 1 分あたり 10L

9 $60 - 180 = -120$ -120L (120L
へった)。 $120 \div 6 = 20$ 1 分あたり
 20L へった

2-4

じ1 (1) $\frac{4}{7}$ (2) $\frac{75}{100} = \frac{3}{4}$
(3) $2 \div 5 = 0.4$ (4) $\frac{2}{3}$ (5) $4\frac{1}{2}$
(6) $\frac{11}{4}$

じ2 (1) $\frac{5}{10} + \frac{4}{10} = \frac{9}{10}$
(2) $\frac{9}{12} - \frac{8}{12} = \frac{1}{12}$
(3) $\frac{8}{12} + \frac{9}{12} = \frac{17}{12}$ ($1\frac{5}{12}$)
(4) $\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}\text{A}$

じ3 (1) $\frac{5}{6} \times \frac{3}{5} = \frac{15}{30} = \frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}\text{dL}$
(2) $\frac{3}{5} \times \frac{4}{3} = \frac{12}{15} = \frac{4}{5}$ $\frac{4}{5}\text{kg}$
(3) $\frac{5}{8} \times \frac{6}{5} = \frac{30}{40} = \frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}\text{m}^2$

じ4 (1) $\frac{6}{7} \times \frac{1}{3} = \frac{6}{21} = \frac{2}{7}$
(2) $\frac{8}{10} \times \frac{10}{6} = \frac{80}{60} = \frac{4}{3}$
(3) $\frac{5}{2} \times \frac{3}{5} = \frac{15}{10} = \frac{3}{2}$
(4) $\frac{9}{10} \times \frac{10}{15} = \frac{90}{150} = \frac{3}{5}$

じ5 ア (20)、エ (32)。イは 80、ウは 48

1 (1) $\frac{2}{5}$ (2) $\frac{7}{4}$ (3) $\frac{1}{6}$

2 $5 \div 4 = \frac{5}{4}$ $\frac{5}{4}$ 枚 (1.25 枚)

- 3 (1) $\frac{2}{3}$ (2) $\frac{3}{5}$ (3) $\frac{2}{3}$
- 4 (1) 0.75 (2) 0.4 (3) $\frac{2}{5}$ (4) $\frac{1}{4}$
- 5 (1) $2\frac{3}{5}$ (2) $\frac{14}{3}$
- 6 (1) $\frac{1}{2}$ (2) $\frac{5}{12}$ (3) $\frac{1}{2}$ (4) $\frac{2}{3}$
- 7 (1) $\frac{5}{6} \times \frac{9}{5} = \frac{3}{2}$ (2) $\frac{3}{4} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{8}$
(3) $\frac{4}{3} \times \frac{10}{8} = \frac{5}{3}$
- 8 (1) $\frac{4}{5} \times \frac{3}{8} = \frac{12}{40} = \frac{3}{10}$ $\frac{3}{10}$ kg
(2) $\frac{1}{2} \div \frac{2}{3} = \frac{1}{2} \times \frac{3}{2} = \frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ kg
- 9 (1) $\frac{15}{18} + \frac{4}{18} = \frac{19}{18} = 1\frac{1}{18}$
(2) $\frac{7}{8} + \frac{4}{8} = \frac{11}{8} = 1\frac{3}{8}$
- 10 (1) $\frac{9}{20}$ (2) $\frac{1}{2}$ (3) $\frac{1}{6}$ (4) $\frac{2}{3}$
(5) 2
- 11 (1) $50 \div \frac{2}{3} = 50 \times \frac{3}{2} = 75$ 75 m
(2) $\frac{2}{5} \times \frac{7}{4} = \frac{14}{20} = \frac{7}{10}$ $\frac{7}{10}$ kg
- 12 $\frac{6}{35} \times \frac{2}{7} = \frac{12}{245}$ で $\frac{3}{5}$ にもどらないので
まちがいの。逆数にせず、そのままかけて
いた。 $\frac{3}{5} \times \frac{7}{2} = \frac{21}{10}$
- 13 イ ($\frac{9}{8}$)、ウ ($\frac{15}{16}$)。アは $\frac{1}{2}$ 、エは $\frac{3}{5}$
- 14 $\frac{9}{4} \div \frac{3}{2} = \frac{9}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{18}{12} = \frac{3}{2}$ $1\frac{1}{2}$ m²
- 15 イ (133.3...)、ウ (132)、オ (360)
- 16 分子と分母の両方に $\frac{4}{3}$ をかけると、分
母は $\frac{3}{4} \times \frac{4}{3} = 1$ になり、 $\frac{3}{8} \times \frac{4}{3}$ がのこ
る。答えは $\frac{12}{24} = \frac{1}{2}$
- 17 (1) $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{6}{6} = 1$
1 A (2) $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$ $\frac{5}{6}$ A
- 18 $36 \div 24 = \frac{36}{24} = \frac{3}{2}$ $\frac{3}{2}$ 回転

2-5

- じ1 (1) 3 : 5 (2) 24 g
- じ2 A : C = 1 : 12 より、36 回転
- じ3 $44 \div 22 = 2$ (回転)、 $2 \times 2 = 4$ (m)、
 $60 \times 4 = 240$ 240 m
- じ4 (1) 85%、8 割 5 分
(2) $170 \div 200 = 0.85$ で 85%
- じ5 (1) $300 \div 250 = 1.2$ で 120%
(2) 20%
- じ6 (1) $1800 \times 0.85 = 1530$ (円)
(2) $150 \div 1.25 = 120$ (g)
(3) $450 \times 1.2 = 540$ (mL)
- じ7 (1) $15 \div 300 = 0.05$ で 5%
(2) $800 \times 0.05 = 40$ 40 m
- 1 (1) 2 : 3 (2) 3 : 2 (3) 3 : 4
- 2 12 kg
- 3 (1) 1 : 12 (2) 240 回転
- 4 65%、6 割 5 分
- 5 (1) 2400 円 (2) 400 mL
- 6 (1) 115% (2) 75%
- 7 A 店 2250 円、B 店 2340 円で、A 店が
90 円安い
- 8 (1) 3 回転 (2) $60 \times 3 \times 2 = 360$
(m)

2-6

- じ1 12.12 cm (12.11~12.13 ならよい)
- じ2 (1) $42.9 \div 3 = 14.3$ で 14.3 秒
(2) 1.43 秒
- じ3 6.0 cm = 60 mm、 $60 \div 15 = 4$ で
4 mm

- じ4** $60 \text{ 秒} + 2.40 \text{ 秒} = 62.40 \text{ 秒}$ 、
 $62.40 \div 40 = 1.56$ で 1.56 秒
- じ5** (1) 8.3 m (2) 0.47 秒 (3) 4.0 L
- じ6** 3.55 m 以上 3.65 m 未満、 $\pm 0.05 \text{ m}$
- じ7** (1) 19.5 g から 20.5 g まで
 (2) $0.5 \div 20.0 = 0.025$ で 2.5%
- じ8** はんいは 9.9~10.1 g。9.95 g と
 10.06 g
- じ9** (1) $2.50 \div 5 = 0.50$ で 0.50 kg
 (2) 0.55 kg で、0.05 kg
- じ10** (1) $75.0 \div 50 = 1.5$ で 1.5 mm
 (2) $0.05 \div 50 = 0.001$ で $\pm 0.001 \text{ mm}$
- 1** 9.52 cm
- 2** $41.0 \div 5 = 8.2$ で 8.2 秒
- 3** $4.6 \text{ cm} = 46 \text{ mm}$ 、 $46 \div 500 = 0.092$
 で 0.092 mm
- 4** $60 \text{ 秒} + 5.20 \text{ 秒} = 65.20 \text{ 秒}$ 、
 $65.20 \div 20 = 3.26$ で 3.26 秒
- 5** (1) 3.1 (2) 12.6 (3) 0.51
 (4) 20.0
- 6** 5.95 cm 以上 6.05 cm 未満、 $\pm 0.05 \text{ cm}$
- 7** (1) 29.7 mm から 30.3 mm まで
 (2) $0.3 \div 30.0 = 0.01$ で 1%
- 8** 11.85 mm と 12.15 mm (はんいは
 11.8~12.2 mm)
- 9** (1) $7.55 \div 5 = 1.51$ で 1.51 m
 (2) 1.46 m。 $1.51 - 1.46 = 0.05$ で
 0.05 m
- 10** (1) ア $0.9 \div 10 = 0.09$ で 0.09 mm、
 イ $18.4 \div 200 = 0.092$ で 0.092 mm
 (2) ア $0.05 \div 10 = 0.005$ で
 $\pm 0.005 \text{ mm}$ 、
 イ $0.05 \div 200 = 0.00025$ で
 $\pm 0.00025 \text{ mm}$ 。イのほうが細かい

- 11** (1) $40.20 + 39.90 + 40.50 = 120.60$ 、
 $120.60 \div 3 = 40.20$ で 40.20 秒
 (2) $40.20 \div 20 = 2.01$ で 2.01 秒
- 12** (1) 152.25 g 以上 152.35 g 未満
 (2) 152 g
- 13** (1) 2 けた (2) 4 けた (3) 2 けた
 (前の 0 は数えない)
- 14** 秒 にすると 61.20、60.90、61.50 秒 。
 合計 183.60、 $183.60 \div 3 = 61.20$ 。
 $61.20 \div 30 = 2.04$ で 2.04 秒
- 15** (1) 39.8 mm から 40.2 mm まで
 (2) $0.2 \div 40.0 = 0.005$ で 0.5%
 (3) 40.18 mm
- 2-7**
- じ1** (1) 64 (2) 1 (3) 1000000
- じ2** 3 時間は $60 \times 3 = 180$ で 180 分。
 $180 \div 20 = 9$ 回なので $2^9 = 512$ で
 512 こ
- じ3** $30^3 = 27000$ で 27000 cm^3 、27 L
- じ4** (1) 7×10^{12} (2) 1.2×10^8
 (3) 250000 (25 万)
- じ5** (1) 10^8 (2) 10^3 (3) 10^{-3} (4) $\frac{1}{8}$
- じ6** $2^6 = 64$ 、 $2^7 = 128$ なので 7 回。
 $20 \times 7 = 140$ で 140 分後。
 $140 = 60 \times 2 + 20$ なので 2 時間 20 分
 後
- 1** (1) 16 (2) 125 (3) 100000
 (4) 1
- 2** $10^3 = 1000$ で 1000 cm^3 、1 L。
 $1 \text{ m}^3 = 1000000 \text{ cm}^3 = 1000 \text{ L}$
- 3** (1) 3×10^8 (2) 6×10^{12}
 (3) 2.5×10^5 (4) $1.5 \times 10^8 \text{ km}$

4 (1) 10^8 (2) 2^7 (3) 10^5 (4) 2^8

5 (1) 1 (2) 0.01 (3) $\frac{1}{2}$

(4) $10^0 = 1$

6 (1) 1000000 (2) 25000

(3) 700000000 (7 億)

7 $1\text{ m} = 1000\text{ mm}$ 。

$0.1 \times 2^{13} = 819.2\text{ mm}$ 、

$0.1 \times 2^{14} = 1638.4\text{ mm}$ なので、14 回

8 $2^9 = 512$ 、 $2^{10} = 1024$ なので、10 回
ふえたとき。 $20 \times 10 = 200$ で 200 分
後。 $200 = 60 \times 3 + 20$ なので 3 時間
20 分後

9 $10^{3+(-3)} = 10^0$ で、□は 0。
 $1000 \times \frac{1}{1000} = 1$ で、 $10^0 = 1$ と合う

2-8

じ1 (1) 8 と -8 (2) 10 (3) 0.4

じ2 $2.2^2 = 4.84$ 、 $2.3^2 = 5.29$ 、
 $2.23^2 = 4.9729$ 、 $2.24^2 = 5.0176$ より
 $2.23 \dots$ で、約 2.2 cm

じ3 $7^2 = 49$ 、 $8^2 = 64$ より、7 と 8 の間

じ4 (1) 2.24 (2.2360...) (2) $\sqrt{36} = 6$
(3) $\sqrt{25} = 5$

じ5 (1) $\sqrt{16} = 4$ で 4 倍
(2) $\sqrt{3} = 1.732 \dots$ で約 1.73 倍

じ6 (1) $1.6\text{ m} = 160\text{ cm}$ で 16 倍。
 $\sqrt{16} = 4$ 倍で、 $0.63 \times 4 = 2.52$ で
2.52 秒 (2) $1.89 \div 0.63 = 3$ 倍。長
さは $3^2 = 9$ 倍で 90 cm

1 (1) 6 と -6 (2) 11 (3) 0.7

2 $5.4^2 = 29.16$ 、 $5.5^2 = 30.25$ 、
 $5.47^2 = 29.9209$ 、 $5.48^2 = 30.0304$
より $5.47 \dots$ で、約 5.5 m

3 (1) 2.65 (2) 3.32

4 (1) 3 (2) $\sqrt{64} = 8$

(3) $\sqrt{100} = 10$

5 $2\text{ m} = 200\text{ cm}$ で、 $200 \div 50 = 4$ 倍の
長さ。周期は $\sqrt{4} = 2$ 倍で、
 $1.4 \times 2 = 2.8$ 。約 2.8 秒

6 (1) $4^2 = 16$ 、 $5^2 = 25$ より 4 と 5 の間
(2) $7^2 = 49$ 、 $8^2 = 64$ より 7 と 8 の間

7 $\sqrt{9} = 3$ 倍。2 倍にするには $\sqrt{2}$ 倍で、
約 1.41 倍

8 周期 2 倍には、長さ $2^2 = 4$ 倍。100 cm

9 $(\sqrt{2} \times \sqrt{2}) \times (\sqrt{2} \times \sqrt{2}) = 2 \times 2 = 4$

2-9

じ1 (1) 0.35 (2) 0.285714 285714...
(3) 0.2727...。「27」が 2 けたずつ。
 $9 \div 2 = 4$ あまり 1 なので、組の 1 けた
めで 2

じ2 $8 \div 6 = 1$ あまり 2 なので、「428571」
の 2 けためで 2

じ3 (1) $\frac{4}{10} = \frac{2}{5}$ (2) $\frac{45}{100} = \frac{9}{20}$
(3) $\frac{12}{99} = \frac{4}{33}$

じ4 有理数: 1.25、 $\sqrt{16}$ (= 4)、 $\frac{1}{6}$ 、
0.777... 無理数: $\sqrt{3}$

じ5 (1) 直径は 66 cm。
 $66 \times 3.14 = 207.24$ で 207.24 cm
(2) $157 \div 3.14 = 50$ で 50 cm

じ6 $60 \times 3.14 = 188.4\text{ cm}$ 、
 $188.4 \times 1000 = 188400\text{ cm}$ 。
 $188400 \div 100 = 1884$ で 1884 m。
 $1\text{ km} = 1000\text{ m}$ なので 1.884 km

1 (1) 0.625 (終わる) (2) 0.444...
(くり返す) (3) 0.2727... (くり返す)

2 (1) $\frac{4}{5}$ (2) $\frac{9}{25}$ (3) $\frac{7}{9}$

3 有理数: $\frac{3}{7}$ 、 $\sqrt{25}$ (= 5)、0.6 無理数: $\sqrt{2}$ 、 π 、 $\sqrt{10}$

4 (1) 25.12 cm (2) 直径 10 cm なので 31.4 cm

5 $94.2 \div 3.14 = 30$ で 30 cm

6 $\sqrt{36} = 6$ 、 $\sqrt{49} = 7$ ($\sqrt{40}$ と $\sqrt{50}$ は無理数)

7 6 けたずつくり返す。20 ÷ 6 = 3 あまり 2 なので、くり返しの 2 つ目の 4

8 $66 \times 3.14 = 207.24$ cm。
 $207.24 \times 1000 = 207240$ cm。
 $207240 \div 100 = 2072.4$ m、
 $2072.4 \div 1000 = 2.0724$ で、約 2.07 km

9 $18 \div 6 = 3$ あまり 0 なので、3 組めがちょうど終わる。「571428」の最後の 8

10 $\frac{22}{7} = 3.142857142857\ldots$ で、 π より少し大きい。分子も分母も整数の分数なので有理数

2-10

1 (1) 800 m (2) 1200 g (3) 2.5 g

2 (1) $2 \text{ h} \times 60 \text{ min/h} \times 60 \text{ s/min} = 7200$ 秒 (2) $7 \text{ d} \times 24 \text{ h/d} \times 60 \text{ min/h} = 10080$ 分

3 $2 \text{ min} \times 60 \text{ s/min} = 120 \text{ s}$ 。
 $600 \div 120 = 5$ で 5 m/s

4 (1) 5 m/s (2) 108 km/h

5 (1) $60 \text{ km/h} \times 45 \text{ min} \times 1 \text{ h/60 min} = 45 \text{ km}$
(2) $5 \text{ m/s} \times 600 \text{ s} = 3000 \text{ m} = 3 \text{ km}$

6 (1) $3000 \text{ mL} \div 150 \text{ mL} = 20$ で 20 ばい (2) $15 \text{ m/s} \div 5 \text{ m/s} = 3$ で 3 倍

7 (1) $2000 \text{ mL} \div 400 \text{ mL} = 5$ で 5 はい (2) 18 km/h は 5 m/s 。
 $25 \div 5 = 5$ で 5 倍

8 (1) 2 m/s^2 (2) $\text{m} \div (\text{m/s}) = \text{s}$ で、時間の単位と合う (正しい)

9 (1) 2 m/s^2 (2) $\text{m} \times \text{s}$ で、速さの単位 m/s と合わない (まちがい)

10 (1) 30000 cm^2 (2) 300 cm^3
(3) 0.5 mm (4) 40 μm

11 (1) 5000 cm^2 (2) 1200 cm^3
(3) 2000 μm (4) 0.25 mm

1 (1) 4200 m (2) 0.75 g
(3) 500 mL (4) 15000 cm^2
(5) 200 μm (6) 0.04 mm

2 $2 \text{ d} \times 24 \text{ h/d} \times 60 \text{ min/h} = 2880$ 分

3 $365 \text{ d} \times 24 \text{ h/d} \times 60 \text{ min/h} \times 60 \text{ s/min} = 31536000$ 秒

4 $3 \text{ min} \times 60 \text{ s/min} = 180 \text{ s}$ 、
 $180 \text{ s} + 20 \text{ s} = 200 \text{ s}$ 。800 ÷ 200 = 4 で 4 m/s

5 (1) 25 m/s (2) 54 km/h

6 $6 \div 3 = 2$ で 2 m/s^2

7 イ ($\text{m/s} \div \text{s} = \text{m/s}^2$ で、m にならない)

8 $2.4 \text{ L} \times 1000 \text{ mL/L} = 2400 \text{ mL}$ 。
 $2400 \div 200 = 12$ で 12 はい

9 $288 \div 3.6 = 80$ で 80 m/s 。
 $80 \div 10 = 8$ で 8 倍

10 (1) 0.08 mm (2) $1 \div 0.08 = 12.5$ で 12.5 本分

2-11

- 【1】 $y = 20 + 3 \times t$, $t = 8$ のとき
 $20 + 24 = 44$ で 44 L
- 【2】 $y = 120 - 8 \times t$, $t = 5$ のとき
 $120 - 40 = 80$ で 80 ページ
- 【3】 (1) 16 (2) 10 (3) 10
- 【4】 (1) $1000 - (80 \times 5 + 120) = 480$ で 480 円 (2) $(250 + 150) \times 3 = 1200$ で 1200 円 (3) $(38 + 42) \div 2 = 40$ で 40 kg
- 【5】 (1) ノート 4 冊とえんぴつ 2 本で 720 円 (2) ノートとえんぴつを 2 つずつで 420 円
- 【6】 $1 + 5 \times n$ (本)、 $n = 30$ のとき
 $1 + 150 = 151$ で 151 本
- 【7】 $(1 + 2) \times 5 - 3 = 12$
- 【8】 (1) $(100 + 3) \times 7 = 700 + 21 = 721$
 (2) $(100 - 2) \times 5 = 500 - 10 = 490$
- 【1】 (1) 26 (2) 42 (3) 27 (4) 8
 (5) 2 (6) 15 (7) 17 と 25
- 【2】 (1) -11 (2) 12 (3) 2
- 【3】 $500 - (80 \times 2 + 60) = 500 - 220 = 280$ で 280 円
- 【4】 $y = 30 - 2 \times t$, $t = 10$ のとき
 $30 - 20 = 10$ で 10 cm
- 【5】 $2 + 5 \times n$ (本)、 $n = 10$ のとき 52 本
- 【6】 (1) $(100 + 1) \times 9 = 909$
 (2) $(50 - 1) \times 4 = 196$
- 【7】 $y = 200 + 100 \times t$, $t = 3$ のとき 500 円
- 【8】 $500 - 60 \times 5 = 500 - 300 = 200$ で 200 円。ひくのは 60×5 という 1 つのまとまりで、×が先なので、かっこは要らない

- 【9】 (1) ジュース 3 本とパン 2 こで 660 円
 (2) ジュースとパンを 2 つずつで 540 円
- 【10】 $(70 + 80 + 90) \div 3 = 240 \div 3 = 80$ で 80 点
- 【11】 12 m/s のとき 9 m、25 m/s のとき 18.75 m
- 【12】 $(2 + 3) \times 4 - 1 = 19$
- 【13】 $(9.4 + 9.8 + 9.6) \div 3 = 28.8 \div 3 = 9.6$ で 9.6 秒
- 【14】 (1) A を 3 こと B を 5 こで 22 kg
 (2) A と B を 1 こずつ組にして 5 組で 30 kg
- 【15】 $8 - 2 \times (3 + 1) = 8 - 8 = 0$

2-12

- 【1】 (1) $2xy$ (2) a^3 (3) $\frac{a-b}{3}$
- 【2】 (1) $5y$ (2) $4x + 3$ (3) まとめられない ($a^2 + a$ のまま) (4) $-3b + 6$
- 【3】 (1) $5x - 10$ (2) $-2y - 5$
 (3) $3a - 2$
- 【4】 $2a + 2 - a + 5 = a + 7$ 。 $a = 2$ のとき、もとの式は $6 - (-3) = 9$ 、
 $a + 7 = 9$
- 【5】 (1) a^7 (2) y^2 (3) t (4) b^4
 (5) 1 (6) $3t + 2$
- 【1】 (1) $4ab$ (2) x^2y (3) $\frac{m}{2}$
 (4) $-a$ (5) $\frac{x-3}{5}$
- 【2】 (1) $5x$ (2) $-3a + 4$ (3) まとめられない (4) $3x + 4$
- 【3】 (1) $12x - 8$ (2) $-5 + 2y$
 (3) $3a + 2$
- 【4】 (1) x^7 (2) a^5 (3) x^2 (4) 1
- 【5】 アとウ

6 $3(x+4) = 3x + 12$

7 $\frac{20h+5h^2}{h} = \frac{20h}{h} + \frac{5h^2}{h} = 20 + 5h$

8 $2x+6-x+1 = x+7$

9 指数のきまりで $x^{2+(-2)} = x^0 = 1$ 。分
数で $x^2 \times \frac{1}{x^2} = 1$ 。同じ

2-13

じ1 (1) 17 (2) 30 (3) 6

じ2 $2 \text{ min} \times 60 \text{ s/min} = 120 \text{ s}$ 。
 $20 \text{ m/s} \times 120 \text{ s} = 2400 \text{ m}$

じ3 $1.2 \text{ m} \times 100 \text{ cm/m} = 120 \text{ cm}$ 。
 $30 \text{ cm} \times 120 \text{ cm} = 3600 \text{ cm}^2$

じ4 (1) $9-6=3$ (2) 1 (3) 5、-9
(4) 5

じ5 (1) $2(b+3)-1=2b+5$
(2) $x=5(3+h)^2$ 、 $5 \times 3.1^2 = 48.05$

じ6 $C=15$ で 59°F 、 $C=16$ で 60.8°F 。
 15°C と 16°C のあいだ

じ7 (1) $3.14 \times 20 \text{ cm} = 62.8 \text{ cm}$
(2) $(0.4 \text{ m})^2 = 0.16 \text{ m}^2$

1 (1) 5 (2) 10 (3) 6 (4) 18

2 (1) ア -10 イ 4 ウ 5 エ -4 (2) ア
2 イ 1

3 $4 \text{ min} \times 60 \text{ s/min} = 240 \text{ s}$ 。
 $1.5 \text{ m/s} \times 240 \text{ s} = 360 \text{ m}$

4 (1) 77°F (2) -4°F

5 $3(t-2)-4=3t-6-4=3t-10$

6 $0.5 \text{ m} \times 100 \text{ cm/m} = 50 \text{ cm}$ 。
 $4 \text{ cm} \times 50 \text{ cm} = 200 \text{ cm}^2$

7 $5 \times 0.15^2 = 0.1125 \text{ m}$ 。
 $0.1125 \text{ m} \times 100 \text{ cm/m} = 11.25 \text{ cm}$

8 $5 \times 1.01^2 = 5.1005$ 。5 に近づいた

9 $C=37$ で 98.6°F 、 $C=38$ で
 100.4°F 。 37°C と 38°C のあいだ

2-14

じ1 (1) $x=3$ (2) $x=11$ (3) $x=9$
(4) $x=16$

じ2 $a=b-6$ (両辺から 6 をひく)。
 $a=21-6=15$ で 15°C

じ3 $v = \frac{x}{t}$ (両辺を t でわる)。
 $v = \frac{150}{30} = 5$ で 5 m/s

じ4 両辺に R をかけて $IR=V$ 、両辺を I
でわって $R = \frac{V}{I}$ 。 $R = \frac{3}{0.1} = 30$ で
 30Ω

じ5 -10 を移項して $h+10=2t$ 、両辺を
2 でわって $t = \frac{h+10}{2}$ 。
 $t = \frac{30+10}{2} = 20$ で 20 秒後

じ6 $2m=a+b$ 、 $a=2m-b$ 。
 $a=2 \times 70-65=75$ で 75 点

じ7 $6 \text{ km} \times 1000 \text{ m/km} = 6000 \text{ m}$ 。
 $t = \frac{6000}{4} = 1500$ で 1500 s 。
 $1500 \text{ s} \div 60 \text{ s/min} = 25 \text{ min}$

1 (1) $x=7$ (2) $x=10$ (3) $x=7$
(4) $x=21$

2 ① -2 を移項する (両辺に 2 をたす)
② 両辺を 4 でわる

3 $t = \frac{x}{v}$ 。 $t = \frac{3000}{5} = 600$ で 600 s 。
 $600 \text{ s} \div 60 \text{ s/min} = 10 \text{ min}$

4 $R = \frac{V}{I}$ 。 $R = \frac{12}{0.5} = 24$ で 24Ω

5 $x = \frac{y-30}{4}$ 。 $x = \frac{70-30}{4} = 10$ で
10 本

6 (1) $b=c-a$ (2) $a = \frac{S}{b}$
(3) $a=2m-b$

7 両辺に 1.8 をかけて $1.8C=F-32$ 、
 -32 を移項して $F=1.8C+32$ 。
 $F=1.8 \times 25+32=77$

8 $d = \frac{\ell}{\pi}$ 。 $d = \frac{2}{3.14} = 0.636 \dots$ で約 0.64 m

9 +6 を移項するとき、符号を変えていない。正しくは $y - 6 = 2x$ より $x = \frac{y-6}{2}$ ($y = 10$ なら $x = 2$ で、 $2 \times 2 + 6 = 10$)

2-15

① $a = \frac{12}{3} = 4$ で $y = 4x$ 。
 $y = 4 \times 10 = 40$ で 40 cm

② (1) $6 \text{ cm} \div 100 \text{ cm/m} = 0.06 \text{ m}$,
 $k = \frac{1.5}{0.06} = 25$ で 25 N/m
(2) $25 \times 0.12 = 3$ で 3 N
(3) $\frac{2}{25} = 0.08$ で 0.08 m,
 $0.08 \text{ m} \times 100 \text{ cm/m} = 8 \text{ cm}$

③ (1) $I = \frac{4.5}{50} = 0.09$ で 0.09 A
(2) $V = 50 \times 0.2 = 10$ で 10 V
(3) $R = \frac{9}{0.3} = 30$ で 30 Ω

④ (1) $30 \times 4 = 120$ 、 $120 \div 20 = 6$ で 6 回転 (2) 2 倍

⑤ (1) $y = 6x$ 、比例 (2) $y = \frac{30}{x}$ 、反比例 (3) $y = 100 - x$ 、どちらでもない

⑥ (1) $4 \times 4 = 16$ 倍、 $5 \times 16 = 80$ で 80 m (2) $\sqrt{16} = 4$ で 4 倍、約 4 秒

⑦ 1 本は $\frac{120}{50} = 2.4$ で 2.4 g、 $y = 2.4x$ 。
 $0.96 \text{ kg} \times 1000 \text{ g/kg} = 960 \text{ g}$ 。
 $x = \frac{960}{2.4} = 400$ で 400 本

① (1) $y = 80x$ 、比例 (2) $y = \frac{24}{x}$ 、反比例 (3) $y = x + 20$ 、どちらでもない

② $a = \frac{10}{4} = 2.5$ で $y = 2.5x$ 。
 $y = 2.5 \times 10 = 25$

③ (1) $4 \text{ cm} \div 100 \text{ cm/m} = 0.04 \text{ m}$,
 $50 \times 0.04 = 2$ で 2 N

(2) $\frac{3}{50} = 0.06$ で 0.06 m,
 $0.06 \text{ m} \times 100 \text{ cm/m} = 6 \text{ cm}$

④ (1) $\frac{3}{10} = 0.3$ で 0.3 A
(2) $10 \times 1.2 = 12$ で 12 V

⑤ (1) $36 \div 12 = 3$ で 3 時間
(2) $36 \div 2 = 18$ で時速 18 km

⑥ 2 乗に比例: $3 \times 3 = 9$ で 9 倍。反比例: $\frac{1}{3}$ 倍

⑦ 4 倍。約 100 cm (約 1 m)

⑧ $4 \text{ cm} \div 100 \text{ cm/m} = 0.04 \text{ m}$,
 $k = \frac{2}{0.04} = 50$ で 50 N/m。
 $x = \frac{3}{50} = 0.06$ で 0.06 m,
 $0.06 \text{ m} \times 100 \text{ cm/m} = 6 \text{ cm}$

⑨ $R = \frac{3}{0.6} = 5$ で 5 Ω 。電圧が 2 倍なの
で電流も 2 倍で 1.2 A

2-16

① (1) $x = 2 - 8 = -6$ ($-6 + 8 = 2$)
(2) $x = (-28) \div 4 = -7$
($4 \times (-7) = -28$)

② $7x - 4x = 17 - 2$, $3x = 15$, $x = 5$
(両辺とも 37)

③ $2x - 6 = x + 4$, $2x - x = 4 + 6$,
 $x = 10$ (両辺とも 14)

④ $2x + 10 = 5x - 20$,
 $2x - 5x = -20 - 10$, $-3x = -30$,
 $x = 10$ (両辺とも 3)

⑤ $x + 8 = 2x + 2$, $x - 2x = 2 - 8$,
 $-x = -6$, $x = 6$ (両辺とも 7)

⑥ $1.5x = 1 \times (x + 4)$, $1.5x - x = 4$,
 $0.5x = 4$, $x = 8$ で 8 分後 (駅から 12 km)

【7】 $5 + 3x = 25 + x$, $2x = 20$, $x = 10$
で 10 分後、35 cm

【8】 $4x + 2 = 6x - 10$,
 $4x - 6x = -10 - 2$, $-2x = -12$,
 $x = 6$. 6 人、 $4 \times 6 + 2 = 26$ で 26 枚

【9】 交わるのは $t = 3$, $y = 12$.
 $4t - t = 9$, $3t = 9$, $t = 3$ で同じ

【10】 $60x + 100x = 1200$, $160x = 1200$,
 $x = 7.5$ で 7.5 分後

【1】 (1) $x = -5$ (2) $x = -3$ (3) $x = 6$
(4) $x = 5$ (5) $x = 9$ (6) $x = 10$

【2】 3 (左辺も右辺も 11)

【3】 $3.5 \text{ m/s} \times 60 \text{ s/min} = 210 \text{ m/min}$.
 $210x = 70(x + 5)$, $140x = 350$,
 $x = 2.5$ で 2.5 分後

【4】 $20 + 4x = 80 - 2x$, $6x = 60$,
 $x = 10$ で 10 分後、60 L

【5】 交わるのは $t = 6$ のとき ($y = 18$).
 $2t = 12$ より $t = 6$ で同じ

【6】 方程式: $25t = 40 + 15t$, $10t = 40$,
 $t = 4$. 差:
 $25 \text{ m/s} - 15 \text{ m/s} = 10 \text{ m/s}$,
 $40 \text{ m} \div 10 \text{ m/s} = 4 \text{ s}$. どちらも 4 秒後

【7】 $3x + 8 = 5x - 6$, $-2x = -14$,
 $x = 7$. 7 人、あめは $3 \times 7 + 8 = 29$ で
29 個

【8】 移項すると $0 = 10$ となり、解がない。
いつまでも 10 m はなれたままで、追いつかない

2-17

【1】 $32 + 4 + 2 = 38$. 38

【2】 $27 - 16 = 11$, $11 - 8 = 3$, 4 は使わない、 $3 - 2 = 1$, $1 - 1 = 0$. $11011_{(2)}$

【3】 (1) $2^{10} = 1024$ 段階

(2) $512 \div 1024 = 0.5$. 0.5 g

【4】 $2^{10} = 1024$ 段階。

$3 \div 1024 = 0.0029296 \dots$. 小数第 5 位は 2 なので切り捨てて、約 0.0029 V

【5】 $1110|0101$. $1110_{(2)} = 14$ で E,
 $0101_{(2)} = 5$ で 5. $E5_{(16)}$.

$16 \times 14 + 5 = 229$

【6】 赤 $16 \times 2 + 0 = 32$ 、緑

$16 \times 8 + 0 = 128$ 、青

$16 \times 10 + 0 = 160$

【7】 4 ビットは $2^4 = 16$ 通り。

$16 \times 16 \times 16 = 4096$ 通り (2^{12})

【8】 $2 \text{ min} \times 60 \text{ s/min} = 120 \text{ s}$.

$120 \text{ s} \times 30 \text{ 枚/s} = 3600 \text{ 枚}$. 3600 枚

【1】 (1) $0110_{(2)}$ ($110_{(2)}$ でもよい)、6

(2) $1001_{(2)}$ 、9 (3) $111111_{(2)}$ 、63

【2】 (1) $111_{(2)}$ (2) $10010_{(2)}$

(3) $110010_{(2)}$

【3】 (1) $2^5 = 32$ 通り

(2) $2^{12} = 4096$ 通り

【4】 $2^8 = 256$ 段階. $128 \div 256 = 0.5$.
0.5 cm

【5】 $1111|0000$ で $F0_{(16)}$ 、

$16 \times 15 + 0 = 240$

【6】 赤 $16 \times 8 + 0 = 128$ 、緑 255、青 0

【7】 $11111111_{(2)}$ 、 $FF_{(16)}$ 、255

【8】 $2^{10} = 1024$ 段階。

$5 \div 1024 = 0.00488 \dots$ で、約
0.0049 V

【9】 (1) $8 \times 3 = 24$ ビット

(2) $256 \times 256 \times 256 = 2^{24}$
 $= 16777216$ 通り (約 1678 万通り)

10 $3 \text{ min} \times 60 \text{ s/min} = 180 \text{ s}$ 。
 $180 \text{ s} \times 44100 \text{ 回/s} = 7938000 \text{ 回}$

11 どの位も $1 + 1 = 2$ でくり上がり、
 $10000_{(2)} \circ 15 + 1 = 16$ 、
 $10000_{(2)} = 16$ で同じ

2-18

じ1 $=A2*B2$ 、 $120 \times 8 = 960$ (960 g)

じ2 $=(A2+B2)*2$ 、 $(5+8) \times 2 = 26$
(26 cm)

じ3 C3 から C7 へは下へ4つなので
 $=A7*B7$

じ4 $=A3*\$B\1 、 $2.5 \times 150 = 375$ (375 円)

じ5 $=B2+0.98$ 。0、0.98、1.96、2.94、
3.92、4.9 で、4.9 m/s

じ6 $=B2*2$ 。10 回折ると B2 から 10 行下の
B12。 $0.1 \times 2^{10} = 102.4$ で 102.4 mm

じ7 $=B2-0.2*(B2-20)$ 。B3 は
 $60 - 0.2 \times 40 = 52$ 、B4 は
 $52 - 0.2 \times 32 = 45.6$

じ8 A6 は $=\text{SUM}(A2:A5)$ で 50、A7 は
 $=\text{AVERAGE}(A2:A5)$ (または $=A6/4$) で
12.5

1 (1) 8 (2) B2

2 (1) $=A2+B2$ (2) $=A2*B2$
(3) $=A2/B2$

3 $10 + 6 \div 2 = 13$ 。平均は $=(A2+B2)/2$
で 8

4 $=B4*C4$

5 $=B6*\$E\1

6 B3 が 2150、B4 が 2300、B5 が
2450、B6 が 2600

7 C3 は $=A3*B3$ で 21、C4 は $=A4*B4$ で
20

8 $=B2*2$ 。 $1 \text{ h} \times 60 \text{ min/h} = 60 \text{ min}$ 、
 $60 \text{ min} \div 10 \text{ min} = 6$ で 2 倍が 6 回。
B8 で $100 \times 2^6 = 6400$

9 コピーすると B1 が $B2 \cdot B3 \cdots$ とずれる
から。 $=A3*\$B\1 に直す

10 $B3 \ 80 - 0.1 \times 60 = 74$ 、B4
 $74 - 0.1 \times 54 = 68.6$ 、B5
 $68.6 - 0.1 \times 48.6 = 63.74$

2-19

じ1 y は $10 - 3 = 7$ 、x は $7 \times 2 = 14$ 。
ひょうじ 表示は「14 7」

じ2 n は $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow 16$ 。16

じ3 $55 \geq 60$ は正しくないので、もういちど

じ4 p は $50 + 20 \times 3 = 110$ 。 $110 \geq 100$
なので OK

じ5 $0.625 - 0.5 = 0.125$ 、 $\frac{1}{4}$ は使わない、
 $0.125 - 0.125 = 0$ 。終わる。 $0.101_{(2)}$

じ6 $h = 1$ 、 $s = h * 3600$ 、 $ms = s * 1000$ 、
print(ms)。

$1 \text{ h} \times 3600 \text{ s/h} \times 1000 \text{ ms/s}$
 $= 3600000 \text{ ms}$ で 3600000

1 (1) b は 14、a は $7 + 14 = 21$ 。21

(2) $100 - 15 \times 4 = 40$

(3) $3 \times 2 \times 2 \times 2 = 24$

2 $12 \geq 15$ は正しくないので、ちいさい

3 ア $0.1_{(2)}$ 、イ $0.001_{(2)}$ 、エ $0.11_{(2)}$

4 プログラムは「x に 1 をたして x に入れ
なおす」代入。方程式は x と x + 1 が
等しいという意味で、解はない

5 3 週間 21 d ($7 \text{ 日} \times 3$)、 21 d
 $\times 24 \text{ h/d} = 504 \text{ h}$ 。504。3 週間が何時
間か (日にしてから時間になっている)

6 m は $1000 + 500 \times 10 = 6000$ 。

$6000 \geq 5000$ なので、たまった

7 0.25 は $\frac{1}{4}$ で、2進数で $0.01_{(2)}$ と終わるので、ぴったり覚えられ、ずれが出ないから

8 (例) 1 を 10 回たして整数の 10 を作り、最後に 10 でわる

こたえあ 答え合わせのしかた

- 1 まず自分の答えを全部書いてから、ここを見よう。
- 2 ちがっていたら、答えだけを直さずに、同じ形の例題にもどって、どの行でちがったかをさがそう。
- 3 単位もいっしょに確かめよう。数が合っても、単位がちがえば、ちがう量です (2-1)。

きごう 記号カード

この巻で出てきた記号と、この巻でよく使う前の巻の記号です。

きごう 記号	よ 読み方 かた	い 意味 み	しょう 章
=	イコール	ひだり みぎ おな おお 左と右が同じ大きさ	1-4
—	マイナス	ひき ざん ひき算。0 より小さい数の印にも使う (2-2)	1-5
×	かける	ぶん かず 1 つ分の数×いくつつ分	1-12
÷	わる	おな かず わ 同じ数ずつ分ける。1 あたりを求めると もと	1-14
$\frac{1}{2}$	2 分の 1	1 を 2 つに ひと ぶん ひとしく分けた 1 つ分	1-16
cm ²	平方センチメートル	べん せいほうけい ひろ 1 辺 1 cm の正方形の広さ	1-21
< > ≤ ≥	ふとうごう 不等号	おお 大きさをくらべる記号。≤ は「以下」、 い いか ≥ は「以上」	2-2
Δ	デルタ	へんかりよう 変化量。「あと—まえ」で求めると もと Δx は x の変化量。	2-3
%	パーセント	ひゃくぶんりつ きごう わりあい 百分率の記号。割合の 0.01 が 1%	2-5
±	プラスマイナス	ずれのはば。50.0 ± 0.1 は、49.9 から 50.1 まで	2-6
2 ³	2 の 3 乗	2 を 3 かい かず 回かけた数。2 × 2 × 2 = 8	2-7
cm ³	立方センチメートル	たいせき たん い 体積の単位。1 L = 1000 cm ³	2-7
√	ルート	2 乗すると中の数になる正の数。 せい かず √9 = 3	2-8
π	パイ	えんしゅうりつ えんしゅう ちよっけい 円周率。円周 ÷ 直径。3.14159...	2-9
μ	マイクロ	100 万ぶん の 1 (10 ⁻⁶) を表す接頭語。 あらわ せつとう ご 1 μm = 0.001 mm	2-10
m/s ²	メートル毎秒 毎秒	1 びょう ごとに はや なん 秒ごとに速さが何 m/s ふえるか	2-10
x	エックス	かず 数のかわりに使う文字。どんな数でも はい へい 入る箱。	2-11

つぎのページへつづく

記号	読み方	意味	しょう章
()	かっこ	ひとまとまりにする印。かっこの中を先に計算する。	2-11
x^{-1}	エックスのマイナス 1 乗	$\frac{1}{x}$ のこと。 x で 1 回わる。	2-12
x^0	エックスの 0 乗	1 のこと (x は 0 でない)。	2-12
°F	かしど	温度の単位。水がこおる温度が 32°F、ふっとうする温度が 212°F。	2-13
N	ニュートン	力の単位。質量 約 100 g の物にはたらく重さ (重力) が約 1N。	2-15
Ω	オーム	抵抗の単位。1V で 1A 流れる抵抗が 1 Ω 。	2-15
$10_{(2)}$	いち・ゼロ	2 進数で書いた数。 $10_{(2)}$ は 2 のこと。	2-17
$FF_{(16)}$	エフ・エフ	16 進数で書いた数。 $FF_{(16)}$ は 255 のこと。	2-17
*	アスタリスク	表計算やプログラムで、かけ算 $\times$ のかわりに使う記号。	2-18
\$	ドル	番地の列の文字・行の番号の前につけると、コピーしてもずれない。	2-18
==	イコール・イコール	プログラムで、左と右が等しいかを比べる記号。 = は代入。	2-19
>=	だいたいイコール	プログラムで $\geq$ のかわりに使う記号。左が右以上。	2-19

記号を書くときのちゅうい

この本では、問題をノートに解きます。手で書くと、ほかの字とまぎれやすい記号があります。書くときのコツです。

記号	まぎれやすいもの	書くときのコツ
x	かけ算の $\times$	2つの曲がった線を背中あわせに書く。文字式では $\times$ を書かない (2-12)
1	文字の l (エル)、 I (アイ)	1は上に小さなはねをつける。 l は下を右へ曲げる
0	文字の O (オー)	0はたて長に書く
2	文字の z	z はまん中に横線を1本入れる
t	たし算の $+$	t は下を右へ曲げる
− (マイナス)	漢字の「一」、のばす 音の「一」	数のすぐ前に、短く書く。−3のように、数とはなさない
$\div$	$+$	横線の上下に点を1つつ
$\frac{2}{3}$	$2/3$	横線は分子・分母より長く。分母は下
x^2	$x2$ 、 $2x$	2は右かたに小さく書く ($x \times x$ のこと)
$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	屋根の横線を、中の数の終わりまでのばす
$\leq$	$<$	下の線を2本。「以下」のときだけ書く (2-2)
5.0	5	ずれのはばを表す0は消さない (2-6)

よく使う定数・単位・公式

1 この巻で使う単位

りょう 量	たん い 単位 (読み方)	ほかのたん い 単位との関係	しょう 章
なが 長さ	m (メートル)	1 km = 1000 m、1 m = 100 cm、 1 cm = 10 mm	2-10
めんせき 面積	m ² (平方メートル)	1 m ² = 10000 cm ²	2-10
たいせき 体積	m ³ 、L (リットル)	1 L = 1000 cm ³ 、1 mL = 1 cm ³ 、 1 m ³ = 1000 L	2-7
しつりょう 質量	kg (キログラム)	1 kg = 1000 g	2-10
じ かん 時間	s (秒)	1 ぶん = 60 秒、 1 じ かん (h) = 3600 秒	2-10
はや 速さ	m/s、km/h	1 m/s = 3.6 km/h。時速を秒速にす るには÷ 3.6	2-3 2-10
はや 速さの ふえ方	m/s ²	1 秒ごとに、速さが何 m/s ふえるか	2-10
おん ど 温度	℃、K (ケルビン)	0 K は約 -273℃。これより低い温 度はない	2-2
ちから 力	N (ニュートン)	約 100 g の物の重さが約 1 N	2-15
でんあつ 電圧・電流	V (ボルト) A (アンペア)	電圧は電気をおしだす強さ、電流は なが りょう 流れる量	2-15
ていこう 抵抗	Ω (オーム)	電気の通りにくさ。1 Ω = 1 V ÷ 1 A	2-15
わりあい 割合	% (パーセント)	割合の 0.01 が 1%	2-5
じょうほう りょう 情報の量	ビット、バイト	8 ビット = 1 バイト (256 通りを表 せる)	2-17

2 世界共通の7つの基本単位 (SI)

りよう 量	きごう 記号	よかた 読み方	この本で出てくる所
なが 長さ	m	メートル	2-1・2-10
しつりよう 質量	kg	キログラム	2-10
じかん 時間	s	びよう 秒	2-10
でんりゅう 電流	A	アンペア	2-15
おんど 温度	K	ケルビン	2-2
ぶつしつりよう 物質質量	mol	モル	か がく つか (化学で使う)
ひかり つよ 光の強さ	cd	カンデラ	あか つか (明かりで使う)

3 大きな数・小さな数を表す記号 (接頭語)

きごう 記号	G	M	k	c	m	μ	n
よかた 読み方	ギガ	メガ	キロ	センチ	ミリ	マイクロ	ナノ
ばい 倍	10^9	10^6	10^3	10^{-2}	10^{-3}	10^{-6}	10^{-9}
れい 例	GB	MW	km kg	cm	mm mg	μg	nm

4 計算のきまり

きまり	式・例	しょう章
けいさん じゆんぱん 計算の順番	なか さき かつこの中が先。×・÷は+・-より先。 $2 + 3 \times 4 = 14$	2-11
い 入れかえ・ぶんぱい 入れかえ・分配	$a + b = b + a$ 、 $a \times b = b \times a$ 、 $(a + b) \times c = a \times c + b \times c$	2-11・2-12
ま とめてわる	$(A + B) \div h = A \div h + B \div h$	2-12
せい ふ かず 正負の数	$(-3) + (+5) = +2$ 、 $(+2) - (+5) = -3$ 、 $(-2) \times (-3) = +6$	2-2
ぶんすう ざん 分数のたし算	ぶん ぼ 分母をそろえて (つうぶん) 分子をたす。 $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$	2-4
ぶんすう ざん 分数のわり算	かず ぶん ぼ ぶん し い わる数の分母と分子を入れかえてかける。 $\frac{2}{3} \div \frac{4}{5} = \frac{2}{3} \times \frac{5}{4} = \frac{5}{6}$	2-4
し すう 指数のきまり	$x^m \times x^n = x^{m+n}$ 、 $x^0 = 1$ 、 $x^{-1} = \frac{1}{x}$ 、 $x^{-2} = \frac{1}{x^2}$	2-7・2-12
へいほうこん 平方根	$\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab}$ 。 $\sqrt{2} \times \sqrt{3} = \sqrt{6}$	2-8
とうしき せいしつ 等式の性質	りょうへん おな かず 両辺に同じ数をたす・ひく・かける・わる (0で わるのはだめ) と、等式のまま	2-14
い こう 移項	はんたい へん うつ + 3 を反対の辺へ移すと - 3。 $x + 3 = 8 \rightarrow x = 8 - 3$	2-14

5 この巻の公式

公式	式	章
速度	速度 = 道のり ÷ 時間、 $v = \frac{x}{t}$ 、 $x = vt$ 、 $t = \frac{x}{v}$	2-3・2-14
変化量	$\Delta x = (\text{あと}) - (\text{まえ})$	2-3
割合	割合 = くらべる量 ÷ もとにする量	2-5
平均	平均 = 合計 ÷ 個数	2-6
円周	円周 = 直径 × π	2-9
比例・反比例	$y = ax$ 、 $y = \frac{a}{x}$ (xy が一定)	2-15
ばね	$F = kx$ (k はばね定数、N/m)	2-15
オームの法則	$V = RI$ 、 $I = \frac{V}{R}$	2-15
振り子	糸の長さが4倍になると、周期は2倍 (周期は長さの $\sqrt{\quad}$ に比例)	2-8

6 よく使う数

名前	値	章
円周率 π	3.14159...	2-9
$\sqrt{2}$	1.41421...	2-8
$\sqrt{3}$	1.73205...	2-8
光の速さ	約 3.0×10^8 m/s	2-7
落ちる物の速さのふえ方	約 9.8 m/s^2 (2-0 では約 10)	2-0 2-10

7 ひょうけいさん 表計算とプログラムの書き方

意味	算数・数学	表計算 (2-18)	Python (2-19)
たす・ひく	＋、－	＋、－	＋、－
かける・わる	×、÷	＊、／	＊、／
累乗	2^3	$=2^3$	$2**3$
式の始まり	—	=で始める	—
入れる (代入)	—	セルに式を書く	$x = x + 1$
等しいか	=	=	==
以上	$\geq$	$>=$	$>=$
ずらさない番地	—	\$B\$1	—

- 表計算で式をコピーすると、セルの番地もいっしょにずれます。ずらしたくない番地には\$をつけます (2-18)。
- プログラムの $x = x + 1$ は「 x に 1 をたして、 x に入れなおす」という命令で、方程式ではありません (2-19)。
- コンピュータは数を有限のけたで覚えるので、0.1 を 10 回たしても、ぴったり 1 にならないことがあります。小数の答えは、少しずれていると考えて読みます (2-19)。

できるようになったことチェック表

各章の「ふりかえり」を集めた表です。章を学び終えたら1回め、次の巻に進む前に2回めのチェックをしよう。できなかった所は、ページにもどって読みなおします。

章	できるようになったこと	ページ	1回め	2回め
2-1	「かぞえる数」と「はかる数」のちがいを説明できる。	19	☐	☐
	量を「数値×単位」で表し、単位をかえて表せる。	20	☐	☐
	小数の位がわかり、10倍・ $\frac{1}{10}$ で小数点を動かせる。	22	☐	☐
2-2	0より小さい数を負の数で表し、数直線にかける。	39	☐	☐
	不等号(<・>・≤・≥)で、数の大きさをくらべられる。	41	☐	☐
	正の数・負の数の+・-・×・÷の計算ができる。	43	☐	☐
2-3	同じ種類の量を、単位をそろえてたしたりひいたりできる。	62	☐	☐
	ひき算で変化量を求め、△を使って書ける。	63	☐	☐
	わり算で速さを、かけ算で道のりを求められる。	65	☐	☐
2-4	わり算の答えを分数で書き、約分・通分ができる。	78	☐	☐
	分数の+・-・×÷ができ、わり算で逆数をかけるわけを説明できる。	84	☐	☐
	0と1のあいだの数をかけた・わった答えの大きさがわかる。	89	☐	☐
2-5	2つの量の関係を比で表し、等しい比をつくれる。	106	☐	☐
	比をかけ算でつないで、歯車の回転を求められる。	107	☐	☐
	割合を百分率で表し、「20%引き」の量を求められる。	109	☐	☐
2-6	最小目もりの10分の1まで読み、平均を求められる。	124	☐	☐
	四捨五入で、がい数をつくれる。	127	☐	☐
	「5.0cm」と「5cm」のちがいを±で説明できる。	128	☐	☐
2-7	同じ数を何回もかけた数を、累乗で書いて計算できる。	152	☐	☐
	体積の単位や大きな数を、10の累乗で表せる。	154	☐	☐

つぎのページへつづく

しょう 章	できるようになったこと	ページ	かい 1 回め	かい 2 回め
	指数 <small>しすう</small> のきまり、0 乗 <small>じよう</small> 、マイナスの指数 <small>しすう</small> がわかる。	155	☐	☐
2-8	面積 <small>めんせき</small> から 1 辺 <small>へん</small> を、2 乗 <small>じよう</small> ではさんで求められる。	170	☐	☐
	$\sqrt{\quad}$ の意味 <small>いみ</small> がわかり、平方根 <small>へいほうこん</small> を求められる。	172	☐	☐
	周期 <small>しゅうき</small> が長さの $\sqrt{\quad}$ に比例 <small>ひれい</small> することを説明 <small>せつめい</small> できる。	173	☐	☐
2-9	分数 <small>ぶんすう</small> を小数 <small>しょうすう</small> にすると、終わるかくり返すわけがわかる。	186	☐	☐
	分数 <small>ぶんすう</small> で書けない数 <small>かず</small> （無理数 <small>むりすう</small> ）があることがわかる。	188	☐	☐
	円周 <small>えんしゅう</small> = 直径 <small>ちようけい</small> $\times \pi$ で、円周や直径を求められる。	189	☐	☐
2-10	$k \cdot m \cdot \mu$ を読んで、単位 <small>たんい</small> を書きかえられる。	205	☐	☐
	「単位 <small>たんい</small> つきの 1」で、時間 <small>じかん</small> や速さ <small>はや</small> を換算 <small>かんさん</small> できる。	207	☐	☐
	単位 <small>たんい</small> を計算 <small>けいさん</small> して、式 <small>しき</small> が正しいかを確認 <small>たし</small> かめられる。	212	☐	☐
2-11	ことばの式 <small>しき</small> を、□や文字 <small>もじ</small> を使った式 <small>しき</small> で表せる。	232	☐	☐
	計算 <small>けいさん</small> の順番 <small>じゆんばん</small> のきまりと、そのわけがわかる。	233	☐	☐
	どんな数 <small>かず</small> でも成り立つきまりを、文字 <small>もじ</small> で 1 行 <small>ぎよう</small> に書ける。	239	☐	☐
2-12	$\times$ をはぶき、 $\div$ を分数 <small>ぶんすう</small> にして、文字式 <small>もじしき</small> を短く書ける。	258	☐	☐
	同類項 <small>どうるいこう</small> をまとめたり、かっこをはずしたりできる。	259	☐	☐
	指数 <small>しすう</small> のきまりを、文字 <small>もじ</small> を使って書いて使える。	261	☐	☐
2-13	公式 <small>こうしき</small> の文字 <small>もじ</small> に数 <small>かず</small> を代入 <small>だいにゆう</small> して、式の値 <small>しき あたい</small> を求められる。	274	☐	☐
	単位 <small>たんい</small> ごと代入 <small>だいにゆう</small> し、単位 <small>たんい</small> をそろえて計算 <small>けいさん</small> できる。	277	☐	☐
	マイナスの数 <small>かず</small> ・分数 <small>ぶんすう</small> ・式 <small>しき</small> を、かっこと代入 <small>だいにゆう</small> できる。	279	☐	☐
2-14	等式 <small>とうしき</small> の性質 <small>せいしつ</small> を、天びんで説明 <small>せつめい</small> できる。	296	☐	☐
	$x = vt$ を t や v について解 <small>と</small> ける。	298	☐	☐
	移項 <small>いこう</small> を使い、1 行 <small>ぎよう</small> ずつきまりを書いて変形 <small>へんけい</small> できる。	300	☐	☐
2-15	比例 <small>ひれい</small> を見つけ、 $y = ax$ の式 <small>しき</small> とグラフにできる。	316	☐	☐
	ばねの $F = kx$ 、オームの法則 <small>ほうそく</small> $V = RI$ を使える。	318	☐	☐
	反比例 <small>はんびれい</small> を見分け、2 倍 <small>ばい</small> にするとどうなるか答えられる。	321	☐	☐

つぎのページへつづく

しょう 章	できるようになったこと	ページ	かい 1 回め	かい 2 回め
2-16	ほうていしき 方程式をつくり、 ^{ひょう} 表で ^{かい} ためして解をさがせる。	338	☐	☐
	じ ほうていしき 1 次方程式を 1 行 ^{ぎょう} ずつ解ける。	341	☐	☐
	ひょう 表・グラフ・ ^{ほうていしき} 方程式で ^と 解き、 ^{たし} 確かめられる。	342	☐	☐
2-17	しんすう 2 進数と 10 進数 ^{しんすう} を行き来できる。	367	☐	☐
	ビットの数 ^{かず} から、何通り ^{なんとお} の ^{かず} 数 ^{あらわ} を表せるかを ^{けいさん} 計算できる。	368	☐	☐
	しんすう 2 進数を 4 けた ^{しんすう} ずつまとめて、16 進数 ^か で書ける。	370	☐	☐
2-18	しき か 「＝」の式を書き、 ^{かえ} コピーしてくり返せる。	388	☐	☐
	ずらしたくない ^{ばん ち} 番地 ^{つか} に \$ をつけて使える。	390	☐	☐
	うえ ぎょう けっ か 上の行 ^{した ぎょう} の結果で下の行 ^{けいさん} を計算し、グラフにできる。	391	☐	☐
2-19	へんすう だいにゆう 変数と代入 ^{けっ か} のプログラムの結果 ^{よ そう} を予想できる。	408	☐	☐
	くりかえ くり返しと「もし～なら」のプログラム ^よ を読める。	410	☐	☐
	しょうすう 小数 ^{たいさく} のずれのわけと対策 ^{せつめい} を説明できる。	412	☐	☐

つぎの巻へ

数と量のことがそろいました。第3巻「関数とデータ」では、この巻で身につけた文字と式を使って、表・グラフ・式で変化のきまりをつかみます。第3巻の章をのぞいてみましょう。

3-2 場所を数で表す：座標

「どこ」を2つの数で伝えよう

使う道具 マイナスの数と数直線(2-2)を、たてと横の2本にする。

3-3 関数は「入ると出てくる」ルール

表・グラフ・式は、同じことを言っている

使う道具 文字の式(2-11)と代入(2-13)。

3-5 グラフの傾きは「変化の速さ」

坂が急なほど、速く変わっている

使う道具 変化量 Δ (2-3)と比例(2-15)。

3-6 2本の直線が交わる場所：連立方程式

方程式

ふたりが会うのは、グラフの交わる点

使う道具 式の変形(2-14)と1次方程式(2-16)。

3-11 指数関数：いまある量に比例して

ふえる・へる

倍々でふえると、あつという間に大きくなる

使う道具 累乗と指数(2-7)と、表計算のくり返し(2-18)。

3-13 データのちらばり：ヒストグラムと平均

平均

何回もはかって、本当の値に近づこう

使う道具 はかった数の「ずれ」と平均(2-6)。



デルタ

この巻のことは、この先の全部の巻で使うよ。チェック表で自信のない章を見なおしてから、第3巻へ進もう！

この巻の道具は、この先でこう使う

第2巻の章と、その道具を使う第3巻から先の章です（章のはじめの「道しるべ」の「この章の先に」から集めました）。

この巻の章	この道具を使う章
2-2 マイナスの数と数直線	3-2 場所を数で表す：座標 第4巻から先： 4-10 5-5
2-3 $+$ $-$ $\times$ $\div$ は、何を表しているの？	3-5 グラフの傾きは「変化の速さ」 第4巻から先： 5-1 5-9
2-5 比・割合・百分率	第4巻から先： 5-6
2-6 はかった数には「ずれ」がある	3-14 ばらつきを1つの数で：標準偏差 第4巻から先： 5-8
2-7 何回もかける：累乗と指数	第4巻から先： 5-14
2-8 2回かけると□になる数：平方根	3-10 ボールはいつその高さに届く？：2次方程式 第4巻から先： 4-4 6-6
2-9 分数で書けない数がある？	第4巻から先： 4-2 4-4 5-14
2-10 単位の世界ルール：SI単位	第4巻から先： 5-1 5-5
2-11 なぜ文字を使うの？	3-3 関数は「入れると出てくる」ルール
2-12 文字式のやくそく	3-8 かっこをはずす：展開と平方完成 第4巻から先： 5-2 5-4
2-13 公式に数を入れてみよう：代入	3-3 関数は「入れると出てくる」ルール 第4巻から先： 5-2 5-3
2-14 式を変形して、ほしい量を取り出そう	3-6 2本の直線が交わる場所：連立方程式 第4巻から先： 5-0

つぎのページへつづく

この巻の章

2-15 比例と反比例

この道具を使う章

3-3 関数は「入れると出てくる」ルール

3-4 グラフをかこう・読もう

3-7 反比例のグラフ

第4巻から先：5-12 6-6

2-16 何秒後に追いつく？ 1次方程式

3-4 グラフをかこう・読もう

3-6 2本の直線が交わる場所：連立方程式

3-10 ボールはいつその高さに届く？：2次方程式

第4巻から先：6-2

2-17 コンピュータの数：2進数と16進数

3-11 指数関数：いまある量に比例してふえる・へる

2-18 表計算で計算しよう

第4巻から先：5-8 6-2

2-19 プログラムで計算しよう

第4巻から先：5-2 6-2

さくいん

数字^{すうじ}はページです。その語^{ことば}がはじめて出てくるページや、くわしく説明^{せつめい}しているページをのせています。

あ

いこう	301
移項	
いじょう・い か み まん	42
以上・以下・未満	
じ ほうていしき	341
1 次方程式	
こくさいたん い けい	204
SI (国際単位系)	
えんしゅうりつ	189
円周率 (π)	
ほうそく	320
オームの法則	

か

かい ほうていしき	338
解 (方程式の)	
か し	280
華氏	
かず	19
かぞえる数	
かんさん	207
換算	
ぎやくすう	88
逆数	
けいさん じゅんばん	234
計算の順番	
けいすう	260
係数	
こう	260
項	
こうかんほうそく	239
交換法則	
ばい	118
こう配	
ご	130
誤差	
こみぐあい	66

さ

しき あたい	275
式の値	
ししやごにゅう	128
四捨五入	
しすう	152
指数	
しんすう	370
16 進数	
じょうけんぶんき	412
条件分岐	

しょうすう くらい	23
小数の位	
すう ち	20
数値	
せいすう	42
整数	
せい かず	40
正の数	
せつとう こと	205
接頭語	
セル	388
そ すう	80
素数	

た

たいせき	153
体積	
だいにゆう	275
代入	
たん い	20
単位	
たん い	213
単位のチェック	
つうぶん	81
通分	
Δ (デルタ)	64
とうしき	296
等式	
とうしき せいしつ	298
等式の性質	
どうるいこう	260
同類項	
(～について) 解く	300

な

しんすう	366
2 進数	

は

バイト	369
はかる かず	19
はかる数	
ばね定数	319
はや	65
速さ	
ばん ち	388
番地	

はん び れい 反比例	321
ひ 比	106
ビット	368
ひ あたい 比の値	106
ひゃくぶんりつ 百分率	109
ひょうけいさん 表計算ソフト	387
ひ れい 比例	316
v-t グラフ	67
ふ ごう 符号	47
ふ とうごう 不等号	41
ふ かず 負の数	40
ふ こ しゅうき 振り子の周期	173
プログラム	406
ぶんかいのう 分解能	370
ぶんすう 分数	78
ぶんばいほうそく 分配法則	239
へいきん 平均	126
へいほうこん 平方根	172

へんかりょう 変化量	64
へんすう 変数	408
ほうていしき 方程式	338

ま

む り すう 無理数	188
めぶんりよう 目分量	124
も じ しき 文字式	233

や

やくぶん 約分	80
ゆうこうすう じ 有効数字	129
ゆう り すう 有理数	188

ら

るいじょう 累乗	152
√ (ルート)	172

わ

わりあい 割合	108
------------------	-----

ぶつ り かい
物理を理解するための数学 第2巻
かず りょう
数と量のことば

へんしや
編者 「物理を理解するための数学」編集委員会
いいんちょう しょうがっこうちょう やく
委員長 小学校長（まとめ役）
いいん すうがく でん き こうがく き かいこうがく きょういくがく だいがくきょうじゅ ようちえんきょうじゅ
委員 数学・電気工学・機械工学・教育学の大学教授、幼稚園教諭、
とくべつしえんがっこうきょうじゅ しん り し か がくかいせつしや しょうがっこうきょうじゅ
特別支援学校教諭、心理士、科学解説者、小学校教諭
デザイン ユニバーサルデザイン 担当委員
さし え たんとう い いん
挿絵 イラスト担当委員
はん み ほんばん だい かいへんしゅういんかい
版 見本版（第7回編集委員会） 2026 年 10 月

この本の問題の答えは、巻末の「こたえ」にあります。くわしい解き方は、別冊の問題集と指導書に
のせます。

だい かん かず りょう 第2巻 数と量のことは

この巻で学ぶこと

だい ぶ
第1部 りょう かず
量と数 (2-1~2-6)

だい ぶ
第2部 おお かず ちい かず たん い
大きな数・小さな数・単位 (2-7~2-10)

だい ぶ
第3部 もじ しき
文字と式 (2-11~2-16)

だい ぶ
第4部 コンピュータでけいさん
計算 (2-17~2-19)

ぜん かん 全9巻のならば

1 かぞえる・はかる

2 かず りょう
数と量のことは

3 かんすう
関数とデータ きまりを見つかる

4 かたち む すけい さんかくかんすう
形と向き 図形・三角関数・ベクトル

5 へん か
変化をつかむ ぶん せきぶん
微分と積分

6 みらい けいさん
未来を計算する ぶんほうていしき かく そ すう
微分方程式と複素数

7 まとめてけいさん
計算する ぎょうれつ
行列

8 くうかん ひろ りょう
空間に広がる量 ベクトル解析

9 なみ へん か よ
波と変化を読みとく フーリエ解析とラプラス変換

「5」ではなく「5m」。かず
りょう
量のことはを身につけよう

